

مقایسه سیستوگرافی رادیونوکلئید مستقیم (DRC) و سیستوگرافی با ماده حاجب (VCUG) در تشخیص ریفلاکس ادراری مثانه به حالب (VUR) در کودکان مبتلا به عفونت ادراری

احمدعلی نیکی بخش*^۱، هاشم محمودزاده^۲، ساسان حجازی^۳، مهران نوروزی^۴، احد قضاوی^۵، شاهصنم غیبی^۶، ابراهیم صادقی^۷، رضا ساعی^۸ فر^۹

تاریخ دریافت 1392/04/10 تاریخ پذیرش 1392/06/12

چکیده

پیش زمینه و هدف: جهت تشخیص VUR، روش‌های مختلفی بکار می‌رود که مهم‌ترین آن‌ها VCUG و DRC می‌باشند. این مطالعه جهت مقایسه دو روش VCUG و DRC در تشخیص VUR، ترتیب داده شده است.

مواد و روش کار: طی یک سال کودکان مراجعه کننده به بخش نفرولوژی کودکان در محدوده سنی ۲ ماه تا ۱۵ سال مبتلا به UTI، به صورت ساده و تصادفی توسط یکی از روش‌های VCUG یا DRC، از نظر تشخیص VUR، تحت مطالعه قرار گرفتند. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها شامل Chi-square برای بررسی ارتباط تست‌های متغیرها و آنالیز Descriptive برای گزارش فراوانی‌ها بود.

یافته‌ها: ۱۳۵ کودک معادل ۲۷۰ واحد حالب کلیه وارد مطالعه شدند. در ۱۳۶ واحد DRC و در ۱۳۴ واحد VCUG انجام گرفت. هر دو گروه از نظر سنی و جنسی، شرایط یکسانی داشتند در روش DRC از ۱۳۶ واحد حالب کلیه مورد مطالعه، ۶۶ واحد (۴۸/۵ درصد) دچار VUR بودند ولی در روش VCUG از ۱۳۴ واحد ۴۴ واحد (۳۲/۸ درصد) دچار VUR بودند.

بحث: در مطالعه ما درصد تشخیص VUR بین دو روش DRC و VCUG تفاوت معنی‌دار داشت. یعنی موارد تشخیص داده شده VUR به روش DRC بیش از موارد VCUG بود.

نتیجه گیری: در کودکان با عفونت ادراری احتمال کشف VUR در روش DRC، در مقایسه با VCUG، با درصد بالاتری امکان‌پذیر است.
کلمات کلیدی: عفونت ادراری، ریفلاکس مثانه‌ای حالبی

مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و چهارم، شماره هشتم، ص ۶۰۶-۶۰۰، آبان ۱۳۹۲

آدرس مکاتبه: ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، تلفن: ۰۹۱۴۴۴۱۱۳۸۰

Email: anikibakhsh@yahoo.com

مقدمه

کودکان می‌باشد (۱، ۲). ریفلاکس از جهت مستعد کردن کلیه به عفونت و اسکار ثانویه به عفونت حائز اهمیت است (۱-۶). اسکار بزرگ کلیه باعث اختلال عملکرد کلیه، فشارخون وابسته به رنین، نارسایی مزمن کلیه و کاهش رشد می‌گردد.

ریفلاکس ادرار از مثانه به حالب^۹ عبارت است از برگشت ادرار از مثانه به حالب و لگنچه کلیه. ریفلاکس یک نقص مادرزادی و فامیلیال بوده و شیوع آن تقریباً ۱ درصد در جمعیت

^۱ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مرکز تحقیقات نفرولوژی ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (نویسنده مسئول)

^۲ دانشیار نفرولوژی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

^۳ استادیار خون کودکان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

^۴ استادیار خون و سرطان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

^۵ استادیار مغز و اعصاب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

^۶ دانشیار گوارش کودکان، مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

^۷ استادیار عفونی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

^۸ متخصص کودکان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

^۹ vesicoureteral reflux (VUR)

شدن فورنیکس کالیس‌ها = Grade IV = ریفلاکس به حالب با دیلاتاسیون شدید و تحذب فورنیکس کالیس‌ها = Grade V = ریفلاکس به حالب با دیلاتاسیون شدید، پیچ خوردگی حالب و از بین رفتن مرز فورنیکس کالیس‌ها.

همچنین شدت VUR در مواردی که به روش DRC تشخیص داده شدند، طبق تقسیم بندی که در زیر آمده است به سه grade تقسیم بندی شده و در نتایج ثبت گردید.

خفیف = مشاهده ماده هسته‌ای در حالب

متوسط = مشاهده ماده در حالب و سیستم پیلوکالیس

شدید = مشاهده ماده هسته‌ای در حالب و لگنچه همراه با دیلاتاسیون حالب‌ها

بعد از مسجل شدن اسکار در DMSA نیز شدت اسکار به سه گروه خفیف-متوسط و شدید تقسیم و در نتایج آورده شد.

خفیف = داشتن کمتر از ۳ کانون اسکار در یک واحد کلیه، متوسط = داشتن بیشتر یا مساوی ۳ کانون اسکار در یک واحد کلیه شدید = اسکار همراه با آتروفی کلیه

روش جمع آوری داده‌ها:

داده‌های مختلف بر اساس گزارشات پرونده‌های بیماران و نیز چک لیست و جمع آوری تکمیل گردید.

نوع مطالعه:

مطالعه از نوع cross-sectional بوده که دو روش VCUG و DRC در مبتلایان به UTI از جهت تشخیص VUR، مورد مقایسه قرار گرفته است.

روش نمونه گیری آسان و متوالی از بین بیماران بستری شده در بخش کودکان با تشخیص UTI بوده است

کودکان در محدوده سنی ۲ ماه تا ۱۵ سال وارد مطالعه گردیده است.

حجم نمونه در هر گروه ۶۰ نفر بر اساس فرمول زیر محاسبه شده است

$$N = \frac{(z-a/2)^2 p \times (1-p)}{d^2} \quad P = \% 1$$

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:

کای اسکور برای بررسی ارتباط تست‌های متغیرها

آنالیز Descriptive برای گزارش فراوانی‌ها

یافته‌ها

در این مطالعه ۲۷۰ واحد حالب، معادل ۱۳۵ کودک مورد بررسی قرار گرفتند. در ۱۳۶ واحد، DRC و در ۱۳۴ واحد VCUG جهت تشخیص VUR، انجام گرفت. ۷۷/۸ درصد موارد کشت مثبت با E. coli، ۱۵/۵ درصد کشت مثبت با کلسیلا،

با توجه به اهمیت ریفلاکس و عوارض احتمالی این پدیده و جهت تشخیص بهتر و سریع‌تر^۱ VUR در راستای پیشگیری از عوارض این بیماری لازم است که روش تشخیصی مناسبی را برای VUR با بیشترین حساسیت و کمترین عوارض بکار گرفته شود. با توجه به این که در مطالعات مختلف، در صد کشف VUR با روش‌های مختلف، نتایج متفاوتی داشته (۷-۹) و با توجه به اینکه یکی از علل عمده نارسایی کلیوی در کشور ما VUR می‌باشد، در این مطالعه سعی شده است که دقت تشخیصی^۲ DRC و^۳ VCUG در تشخیص VUR در مبتلایان به UTI با هم مقایسه شوند.

مواد و روش کار

طی ۱۲ ماه کودکان مراجعه کننده به بخش نفرولوژی کودکان بیمارستان شهید مطهری ارومیه در محدوده سنی ۲ ماه تا ۱۵ سال مبتلا به UTI تحت مطالعه قرار گرفتند. شرط ورود به مطالعه داشتن حداقل ۳ مورد از ۴ مورد مذکور در زیر بوده است

۱. U/A فعال به معنی $WBC \geq 10$

۲. U/C مثبت به معنی رشد یک نوع میکروارگانیزم

$\leq 10^5$ (روش نمونه گیری ادرار با استفاده از کیسه ادراری

بوده است)

۳. داشتن علائم مشکوک به عفونت ادراری شامل:

دیزوری - Frequency - urgency - درد سوپراپوبیک -

بی‌قراری موقع ادرار کردن.

۴. داشتن حداقل یک ناحیه inflammation (کاهش

جذب) یا یک ناحیه اسکار (کاهش حجم) در DMSA

بیماران به دو گروه A و B تقسیم شدند. در گروه A، جهت

رد VUR، VCUG و در گروه B جهت رد VUR، DRC انجام

گرفت و نتایج از نظر تشخیص VUR با هم مقایسه گردید. در

ضمن بیمارانی که عامل مخدوش کننده از قبیل مثانه نوروژنیک -

اختلالات مادرزادی کلیه و مجاری ادراری، دوپلیکاسیون حالب،

حالب اکتوپیک و دریچه پیش آبراه خلفی (با استفاده از شرح حال،

معاینه و سونوگرافی) داشتند از مطالعه حذف شدند.

بعد از تشخیص VUR به روش VCUG، درجه بندی VUR

براساس International study classification صورت گرفت که

در زیر آمده است. Grade I = ریفلاکس به حالب بدون

دیلاتاسیون، Grade II = ریفلاکس به سیستم جمع کننده بدون

دیلاتاسیون، Grade III = ریفلاکس حالب با دیلاتاسیون و صاف

¹ vesicoureteral reflux

² Direct radionuclide cystography

³ voiding cystourethrography

یافته‌های DMSA براساس شدت VUR نیز در روش VCUG و DRC، به تفکیک مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج زیر حاصل شد (جدول شماره ۴):

واحدهای با اسکار خفیف در DMSA:

روش DRC: ۷ واحد VUR خفیف، ۱۱ واحد VUR متوسط و ۷ واحد بدون VUR بودند. VUR شدید در این گروه مشاهده نشد.

روش VCUG: ۸ واحد VUR خفیف، ۸ واحد VUR متوسط و ۱۷ واحد بدون VUR بودند. VUR شدید در این گروه مشاهده نشد.

واحدهای با اسکار متوسط در DMSA:

روش DRC = ۵ واحد VUR خفیف، ۲۶ واحد VUR متوسط، ۲ واحد VUR شدید و ۲ واحد بدون VUR بودند.

روش VCUG = ۲ واحد VUR خفیف، ۱۵ واحد VUR متوسط و ۹ واحد بدون VUR بودند. VUR شدید مشاهده نشد.

واحدهای با اسکار شدید در DMSA:

روش DRC = ۱ واحد VUR خفیف، ۳ واحد VUR متوسط، ۱ واحد VUR شدید و ۲ واحد VUR مشاهده نشد.

روش VCUG = ۵ واحد VUR خفیف، ۱ واحد VUR متوسط و ۱ واحد بدون VUR بودند. VUR شدید مشاهده نشد.

مجموع واحدهای با اسکار مثبت اعم از خفیف، متوسط و شدید در DMSA:

روش DRC = ۱۳ واحد VUR خفیف، ۴۰ واحد VUR متوسط، ۳ واحد VUR شدید و ۱۱ واحد بدون VUR بودند.

روش VCUG = ۱۵ واحد VUR خفیف، ۲۴ واحد VUR متوسط، ۲۷ واحد بدون VUR و VUR شدید مشاهده نشد.

مجموع واحدهای بدون اسکار در DMSA:

روش DRC = ۳ واحد خفیف، ۶ واحد VUR متوسط، ۱ واحد VUR شدید و ۵۹ واحد بدون VUR بودند.

روش VCUG، ۳ واحد VUR خفیف، ۶ واحد VUR متوسط، ۶۳ واحد بدون VUR، VUR شدید مشاهده نشد.

۲/۹۶ درصد کشت مثبت با انتروکوک، ۲/۲۲ درصد کشت مثبت با استافیلوکوک اپیدرمیدیس و ۱/۴۸ درصد موارد کست مثبت با سودومونا داشتند. از نظر توزیع فراوانی جنسی، در روش DRC، ۱۴ مورد (۱۰/۳ درصد) پسر و ۱۲۲ مورد (۸۹/۷ درصد) دختر مورد مطالعه قرار گرفتند (جدول شماره ۲و).

در روش VCUG ۲۲ مورد (۱۶/۴ درصد) پسر و ۱۲۲ مورد (۸۳/۶ درصد) دختر وارد مطالعه شدند. میانگین سن افرادی که تحت DRC قرار گرفتند، ۲/۵۶ سال و متوسط سن افراد در روش VCUG، ۳/۳۹ سال و در مجموع دو روش ۲/۹۷ سال بود.

در روش DRC از ۱۳۶ واحد حالب مورد مطالعه، ۶۶ واحد (۴۸/۵ درصد) دچار VUR بودند که براساس شدت VUR به این قرار بودند: ۱۶ واحد (۱۱/۸ درصد) VUR خفیف، ۴۶ واحد (۳۳/۸ درصد) VUR متوسط، ۴ واحد (۲/۹ درصد) VUR شدید و ۷۰ واحد (۵۱/۵ درصد) واحدهای مورد مطالعه، VUR مشاهده نشد (جدول شماره ۳).

در روش VCUG، از ۱۳۴ واحد حالب مطالعه شده، ۴۴ واحد (۳۲/۸ درصد) دچار VUR بودند که براساس شدت VUR به این قرار بودند: ۱۸ واحد (۱۳/۴ درصد) VUR خفیف، ۲۶ واحد (۱۹/۴ درصد) VUR متوسط و هیچ موردی از VUR شدید گزارش نشد. ۹۰ واحد (۶۷/۲ درصد) واحدهای حالب که به این روش مورد مطالعه قرار گرفتند، VUR مشاهده نشد (جدول شماره ۳).

از نظر یافته‌های DMSA در موارد مطالعه شده به دو روش DRC و VCUG، نتایج زیر بدست آمد:

در روش DRC، اعم از واحدهای دارای VUR و بدون VUR: ۲۵ واحد (۱۸/۴ درصد) اسکار خفیف، ۳۵ واحد (۲۵/۷ درصد) اسکار متوسط، ۷ واحد (۵/۱ درصد) اسکار شدید و ۶۹ واحد (۵۰/۷ درصد) بدون اسکار بودند.

در روش VCUG، اعم از واحدهای دارای VUR و بدون VUR: ۳۳ واحد (۲۴/۶ درصد) اسکار خفیف، ۲۶ واحد (۱۹/۴ درصد) اسکار متوسط، ۷ واحد (۵/۲ درصد) اسکار شدید و ۶۸ واحد (۵۰/۷ درصد) بدون اسکار بودند.

جدول شماره (۱): توزیع فراوانی جنسی در دو روش VCUG و DRC

جنس تصویربرداری	جمع	
	مؤنث	مذکر
DRC	۱۲۲ (%۸۹/۷)	۱۴ (%۱۰/۳)
VCUG	۱۲۲ (%۸۳/۶)	۲۲ (%۱۶/۴)

P.value = ۰/۱۳۹

جدول شماره (۲): توزیع فراوانی سنی در دو روش VCUG و DRC

گروه	تعداد	میانگین
DRC	۱۳۶	۲/۵۶
VCUG	۱۳۴	۳/۳۹
جمع	۲۷۰	۲/۹۷

P-value=۰/۵۲

جدول شماره (۳): توزیع فراوانی VUR و شدت VUR در دو روش VCUG و DRC

VUR تصویربرداری	شدت			نرمال
	خفیف	متوسط	شدید	
DRC	۱۶ (%۱۱/۸)	۴۶ (%۳۳/۸)	۴ (%۲/۹)	۷۰ (%۵۱/۵)
VCUG	۱۸ (%۱۳/۴)	۲۶ (%۱۹/۴)	--	۹۰ (%۶۷/۲)

P-value=۰/۰۲

جدول شماره (۴): توزیع فراوانی شدت DMSA مثبت (خفیف و متوسط و شدید) در دو روش VCUG و DRC

VUR تصویربرداری	شدت			VUR+Total	VUR-
	خفیف	متوسط	شدید		
DRC	۱۳ (%۹/۴)	۴۰ (%۵۹/۹۳)	۳ (%۴/۵)	۵۶ (%۸۳/۹)	۱۱ (%۱۶/۴)
VCUG	۱۵ (%۲۲/۷۶)	۲۴ (%۳۶/۴)	==	۳۹ (%۵۹/۱۶)	۲۷ (%۴۰/۹)

P-value=۰/۰۰۲

بحث و نتیجه‌گیری

با توجه به نقش برجسته VUR در نارسایی کلیوی کودکان، لازم است دقیق‌ترین روش تشخیصی VUR در کودکان بکار گرفته شود همچنان که از آمار برمی آید، شیوع UTI و VUR در جنس مؤنث شایع‌تر از مذکر است، لذا لازم است در این گروه جنسی با کمترین شک به UTI، اقدامات لازم جهت کشف VUR انجام گیرد.

در این مطالعه از نظر توزیع فراوانی جنسی (دختر - پسر) بین دو روش DRC و VCUG تفاوت آماری معنی‌داری بین دو روش وجود نداشت. میانگین سنی افراد مطالعه شده در دو روش DRC و VCUG نیز با $P\text{-value}=0.52$ ، تفاوت معنی‌داری ثبت نشد (جدول شماره ۲).

در این مطالعه تفاوت آماری دو روش DRC و VCUG در تشخیص $P\text{-value}=0.02$ معنی‌دار گزارش شد.

بیماران در این مطالعه به صورت ساده و تصادفی انتخاب شده و یکی از روش‌های DRC و VCUG جهت تشخیص VUR برایشان اتخاذ شده بود. با توجه به داده‌های آماری، موارد تشخیص داده شده VUR در روش DRC به صورت معنی‌داری بیش از موارد تشخیص داده شده به روش VCUG بود. با دقت در مطالعاتی که قبلاً در این زمینه انجام گرفته، گروهی از مطالعات از قبیل مطالعه پروفیسور عماد در عربستان (۱۰)، مطالعه بول و همکاران در هندوستان (۱۱) و مطالعه مارکویک و همکاران در انگلستان (۱۲) قدرت تشخیص DRC در تشخیص VUR، بیشتر از VCUG بوده است. برخی دیگر از مطالعات نیز از قبیل مطالعه Harika و همکاران در ترکیه (۱۳) و مطالعه Keuppens و همکاران (۱۴) در انگلستان، تفاوتی را بین دو روش DRC و VCUG در تشخیص VUR، گزارش نکردند. نتایج مطالعه ما

مشخص شد. یعنی مواردی که تحت VCUG قرار گرفته و VUR نداشتند و بعداً در DMSA، برایشان اسکار متوسط گزارش شده بود، به طور معنی‌داری بیش از افرادی بود که علی‌رغم اسکار متوسط در DMSA، در DRC فاقد VUR بودند.

در موارد اسکار شدید در DMSA که VUR نداشتند با $P.value = 0.172$ ، تفاوت معنی‌داری بین دو روش DRC و VCUG ثبت نشد.

در مجموع یعنی در موارد وجود اسکار در DMSA اعم از خفیف، متوسط و شدید که فاقد VUR گزارش شده بودند، با $P.value = 0.002$ تفاوت معنی‌داری بین دو روش DRC و VCUG مشخص نشد (جدول شماره ۴).

از این آمار چنین برمی‌آید که DMSA نیز به عنوان راهنمایی جهت احتمال وجود VUR است. چرا که آمار قابل توجهی از مواردی که تحت VCUG قرار گرفته و VUR برای آن‌ها منفی گزارش شده بود، طی DMSA برایشان اسکار گزارش شد. که این آمار در گروه DRC بسیار کمتر بود. شاید بهتر باشد موارد با این شرایط، یعنی افرادی که علی‌رغم VUR منفی در VCUG، DMSA از نظر اسکار مثبت باشد، برایشان DRC نیز انجام گیرد.

علی‌رغم محدودیت مطالعه فوق به لحاظ رعایت اصول اخلاق در پژوهش و جلوگیری از تحمیل ریسک به بیمار در هر بیمار تنها یک روش را انجام شده است، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که در کودکان با عفونت ادراری احتمال کشف VUR در روش DRC، در مقایسه با VCUG، با درصد بالاتری امکان‌پذیر است.

بیشتر موافق با گروه اول بود که حاکی از برتری روش DRC نسبت به VCUG در تشخیص VUR بود.

شاید یکی از دلایل این تفاوت‌ها وجود VUR های متناوب باشد که در DRC قابل تشخیص هستند. این ریفلاکس‌ها در VCUG به روش دینامیک که با کنترل فلوروسکوپی باشد، اکثراً قابل تشخیص می‌باشند ولی در VCUG های Static که در مراکز ما نیز این روش بکار می‌رود اکثراً قابل تشخیص نیستند. علی‌رغم رعایت اصل فوق حتی در مطالعات قبلی نیز گروهی بر حساسیت بیشتر DRC نسبت به VCUG تأکید کرده بودند (۱۵-۱۸). با این توضیح و در نظر گرفتن مزیت دیگر DRC نسبت به VCUG از لحاظ دوز کمتر اشعه در روش DRC نسبت به VCUG به نظر می‌رسد که نسبت به انتخاب DRC به عنوان اولین اقدام در جهت تشخیص VUR، توجه بیشتری باید مبذول گردد.

نتایج حاصل از مطالعات DMSA نیز در خور توجه هستند. در مواردی که DMSA با هر شدتی مثبت بود، تفاوت معنی‌داری بین دو روش DRC و VCUG در موارد VUR مثبت مشاهده نشد.

بررسی موارد با DMSA مثبت که در دو روش DRC یا VCUG، فاقد VUR بودند تفاوت آماری به قرار زیر داشتند:

در موارد اسکار خفیف در DMSA که VUR گزارش نشده بود، با $P.value = 0.515$ ، تفاوت معنی‌داری بین دو روش DRC و VCUG گزارش نشد.

در موارد اسکار متوسط در DMSA که VUR نداشتند، با $P.value = 0.002$ تفاوت معنی‌داری بین دو روش DRC و VCUG

References:

- Greenbaum LA, Mesrobian H-GO. Vesicoureteral reflux. *Pediatr Clin North Am* 2006;53(3):413-27.
- Peters C, Rushton HG. Vesicoureteral reflux associated renal damage: congenital reflux nephropathy and acquired renal scarring. *J Urol* 2010;184:265-73.
- Faust WC, Diaz M, Pohl HG. Incidence of post-pyelonephritic renal scarring: a meta-analysis of the dimercapto-succinic acid literature. *J Urol* 2009;181:290-7.
- Shaikh N, Ewing AL, Bhatnagar S, Hoberman A. Risk of renal scarring in children with a first urinary tract infection: a systematic review. *Pediatrics* 2010;126:1084-91.
- Lee YJ, Lee JH, Park YS. Risk factors for renal scar formation in infants with first episode of acute pyelonephritis: a prospective clinical study. *J Urol* 2012;187:1032-6.
- Mackenzie S. Controversies in the radiological investigation of paediatric urinary tract infection. *Imaging* 2001;13(4):285-94.
- Piscitelli A, Galiano R, Serrao F. Which cystography in the diagnosis and grading of vesicoureteral reflux?. *Pediatric Nephrology* 2008; 23(1): 107-10.
- Polito C, Rambaldi PF, Lamana A. Enhanced detection of vesicoureteric reflux with isotopic cystography. *Pediatric Nephrol* 2000; 14: 827-30.

9. Snow W, Taylor M. Non-Invasive Vesicoureteral Reflux Imaging. *J Pediatric Urology*. 2010; 6(6):543-9.
10. Khriesat I, Khriesat S, Flazza I. Comparison of direct and indirect nuclear cystography in diagnosis of vesico urethral reflux. *Saudi: J kidney Disease and transplant* 2001, 12(1):28-31.
11. Jayu G, Bul CS, Pady AK. Radionuclide studies in evaluation of urinary tract infection. *India pediatric* 1996,33(8):365-40.
12. Sarage M, stanicic A, Markovic V. The role of direct radionuclide cystography in evaluation of vesicoureteral reflux. *Scand J uro nephrology* 1996, 30(5):367-71.
13. Harika A, Nese K. Comparison of direct radionuclide cystography and voiding cytourethrography in detecting vesicoureteral reflux. *Pediatric International* 2004,48(3):287-97.
14. De- sadeleer C, Deboe V, Keuppens F. how good is MAG3 indirect cyctographys. *Eur J-Nucl Med* 1994;21(3):223-7.
15. Nasralah PH, NuraS,Crawford J. Clinical applications of nuclear cyctography. *Urol* 1982; 128(3): 550-3.
16. Cesarepolito PF, Angela L. Enhanced detection of vesicoureteric reflux with isotopic cystography. *Pediatric nephrology* 2000,14:827-30.
17. Giovanni M, Angela L. cyclic voiding oystourethrophy in the diagnosis of occult vesicoureteric reflux. *Pediatric nephrology* 2000;14:39-41.
18. Blumental I. Vesicoureteric reflux and urinary tract infection in children. *Postgrad Med J* 2006; 82(963):31-5.

COMPARISON OF DIRECT RADIONUCLIDE CYSTOGRAPHY (DRC) WITH CONTRAST VOIDING CYSTOGRAPHY (VCUG) IN CHILDREN WITH URINARY TRACT INFECTION

Ahmad Ali Nikibakhsh^{*1}, Hashem Mahmoodzadeh², Sasan Hejazi³, Mehran Noroozi⁴, Ahad Ghazavi⁵, Shahsanam Gaibi⁶, Ebrahim Sadegy⁷, Reza Saeifar⁸

Received: 1 Jul, 2013; Accepted: 3 Sep, 2013

Abstract

Background & Aims: Cystography with contrast and cystography with radionuclide are two common methods for diagnosis of urinary reflux. This study compared two methods direct radionuclide cystography (DRC) with contrast voiding cystography (VCUG).

Materials & Methods: This study was conducted for 12 months on children with urinary tract infection (age: 2 months-15 years) whom referred to nephrology clinic were enrolled in the study. In order to diagnose the urinary reflux, one of DRC and VCUG methods was performed randomly. Chi-square and Descriptive test was used for data processing and statistical analyses.

Results: A total 135 children (270 ureter) were studied in this report. In 136 ureter, DRC and in 134 ureter VCUG were performed. Sex and age were matched in both groups. VUR was detected in 66 ureter (%48.5) in DRC group and in 44 ureter (32.8) in VCUG group. Statistically, DRC method was more powerful in diagnosis of urinary reflux in comparison with VCUG method.

Conclusion: In this study two methods had significant difference in diagnostic value. DRC method, which was more sensitive in diagnosis of urinary reflux, was suggested to perform in observance of ideal condition.

Keywords: Cystography with contrast, Cystography with radionuclide, Vesicoureteral reflux, Urinary tract infection

Address: Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran. **Tel:** +98 9144411380

Email: anikibakhsh@yahoo.com

SOURCE: URMIA MED J 2013; 24(8): 606 ISSN: 1027-3727

¹ Associate Professor of Nephrology-Urology and Transplantation Research Center, Urmia University of Medical Sciences-Urmia- Iran (Correspondence Author)

² Associate Professor of Pediatric Nephrology, Urmia University of Medical Sciences, Urmia- Iran

³ Assistant Professor of Pediatric Hematology and Oncology, Urmia University of Medical Sciences, Urmia- Iran

⁴ Assistant Professor of Pediatric Hematology and Oncology, Urmia University of Medical Sciences, Urmia- Iran

⁵ Assistant Professor of Pediatric Neurology, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

⁶ Associate Professor of Pediatric Gastroenterology, Maternal and Childhood Obesity Research Center, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

⁷ Assistant Professor of Pediatric Infectious Diseases, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

⁸ Department of Pediatrics, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran