

تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی و اضطراب وجودی در افراد مبتلا به بیماری‌های کرونری قلب: یک مطالعه تطبیقی

میثم نیک‌دانش^۱، محمدحسن دوازده‌امامی^۲، محمد اسماعیل قیداری^۳، مریم بختیاری^۴، ابوالفضل محمدی^۵

تاریخ دریافت ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ تاریخ پذیرش ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

چکیده

پیش‌زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی تطبیقی تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی و اضطراب وجودی در بیماران قلبی و افراد سالم می‌باشد. **مواد و روش کار:** پژوهش حاضر یک مطالعه پس‌رویدادی می‌باشد که به روش مقطعی انجام شده است. در این پژوهش جامعه مورد مطالعه کلیه بیماران قلبی عروقی و همراهان بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان طالقانی تهران در سال ۱۳۹۵ می‌باشد. از جامعه‌ی فوق تعداد ۶۱ بیمار دارای تشخیص بیماری قلبی عروقی به شیوه‌ی هدفمند انتخاب شدند. گروه افراد سالم (N=63) نیز از همراهان بیماران به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. به‌منظور آزمون فرضیه پژوهش و برای مقایسه‌ی بین گروه‌ها ابتدا ویژگی‌های مربوط به پارامتریک یا ناپارامتریک بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت. سپس از آزمون ناپارامتریک یو من ویتنی برای مقایسه‌ی بین گروه‌ها استفاده شد. در این پژوهش از پرسش‌نامه‌ی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، پرسش‌نامه‌ی دشواری در تنظیم هیجان (DERS)، پرسش‌نامه‌ی پنج‌وجهی ذهن آگاهی بائر (FFMQ) و پرسش‌نامه‌ی اضطراب وجودی گود (EAI) استفاده شد. **یافته‌ها:** یافته‌های پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری در دو گروه بیماران قلبی-عروقی و افراد سالم در هر سه متغیر پژوهش (تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی و اضطراب وجودی) وجود دارد. **بحث و نتیجه‌گیری:** تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی و اضطراب وجودی از عوامل روان‌شناختی مهم در اختلالات قلبی عروقی محسوب می‌شود و باید به نقش آن‌ها در این اختلالات توجه بیشتری داشت. **کلیدواژه‌ها:** بیماری‌های قلبی عروقی، تنظیم هیجانی، اضطراب وجودی، ذهن آگاهی

مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و هشتم، شماره ششم، ص ۳۹۳-۳۸۴، شهریور ۱۳۹۶

آدرس مکاتبه: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گروه روانشناسی بالینی تلفن: ۰۹۱۳۳۲۵۸۷۷۶

Email: davazdahemamy@gmail.com

مقدمه

چاقی و دیابت) تنها ۴۰ درصد وقوع بیماری‌های قلبی عروقی را تبیین می‌کنند (۴). این در حالی است که بیماری‌های قلبی اغلب به سبب ماهیت پیش‌رونده نشانه‌های جسمانی، استرس‌زا هستند در نتیجه علاوه بر نشانه‌های بیولوژیکی، پیامدهای روان‌شناختی نسبتاً عمومی در همه‌ی بیماری‌های قلبی وجود دارد (۵، ۶). یکی از این پیامدهای روان‌شناختی هیجان‌ها هستند. هیجان‌ها ممکن است از چند مسیر بر سلامت قلب و عروق تأثیر بگذارند. مسیرهای مشخص ممکن است شامل بیش‌فعالی

با توجه به اطلاعات سازمان بهداشت جهانی بیماری‌های قلب عروقی علت اصلی مرگ‌ومیر در سراسر جهان محسوب می‌شود و مردم جهان بیش از هر چیز، بر اثر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی جان خود را از دست می‌دهند (۱). در ایران نیز سهم بیماری‌های قلبی از مرگ‌ومیر کلی حدود ۳۹ درصد است (۲). این بیماری یکی از عمومی‌ترین و پرهزینه‌ترین بیماری‌ها محسوب می‌شود (۳). عوامل خطر مرسوم (مانند سیگار کشیدن، فشارخون، کلسترول بالا،

^۱ کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

^۲ دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (نویسنده‌ی مسئول)

^۳ استادیار، فوق تخصص قلب و عروق، گروه قلب و عروق، بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

^۴ دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

^۵ دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

است که کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش نشانه‌های اضطراب، افسردگی و افزایش خلق مثبت و کیفیت زندگی بالا مؤثر است (۲۱).

در این راستا الکساندره و همکاران در پژوهشی که باهدف بررسی تأثیر آموزش ذهن آگاهی و یوگا در افراد در معرض خطر بیماری‌های قلبی-عروقی صورت گرفته بود، نشان دادند که تمرینات ذهن آگاهی و یوگا، آرام‌سازی با ورزش‌های سبک نه تنها باعث کاهش قابل توجه هیجان‌های منفی در این بیماران شد، بلکه باعث افزایش در بهزیستی اشخاص با عوامل خطر ساز برای بیماری آترواسکلروزیس گردید (۲۲). نتایج مطالعات اسکات و همکاران نشان داده است که هرچه ذهن آگاهی افزایش پیدا کند به موازات آن، آرامش فرد، عملکرد انطباقی فرد، توانایی‌های عاطفی، و مدیریت و کنترل احساسات خود و دیگران نیز افزایش پیدا می‌کند (۲۳). بررسی‌ها نشان داده که آموزش ذهن آگاهی گروهی تأثیر معناداری در کاهش علائم آسیب‌شناسی روانی در مردان مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب دارد (۲۴). مطالعه کابات زین نشان داد که درمان حضور ذهن در افزایش آرام بخشی عضلانی و کاهش نگرانی، استرس و اضطراب بیماران جسمی مؤثر می‌باشد (۲۵).

با توجه به این که برخی از پژوهشگران معتقدند، راهبردهای تنظیم هیجانی شناختی هیجان ممکن است یکی از فرایندهای زیربنایی اثربخشی درمان‌های مبتنی بر ذهن آگاهی باشد (۲۶) و از آنجایی که در زمینه ارتباط سه مؤلفه‌ی تنظیم هیجان با ذهن آگاهی و اضطراب وجودی در بیماران قلبی عروقی با یکدیگر در ایران پژوهشی یافت نشد؛ و از طرفی دیگر با توجه به اهمیت متغیرهای مورد بحث (تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی، اضطراب وجودی) و ارتباط آن با سلامت روانی و جسمانی افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و افراد سالم و طی کردن مسیر بهتر در عرصه‌های بالینی در جهت انتخاب راهبردهای درمانی مؤثر و به کارگیری راهکارهای پیشگیرانه مناسب برای افرادی که دچار بیماری‌های قلب و عروقی می‌باشند، ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر را مشخص می‌کند.

با توجه به مطالب مطرح شده در بالا، مسئله کنونی ما در این تحقیق این است که آیا بین تنظیم هیجانی با ذهن آگاهی و اضطراب وجودی در بیماران قلبی عروقی و افراد سالم در هریک از متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر.

مواد و روش کار

مطالعه حاضر از نوع پژوهش‌های علی-مقایسه ای است. در این پژوهش جامعه مورد مطالعه کلیه بیماران قلبی عروقی و همرازان بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان طالقانی تهران در سال ۱۳۹۵ می‌باشد. در این راستا ۶۱ نفر مبتلا به بیماری قلبی (۲۹ مرد و ۳۲

سیستم عصبی سمپاتیک یا محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال (HPA) باشد. مسیر دیگر ممکن است شامل مسیر غیرمستقیم رفتاری مانند سیگار کشیدن و رژیم غذایی با چربی بالا، مصرف الکل، افزایش شاخص توده بدن و کم کردن فعالیت فیزیکی باشد (۴).

تنظیم هیجانی نیز یکی از سازه‌های مهم روان‌شناختی است که در دو دهه‌ی گذشته توجهات تجربی و نظری فراوانی را به خود جلب کرده است (۷). منظور از تنظیم هیجان متغیری است که بر بد تنظیمی هیجانی و نقص در تنظیم هیجان دلالت دارد. به عبارتی تنظیم هیجان، فرایندی فراتشخیصی و فرا نظری است که طیف وسیعی از اشکال آسیب‌شناسی روانی از منظر رویکردهای نظری متنوع را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که به افراد اجازه نظارت، ارزشیابی و تعدیل ماهیت و طول مدت پاسخ‌های هیجانی را می‌دهد (۸).

بر اساس یک مطالعه پیگیری ده‌ساله بر روی ۱۷۳۹ زن و مرد، عواطف و هیجانات مثبت با بروز بیماری عروق کرونری و رویدادهای قلبی پرخطر رابطه معکوس و منفی داشته است (۹). بررسی‌ها نشان داده است که هیجان‌های خاصی مانند اضطراب به صورت بالقوه عوامل خطر مهمی برای بیماری‌های قلبی عروقی هستند (۱۰). مروری بر تحقیقات گذشته نشان می‌دهد که به‌طور کلی توجه شایانی به اضطراب و ارتباط آن با بیماری‌های قلبی عروقی شده است (۱۱-۱۳) اما به متغیری چون اضطراب وجودی توجه اندکی شده است این در صورتی است که پژوهش‌های تجربی نیز ارتباط معنادار اضطراب وجودی با بیماری‌های روانی را تأیید می‌کنند (۱۶-۱۴) فرا تحلیلی که مشتمل بر ۲۰ تحقیق در رابطه با بیماری قلبی-عروقی بود، نشان داد که اضطراب به‌طور ویژه با مرگ‌ومیر قلبی ارتباط دارد؛ چنان‌که افراد مضطرب ۴۸ درصد بیش‌تر با افزایش احتمال خطر با مرگ قلبی مواجه هستند (۱۳). بررسی‌ها نشان داده است که افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی به‌طور تقریبی سه برابر بیش‌تر شیوع بیماری‌های قلبی-عروقی را از خود نشان می‌دهند (۱۷).

از سوی دیگر ذهن آگاهی به معنای توجه کردن ویژه و هدفمند، در زمان کنونی و خالی از پیش‌داوری و قضاوت است. در ذهن آگاهی فرد در هر لحظه از شیوه‌ی ذهنی آگاه می‌شود و مهارت‌های شناسایی شیوه‌های مفیدتر را فرامی‌گیرد (۱۸). سیگل ذهن آگاهی را روشی برای زندگی بهتر، تسکین دردها و غنابخشی و معنادار سازی زندگی تعریف می‌کند (۱۹) ذهن آگاهی سبب افزایش پذیرش، ایجاد حس هیجانی به‌دوراز قضاوت و با احساس گناه کم‌تر و پی بردن به این موضوع می‌شود که نیازی نیست هیجان‌ها کنترل یا سرکوب شوند، بلکه می‌توان آن‌ها را تحمل و تجربه کرد (۲۰). بررسی‌ها نشان داده

پرسش‌نامه پنج عاملی ذهن آگاهی (FFMQ): پرسشنامه مذکور توسط بائر و همکاران (۲۰۰۶)، از تلفیق ۵ پرسش‌نامه ذهن آگاهی ایجاد شده است و ۵ عامل ذهن آگاهی را با ۳۹ عبارت، مورد واریسی قرار می‌دهد. بائر و همکاران (۲۰۰۶) همسانی درونی عامل‌ها را مناسب و ضریب آلفا برای غیر واکنشی بودن را برابر ۰،۷۵، توصیف را برابر ۰،۹۱، مشاهده را برابر ۰،۸۳، عمل با هشیاری را برابر ۰،۸۷، غیر قضاوتی بودن را برابر ۰،۸۷، گزارش کرده‌اند. بائر و همکاران (۲۰۰۶)، همبستگی بین عامل‌ها را نیز متوسط ولی معنادار و در طیفی بین ۰،۱۵ تا ۰،۳۴ گزارش کرده‌اند. (۳۱) هم‌چنین در مطالعه‌ای که بر روی اعتباریابی و پایایی این پرسش‌نامه در ایران انجام گرفت، ضریب همبستگی آزمون-بازآزمون پرسش‌نامه FFMQ در نمونه ایرانی بین ۰،۵۷ تا ۰،۸۴ (مربوط به عامل غیر قضاوتی بودن) و ۰،۸۴ (عامل مشاهده) مشاهده گردید. (۳۱)

پرسش‌نامه اضطراب وجودی (EAI): پرسشنامه اضطراب وجودی گود این مقیاس ۳۲ ماده‌ای توسط گود و گود (۱۹۷۴) ساخته شده و گنجی (۱۳۸۸) آن را به فارسی ترجمه نمود. حالت روایی این پرسشنامه را با همبسته کردن با آزمون‌های هدفمندی در زندگی، پیگردی اهداف معرفتی، و افسردگی محاسبه کرد. همبستگی نمره مقیاس اضطراب وجودی با ترکیب نمره سه پرسشنامه پیش‌گفته ۰،۶۶ بود. معینی (۱۳۸۹) روایی محتوایی خوبی را برای آزمون گزارش نمود. هم‌چنین از طریق تحلیل مواد نیز روایی این آزمون را آزمون به‌نحوی که همبستگی بالایی بین کلیه‌ی سؤال‌ها و نمره‌ی کل آزمون گزارش کرد. (۳۲)

هم‌چنین نورعلی زاده و جان بزرگی (۳۳) این آزمون را در پژوهش خود به روش آلفای کرونباخ اعتباریابی کردند که ضریب آلفای برابر با $a=0.888$ به دست آوردند

یافته‌ها

اطلاعات و یافته‌های جمعیت شناختی گروه نمونه مانند سن، جنسیت، وضعیت تأهل و تحصیلات به تفکیک بیماران قلبی و گروه کنترل در جدول ۱ گزارش شده است.

از بین بیماران واجد شرایط با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به تمام آزمودنی‌ها توضیحات یکسان و واضح در خصوص پر کردن ابزارهای پژوهش و اینکه ورود و یا خروج از پژوهش کاملاً اختیاری خواهد بود؛ داده شد. و در مقابل ۶۳ نفر از افراد سالم (۲۷ مرد و ۳۶ زن) که از همراهان بیماران که واجد ملاک‌های ورود به این پژوهش بودند جهت مقایسه انتخاب شدند. تعداد نمونه‌های پژوهش بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کوهن و همکاران (۲۷) با اطمینان ۹۵ و توان ۹۰ درصد و با توجه به سایر مطالعات (۲۸، ۲۹) برآورد شد. ملاک‌های ورود به پژوهش: تشخیص اولیه یکی از بیماری‌های قلبی عروقی توسط پزشک متخصص برای گروه بیماری‌های قلبی، عدم وجود بستری به‌واسطه‌ی بیماری‌های قلبی عروقی در گروه افراد سالم، تحصیلات سوم راهنمایی به بالا، عدم وجود شواهدی مبنی بر سوء‌مصرف مواد در بیمار، عدم سابقه‌ی بستری به‌واسطه‌ی بیماری‌های طیف اسکیزوفرنی، دوقطبی، و یا اختلالات شناختی ارگانیک در نظر گرفته شد.

ابزارهای پژوهش:

پرسش‌نامه تنظیم هیجانی (DERS): این مقیاس، یک شاخص خودگزارشی برای ارزیابی دشواری‌های موجود در تنظیم هیجانی و دارای ۳۶ عبارت و ۶ خرده مقیاس (عدم پذیرش پاسخ‌های هیجانی، دشواری‌های دست زدن به رفتار هدفمند، دشواری‌های کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و فقدان شفافیت هیجانی) است. این مقیاس همسانی درونی بالا (آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ۰/۹۳) دارد و در رابطه با روایی، بررسی‌ها نشانگر روایی سازه و پیش‌بین کافی برای این مقیاس است. همسانی درونی فرم ترجمه‌شده به فارسی موردبررسی قرار گرفته شده است. نتایج این مطالعه همسانی درونی بالایی را برای کل مقیاس نشان می‌دهد. هم‌چنین همسانی درونی برای خرده مقیاس‌های عدم پذیرش ۰/۷۵، اهداف ۰/۷۴، تکانه ۰/۷۶، آگاهی ۰/۶۳، راهبردها ۰/۷۴ و شفافیت ۰/۸۵ در یک جمعیت ایرانی به دست آمد. (۳۰)

جدول (۱): شاخص‌های جمعیت شناختی بیماران قلبی و گروه کنترل

| متغیر | سطح | بیماران قلبی | افراد سالم |
|-------|------------------|--------------|------------|
| سن | میانگین سن | ۴۵،۱۸ | ۴۱،۴۲ |
| | انحراف استاندارد | ۹،۶ | ۸،۷۳ |
| جنسیت | مرد | ۲۹ | ۲۷ |
| | زن | ۳۲ | ۳۶ |

| | | | |
|----|----|------------|------------|
| ۱۹ | ۱۹ | مجرد | وضعیت تأهل |
| ۴۴ | ۴۲ | متأهل | |
| ۱۷ | ۷ | زیر دیپلم | تحصیلات |
| ۳۶ | ۳۷ | دیپلم | |
| ۹ | ۱۳ | لیسانس | |
| ۱ | ۴ | فوق لیسانس | |

جدول (۲): آزمون کولموگروف اسمیرنوف

| متغیر | اضطراب وجودی | ذهن آگاهی | دشواری هیجانی |
|-------------|--------------|-----------|---------------|
| شخص | | | |
| آماره آزمون | ۰/۰۶۳ | ۰/۰۶۴ | ۰/۲۲۵ |
| معناداری | ۰/۲۰۰ | ۰/۲۰۰ | ۰/۰۰۰ |

همچنین میانگین و انحراف معیار نمره‌های بیماران قلبی-عروقی و افراد سالم در خرده مقیاس‌های تنظیم هیجانی (عدم پذیرش، دشواری در انتخاب اهداف، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دسترسی محدود به راهبردهای هیجانی، عدم شفافیت هیجانی، نمره کل دشواری هیجانی) و خرده مقیاس‌های ذهن آگاهی (مشاهده، توصیف، عمل با هشیاری، غیرواکنشی بودن، غیرقضاوتی بودن، کل نمره ذهن آگاهی) و اضطراب وجودی در جدول ۳ ارائه شده است.

با توجه به این مطلب که پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه‌ای بوده بدین منظور برای مقایسه‌ی بین گروه‌ها ابتدا ویژگی‌های مربوط به پارامتریک یا ناپارامتریک بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول ۲ ارائه شده است. با توجه به نتایج جدول ۲ معناداری آزمون کم‌تر از ۰/۰۵ می‌باشد که نشان‌دهنده‌ی عدم نرمال بودن داده‌هاست به این خاطر از آزمون معادل ناپارامتریک T-test (یو من ویتنی) استفاده شد.

جدول (۳): شاخص‌های خرده مقیاس‌های پژوهش به تفکیک گروه‌های مطالعه و نتایج مطالعه

| نمونه | بیمار N=61 | سالم N=63 | من-ویتنی یو | معناداری |
|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------|
| شاخص | میانگین انحراف معیار | میانگین انحراف معیار | | |
| مشاهده | ۲۰ ± ۲/۲۴ | ۲۳ ± ۴/۳۳ | ۹۳۲ | P<0.001 |
| توصیف | ۲۵/۲ ± ۲/۷۹ | ۲۵/۶۸ ± ۳/۱۵ | ۱۷۸۹/۵۰۰ | p>0.507 |
| عمل با هشیاری | ۲۹/۱۸ ± ۳/۳۷ | ۲۰/۴۴ ± ۴/۷۳ | ۲۵۶ | P<0.001 |
| غیرواکنشی بودن | ۱۵/۲۶ ± ۲/۳۵ | ۲۱/۴۴ ± ۳/۱۵ | ۲۳۱/۵۰۰ | P<0.001 |
| غیرقضاوتی بودن | ۲۹/۶۳ ± ۳/۵۲ | ۲۴/۳۱ ± ۴/۹۴ | ۷۱۹/۵۰۰ | P<0.001 |
| کل نمره ذهن آگاهی | ۱۱۹/۳۴ ± ۶/۴۷ | ۱۱۴/۹ ± ۹/۲ | ۱۳۴۸ | P<0.004 |
| عدم پذیرش | ۲۲/۵۵ ± ۳/۱۱ | ۹/۸۵ ± ۱/۹۳ | ۰/۰۰۰ | P<0.001 |
| دشواری در انتخاب اهداف | ۲۶/۶۷ ± ۳/۴۳ | ۱۸/۴ ± ۵/۰۷ | ۱۷۱/۵ | P<0.001 |

| | | | | |
|---------|---------|---------------|---------------|----------------------------------|
| P<0.001 | ۵/۵ | ۹/۷۷ ± ۲/۰۴ | ۱۹/۱۴ ± ۲/۲۱ | دشواری در کنترل تکانه |
| P<0.001 | ۰/۰۰۰ | ۱۱/۸ ± ۲/۱۷ | ۲۴/۱۹ ± ۲/۴۸ | فقدان آگاهی هیجانی |
| P<0.001 | ۶۱ | ۱۴/۴۲ ± ۴/۷ | ۲۹/۷۷ ± ۳/۷۸ | دسترسی محدود به راهبردهای هیجانی |
| P<0.001 | ۵۱۰ | ۱۳/۸ ± ۲/۰۲ | ۱۶/۷۰ ± ۱/۵۴ | عدم شفافیت هیجانی |
| P<0.001 | ۳۲ | ۷۴/۶۶ ± ۱۰/۹۵ | ۱۴۱/۴ ± ۱۲/۳۳ | نمره کل دشواری هیجانی |
| P<0.001 | ۶۲۶/۵۰۰ | ۷/۰۱ ± ۴/۲۴ | ۱۳/۰۸ ± ۴/۵۸ | اضطراب وجودی |

پژوهشی با عنوان «خطر بیماری قلبی عروقی در مردان با کنترل هیجانی ضعیف: یک مطالعه آینده‌نگر» نتیجه گرفتند که عوامل روانی اجتماعی زیادی با بیماری قلبی عروقی ارتباط دارند آن‌ها این فرضیه را مطرح و مورد آزمون قرار دادند که ممکن است زیربنای این عوامل توانایی‌های تنظیم هیجان باشد. هدف آن‌ها این بود که تعیین کنند که کنترل هیجانی ضعیف، خطر این بیماری را در بلندمدت پیش‌بینی می‌کند. در این مطالعه ملی ۴۶۳۹۳ مرد که برای خدمت نظامی فراخوانده شده بودند، از نظر میزان کنترل هیجانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بعد از ۳۸ سال پیگیری (۲۰۰۹ تا ۱۹۷۱)، نتایج نشان داد که کنترل هیجانی ضعیف با میزان نسبت خطر ۱،۳۱ خطر بیماری قلبی عروقی را افزایش می‌دهد (۳۴). در پژوهشی که توسط پیپر و بروس چت انجام شد پیشنهاد کردند که عاطفه منفی یا احساس پریشانی، با طولانی شدن واکنش قلبی-عروقی مرتبط به استرس، همراه است و بنابراین بهبودی قلبی-عروقی را کاهش می‌دهد (۳۶) استپتو، واردل و مارمات نشان دادند که عواطف مثبت با فعالیت کمتر سیستم‌های نرواندوکرین، التهابی و قلبی عروقی همراه است (۳۵).

با توجه به تفاوت معنادار بین تنظیم هیجانی در بیماران قلبی عروقی و افراد سالم می‌توان این‌گونه استنباط کرد بیماران قلبی عروقی نسبت به افراد عادی گرایش بیش‌تری به داشتن پاسخ‌های ثانوی منفی به هیجان‌ات منفی، یا عدم پذیرش واکنش‌ها به پریشانی فردی را دارا هستند و به دلیل فقدان آگاهی هیجانی و دسترسی محدود به راهبردهای هیجانی مناسب در برخورد با موقعیت‌هایی که نیاز به تنظیم هیجانی است، با مشکلاتی مواجه‌اند، همین‌طور در تمرکز کردن و به اتمام رساندن تکالیف، و کنترل تکانه به هنگام تجربه کردن هیجان‌ات منفی با دشواری‌هایی روبرو هستند که این موارد منجر به دشواری در تنظیم هیجان و عاطفه منفی در این افراد می‌شود که سطوح کورتیزول را در بدن افزایش می‌دهد. بنابراین،

با توجه به نتایج معناداری جدول ۳ در خرده مقیاس‌های اضطراب وجودی، تنظیم هیجانی (عدم پذیرش، دشواری در انتخاب اهداف، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دسترسی محدود به راهبردهای هیجانی، عدم شفافیت هیجانی، نمره کل دشواری هیجانی) و همچنین در خرده مقیاس‌های ذهن آگاهی (مشاهده، عمل با هشیاری، غیرواکنشی بودن، غیرقضاوتی بودن، کل نمره ذهن آگاهی) تفاوت معناداری در سطح $P < 0.001$ بین دو گروه مشاهده شد اما در خرده مقیاس توصیف تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نگردید ($p > 0.507$).

بحث و نتیجه گیری

هدف اساسی مطالعه‌ی حاضر، بررسی تطبیقی تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی، اضطراب وجودی در بیماران قلبی عروقی و افراد سالم بود. در این راستا یکی از یافته‌های این پژوهش نشانگر این مطلب است که افراد مبتلا به بیماری قلبی در مقایسه با افراد سالم، نمرات بالاتری در دشواری در تنظیم هیجانی دارند که این یافته با نتایج پژوهش‌های داویدسون و همکاران (۹) و پوتیجک (۳۴) استپتو، واردل و مارمات (۳۵) پیپر و بروس چت (۳۶) مطابقت دارد. همان‌گونه که اذعان گردید تنظیم هیجان مدیریت رفتار، شناخت، توجه، فیزیولوژی یا راهبردهای هیجان، برای پایان دادن، باقی ماندن یا تغییر تجربه هیجانی یا ابراز آن را شامل می‌شود. (۳۷) تنظیم هیجان کارآمد با پیامدهای خوبی در زمینه سلامت روان همراه است. برکینگ و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهش خود نشان دادند که پذیرش، تحمل و تعدیل فعال هیجان‌های منفی بر سلامت روان و پیامدهای درمانی تأثیرگذار است و مداخلاتی که شامل مهارت‌های عمومی تنظیم هیجانی هستند اثرگذاری مداخلات روان‌درمانی را افزایش می‌دهند. از سوی دیگر مشکلات در تنظیم هیجان، باعث آشفتگی‌های بیش‌تری می‌شود که خود می‌تواند به اختلال‌های هیجانی و علائم بیماری بینجامد (۳۷، ۳۸) پوتیجک و همکاران در

افرادی که عواطف منفی را تجربه می‌کنند برای افزایش فشارخون و بیماری قلبی مستعدتر می‌گردند.

یافته‌ها بیانگر این نکته بودند که بین ذهن آگاهی مبتلایان بیماری قلبی عروقی و افراد سالم تفاوت معنادار وجود دارد. که با یافته‌های پژوهش الکساندره (۲۲) لوکس (۴۰) همسو می‌باشد. کمبود ذهن آگاهی در بیماران قلبی عروقی این افراد را مستعد تجربه‌ی فشار روانی بیش‌تر می‌کند که این خود به دامن زدن به مشکلات قلبی عروقی می‌شود. الکساندره و همکاران در پژوهشی که باهدف بررسی تأثیر آموزش ذهن آگاهی و یوگا در افراد در معرض خطر بیماری‌های قلبی-عروقی صورت گرفته بود، نشان دادند که تمرینات ذهن آگاهی و یوگا، آرام‌سازی با ورزش‌های سبک نه تنها باعث کاهش قابل‌توجه هیجان‌های منفی در این بیماران شد، بلکه باعث افزایش در بهزیستی اشخاص با عوامل خطرناک برای بیماری آترواسکلروزیس گردید (۲۲) لوکس و همکاران (۲۰۱۵) در پژوهشی باهدف تعیین رابطه ذهن آگاهی با بیماری قلبی-عروقی، سه مؤلفه اصلی ذهن آگاهی شامل کنترل توجه (توجه بر تجربیات مرتبط با ریسک قلبی مانند رژیم غذایی، فعالیت‌های جسمانی)، تنظیم هیجانی (پاسخ بهبودیافته به استرس، خودکارآمدی و مهارت در ترک سیگار) و خودآگاهی (مانند آگاهی از حس‌های جسمانی که منجر به عامل خطرناک در بیماری قلبی-عروقی می‌شود) را مرتبط با خطر ابتلا به این اختلال دانسته‌اند (۴۰). ذهن آگاهی به ما یاری می‌دهد تا این نکته را درک کنیم که هیجان‌ات منفی ممکن است رخ دهد، اما جزء ثابت و دائمی شخصیت نیستند. همچنین به فرد این امکان را می‌دهد تا به‌جای آن‌که به رویدادها به‌طور غیرارادی و بی‌تأمل پاسخ دهد، با تفکر و تأمل پاسخ دهد (۴۱). در نتیجه می‌توان این‌گونه استنباط کرد که در ذهن آگاهی کنترل و اداره‌ی هیجان‌ات مدنظر قرار می‌گیرند و فرد باید به افکار و احساسات خودآگاهی و حضور ذهن کامل داشته باشد. از آنجایی‌که بیماران قلبی-عروقی کم‌تر با لحظه‌ی حال در تماس هستند. در این راستا ذهن آگاهی و آموزش آن از طریق کنترل توجه، مؤثر واقع می‌شود و به فرد بیمار کمک می‌کند علاوه بر هوشیاری کامل از افکار و احساساتش و پذیرش آن‌ها بدون داوری در یک وضعیت آرامش و تمرکز قرار گیرد و توانایی کنترل افکار، اضطراب و هیجان‌ات خود را به دست آورد، کسب این توانایی باعث شده که فرد احساس کنترل بیشتری در تمام امور زندگی خود داشته باشد و به‌جای دادن پاسخ‌های خودکار منفی، در موقعیت‌های اضطراب‌آور با کنترل، آرامش و آگاهی بیشتری پاسخ دهد و با مشکلات، بهتر مقابله کند. سرانجام این یافته‌ها نشان داد که بین اضطراب وجودی مبتلایان به بیماری قلبی عروقی و افراد سالم تفاوت معنادار وجود دارد به این معنی که بیماران قلبی عروقی از اضطراب وجودی بالاتری نسبت به افراد عادی

برخوردار هستند. پژوهشی که مستقیماً اضطراب وجودی را در بیماران قلبی عروقی و افراد سالم مقایسه کند یافت نشد اما با توجه به همبستگی بالا بین اضطراب وجودی و اضطراب مرضی می‌توان نتایج پژوهش حاضر را با یافته‌های پژوهش‌هایی که اضطراب مرضی را در بیماران قلبی عروقی بررسی کرده‌اند (۱۳، ۴۲) همسو دانست. فرا تحلیلی که مشتمل بر ۲۰ تحقیق در رابطه با بیماری قلبی-عروقی بود، نشان داد که اضطراب به‌طور ویژه با مرگ‌ومیر قلبی ارتباط دارد؛ چنان‌که افراد مضطرب ۴۸ درصد بیش‌تر با افزایش احتمال خطر با مرگ قلبی مواجه هستند. با توجه به نتایج این تحقیقات، اضطراب مرگ در بین بیماران قلبی-عروقی شیوع بالایی را نشان می‌دهد (۱۳). مطالعه دیگری با فراتحلیل ۲۰ مطالعه بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹ با میانگین پیگیری حدوداً ۱۱ سال و بر روی ۲۴۹۸۴۶ نفر بین اضطراب و بیماری عروقی کرونری رابطه‌ی معنی‌داری را نشان می‌دهد، بر طبق نتایج این فراتحلیل اضطراب به نظر به‌تنهایی یک عامل مستقل خطرناک برای بروز بیماری عروقی کرونری و مرگ‌ومیرهای قلبی است (۱۳) در مطالعه‌ای که گوستاد و همکاران (۲۰۱۳) که بر روی ۵۷۹۵۳ بیمار قلب انجام دادند نشان داده شد که بیماران دارای نشانگان اضطرابی ۲۰-۳۰ درصد بیش‌تر در معرض خطر اولین حمله‌ی قلبی قرار دارند. (۴۲) در نتیجه می‌توان گفت که اضطراب یکی از هیجان‌های منفی است که با بیماری عروقی کرونری قلب و پیامدهای زیان‌بار متعاقب بیماری ارتباطی نزدیک دارد (۱۳). و یکی از شایع‌ترین پاسخ‌های روان‌شناختی بیماران به حوادث قلبی - عروقی است (۴۳) اضطراب با افزایش خطر مرگ‌ومیر در بیماران قلبی عروقی رابطه دارد (۴۴). همچنین اضطراب طولانی‌مدت می‌تواند خطر مرگ قلبی ناگهانی را افزایش دهد (۴۵). این در حالی است که استرجح و حاملی در پژوهش‌های خود، بین اضطراب وجودی و رگه‌ی اضطرابی رابطه‌ی معنادار یافته‌اند (۱۴). از سوی دیگر اضطراب مرگ منجر به تشدید پاسخ‌های مضطرب در افرادی که مشکلات مرتبط با اضطراب دارند می‌شود (۴۶). بررسی‌ها نشان داده است که افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی به‌طور تقریبی سه برابر بیش‌تر شیوع بیماری‌های قلبی-عروقی را از خود نشان می‌دهند (۱۷).

به دلیل تأثیر به‌سزای عوامل روان‌شناختی در بیماری‌های قلبی عروقی، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال که آیا تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی و اضطراب وجودی در بیماران قلبی و افراد سالم متفاوت است یا خیر، به این نتیجه دست یافت که تفاوت دو گروه مبتلا به بیماری قلبی و افراد سالم در هر سه متغیر پژوهش معنادار بود. در نتیجه می‌توان این‌گونه استنباط کرد که تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی و اضطراب وجودی از عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار در اختلالات قلبی عروقی است و باید به نقش آن‌ها در این

قرار گیرد و در پروتکل‌های درمان روان‌شناختی بیماران قلبی-عروقی به مؤلفه‌ی اضطراب وجودی و سایر متغیرهای این پژوهش توجه بیش‌تری گردد. لازم به ذکر است کد اخلاق این مقاله IR.SBMU.MSP.REC.1395.322 می‌باشد.

تشکر و قدردانی

از همه‌ی همکاران و شرکت‌کنندگان این پژوهش که در راستای اهداف این پژوهش با ما همکاری نمودند، کمال تشکر را داریم. لازم به ذکر است که مقاله حاضر، برگرفته از پایان‌نامه دانشجویی آقای میثم نیک‌دانش با شماره ثبت ۴۳۹ م در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

References:

- World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs) Retrieved from: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/2015>
- Ahmadi A, Soori H, Sajjadi H. Modeling of in hospital mortality determinants in myocardial infarction patients, with and without type 2 diabetes, undergoing pharmaco-invasive strategy: the first national report using two approaches in Iran. *Diabetes Res Clin Pract* 2015;108(2): 216-22.
- Reddy K.S. Cardiovascular disease in non-western countries. *N Engl J Med* 2004;350: 2438-40.
- Kubzansky LD, Kawachi I. Going to the heart of the matter: do negative emotions cause coronary heart disease?. *J Psychosom Res* 2000;48(4): 323-37.
- Murberg T, Bru E. Social relationships and mortality in patients with congestive heart failure. *J Psychosom Res* 2001;51: 521-7.
- Gottlieb SS, Khatta M, Friedmann E, Einbinder L, Katzen S, Baker B, et al. The influence of age, gender, and race on the prevalence of depression in heart failure patients. *J Am Coll Cardiol* 2004;43(9): 1542-9.
- Dennis T, Hajcak G. The late positive potential: A neurophysiological marker for emotion regulation in children. *J Psychol Psychiatry* 2009;. 50(11): 1373-83.
- Johnson SL, Carver CS, Fulford D, Kring AM. Goal dysregulation in the affective disorders, Emotion Regulation and psychopathology: A Transdiagnostic Approach to Etiology and Treatment. New York: Guilford Press; 2010. P.204-28.
- Davidson K.W, Mostofsky E, Whang W. Don't worry, be happy: positive affect and reduced 10 year incident coronary heart disease: The Canadian Nova Scotia Health Survey. *Euro Heart J* 2010;31: 1065-70.
- Nakamura S, Kato K, Yoshida A, Fukuma N, Okumura Y, Ito H, et al. prognostic value of depression, anxiety, and anger in hospitalized cardiovascular disease patients for predicting adverse cardiac outcomes. *Am J Cardiol* 2013;111(10): 1432-6.
- Frasere-Smith N, Lespe'rance F. Depression and Anxiety as Predictors of 2-Year Cardiac Events in Patients With Stable Coronary Artery Disease. *Arch Gen Psychiatry* 2008;65(1): 62-71.
- Shen BJ, Avivi YE, Todaro JF, Spiro A, Laurenceau JP, Ward KD, et al. Anxiety characteristics independently and prospectively predict myocardial infarction in men the unique

- contribution of anxiety among psychologic factors. *J Am College Cardiol* 2008;51: 113-9.
13. Roest AM, Martens Ej, Jonge P, Denollet J. Anxiety and risk of incident coronary heart disease: A meta-analysis. *J Am College Cardiol* 2010;56(1): 38-46.
 14. Shreve-Neiger, Edelstein BA. Religion and anxiety: A critical review of the literature In *Religiosity and anxiety*. *J Soc Psychol* 108: 137-8.
 15. Hullett AM. A Validation Study of the Existential Anxiety Scale, Middle Tennessee Psychological Association Nashville. Tennessee: 1994.
 16. Berman SL, Weems CF, Stickle TR. Existential anxiety in adolescents: prevalence, structure, association with psychological symptoms and identity development. *J Youth Adolescence* 2006;35(3): 303-10.
 17. Vogelzangs N, Seldenrijk A, Beekman AT, van Hout HP, de Jonge P. Cardiovascular disease in persons with depressive and anxiety disorders. *J Affect Disord* 2010;125(1-3): 241-8.
 18. Segal ZV, Williams J, Teasdale JD. Mindfulness-based cognitive therapy for depression: a new approach to preventing relapse. 2002.
 19. Siegel RD. *The mindfulness Solution (every day practices for every day problems)*. New York: Guilford; 2010.
 20. Armstrong L, Rimes K. Mindfulness-based cognitive therapy for neuroticism (stress vulnerability): A pilot randomized study. *Behav Ther* 2016;47(3): 287-98.
 21. Nyklicek I, Vingerhoets AD, Mercel Zeelenberg M. *Emotion Regulation and well-bing* New York, Dordrecht Heidelberg London. 2011. P. 101-15.
 22. Alexandre D, Fox E, Golubic M, Morledge T, Fox JEB. Mindfulness, yoga and cardiovascular disease. *leve Clin J Med*. 2010;77: 85.
 23. Schutte NS, Malouff JM. Emotional intelligence mediates the relationship between mindfulness and subjective well-being. *Pers Individ Dif* 2011;5: 1116-9.
 24. Jahangirpour M, Musavi SV, Rezaei S, Khosrojavid M, Salari A. The effectiveness of group mindfulness training on reducing symptoms of psychopathology and electrocardiographic changes in patients with coronary heart disease. *J Fundamen Mental Health* 2014;15(4): 263-73.
 25. Kabat-Zinn J. Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future. *Clinical Psychology: Sci Practice* 2003;10: 144-56.
 26. Robins CJ, Keng SL, Ekblad AG, Brantley JG. Effects of mindfulness-based stress reduction on emotional experience and expression: a randomized controlled trial. *J Clin Psychol* 2012;68(1): 117-31.
 27. Cohen L; Manion L; Morris K. *Research methods in educational by routleolege flamer*. 5th edition.
 28. Wallis M, Boxer E, Chaboyer W, Grant S, Bardsley K, Carlson M, et al. Health-related quality of life and coping in chronic illness: A pilot study. *J Gen Int Med* 2006;15(11): 769-89.
 29. Rahimi R, Arefi M, Golmohammadian M. Comparing personality dimensions and coping strategies in healthy individuals and heart patients. *J Shahid Sadoughi Univ Med Sci* 2016;23(10): 957-68.
 30. Alavi K, Modares M, Amini A, Salehi J. Effectiveness of group dialectical behavior therapy (based on core mindfulness distress tolerance and emotion regulation component) on depressive symptoms of depression in university students. *Q J Fundam Ment Health* 2013;13(2): 124-35.
 31. Ahmadvand Z, Heydarinasab L, Shairi M.R. Prediction of Psychological Well –Being Based onthe Comonents of Mindfulness. *Health Psychol* 2012; 1(2): 20-31.
 32. Marashi S.A, Taami A, Zargar Y. Effectiveness of Education spiritual intelligence on Psychological Well –Being, existantial anxiety and spiritual

- intelligence in university students. *J Psychol Chamran Univ* 2012;4: 63-80. (Persian)
33. Noorali zadeh M, Janbozorgi M. association existantial anxiety with anxiety disorder and comparison those in criminal, normal and religious individuals. *J Psychol Religion* 2010;3(2): 29-44. (Persian)
34. Potijk MR, Janszky I, Reijneveld SA, Falkstedt D. Risk of Coronary Heart Disease in Men With Poor Emotional Control: A Prospective Study. *Psychosom Med* 2016;78(1):60-7.
35. Steptoe A, Wardle J, Marmot M. Positive affect and health-related neuroendocrine, cardiovascular, and inflammatory processes. *Proc Natl Acad Sci USA* 2005;102(18):6508-12.
36. Pieper S, Brosschot JF. Prolonged stress-related cardiovascular activity: is there any? *Annals Behav Med* 2005;30: 91-103.
37. Gross JJ. *Handbook of Emotion Regulation*. New York, NY: Guilford Press; 2007.
38. Aldao A, Nolen-Hoeksema S, Schweizer S. Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. *Clin Psychol Rev* 2010;30: 217-37.
39. Cisler JM, Olatunji BO, Feldner MT, Forsyth JP. Emotion regulation and the anxiety disorders: an integrative review. *J Psychopathol Behav Assess* 2010;32: 68-82.
40. Loucks EB, Schuman-Olivier Z, Britton WB, Fresco DG, Brewer JA, Fulwiler C. Mindfulness and Cardiovascular Disease Risk: State of the Evidence, Plausible Mechanisms, and Theoretical Framework. *Curr Cardiol Rep* 2015;17: 112.
41. Emanuel AS, Updegraff JA, Kalmbach AD, Ciesla JA. The role of mindfulness facets in affective forecasting. *Pers Individ Dif* 2010;49(7): 815-18.
42. Gustad LT, Laugsand LE, Janszky I, Dalen H, Bjerkeset O. Symptoms of anxiety and depression and risk of acute myocardial infarction: the HUNT 2 study. *Eur Heart J* 2014;35(21):1394-403.
43. Frasure S. In-hospital symptoms of psychological stress as predictors of long-term outcomes after acute myocardial infarction in men. *Am J Cardiol* 1991;67: 121-7.
44. Watkins LL, Koch GG, Sherwood A, Blumenthal JA, Davidson JRT, O'Connor C, et al. Association of anxiety and depression with all-cause mortality in individuals with coronary heart disease. *J Am Heart Association* 2013;2: 1-10.
45. Holloway B. *Stress Can Increase Your Risk for Heart Disease*. New York: University of Rochester Medical Center; 2015.
46. Strachan E, Schimel J, Arndt J, Williams T, Solomon S, Pyszczynski T, et al. Terror mismanagement: evidence that mortality salience exacerbates phobic and compulsive behaviors. *Pers Soc Psychol Bull* 2007;33(8):1137-51.

EMOTION REGULATION MINDFULNESS AND EXISTENTIAL ANXIETY IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES: A COMPARATIVE STUDY

Meisam Nikdanesh¹, Mohammad Hassan Davazdah Emami^{2}, Mohammad Esmail Gheydari³, Maryam Bakhtiyari⁴, Abolfazl Mohamadi⁵*

Received: 12 Apr, 2017; Accepted: 21 Jun, 2017

Abstract

Background & Aims: The purpose of this study was to compare emotion regulation, mindfulness, existential anxiety in patients with cardiovascular diseases and healthy individuals.

Materials & Methods: In this case-control cross-sectional study, all cardiac patients who had referred to Taleghani hospital in Tehran over the year of 2016 were included. Out of this population, 61 patients with cardiovascular diseases were selected and 63 healthy subjects were selected from among the attendants of the patients. Instruments for collection of data comprised a demographic characteristics questionnaire, Difficult in Emotion Regulation Scale (DERS), five fact mindfulness questionnaire (FFMQ) and Existential Anxiety Inventory (EAI). To test the research hypothesis, Mann-Whitney U was used.

Results: There was a significant difference between the two groups, with cardiovascular disease and normal subjects in the emotion regulation, mindfulness and existential anxiety.

Conclusion: Emotion regulation, mindfulness and existential anxiety are psychological factors with a potential impact on cardiovascular diseases and their effect is suggested to be taken into account in such disorders.

Keywords: *Cardiovascular disease, Emotion regulation, Existential anxiety, Mindfulness*

Address: Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Tel: +989133258776

Email: davazdahemamy@gmail.com

SOURCE: URMIA MED J 2017; 28(6): 393 ISSN: 1027-3727

¹ MA of Clinical Psychology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

² Assistant Professor in Clinical Psychology, Psychology Department, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Corresponding Author)

³ Assistant Professor, Cardiovascular Diseases Department, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

⁴ Associate Professor in Clinical Psychology, Psychology Department, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

⁵ Assistant Professor in Clinical Psychology, Psychology Department, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran