

تأثیر مایع رویی سلول‌های فیبروبلاست و اندوتیال بر فنوتیپ و عملکرد سلول‌های دندریتیک و پاسخ پلاریزاسیون لنفوسیت‌های T

میثم گنجی بخش^{۱*}، وحید نجاتی^۲، معصومه اسدی^۳، نوروز دلیرژ^۴، فرح فرخی^۵

تاریخ دریافت: ۹۰/۰۹/۱۲ تاریخ پذیرش: ۹۰/۰۹/۱۵

چکیده

سابقه و هدف: قابلیت بالای سلول‌های دندریتیک در عرضه‌ی آنتی زن و عملکرد حرفه‌ای این سلول‌ها در انجام این وظیفه، محققان را بر آن داشت که این سلول‌ها را در درمان برخی بیماری‌ها نظیر سرطان و بیماری‌های عفونی و همچنین بیماری‌های خود ایمنی و جلوگیری از رد پیوند، بکار گیرند. هدف از این مطالعه بلوغ سلول‌های دندریتیک برای ایمنوتراپی تومور می‌باشد.

مواد و روش‌ها: تولید سلول‌های دندریتیک در دو مرحله صورت گرفت که در مرحله اول سلول‌های مونوسیت تحت تأثیر سیتوکاین های GM-CSF و IL-4 به سلول‌های دندریتیک نابالغ تبدیل شدند و در مرحله دوم سلول‌های دندریتیک نابالغ در حضور مایع رویی سلول‌های فیبروبلاست پوست (HSFPI3)، سلول‌های اندوتیال و رید ناف انسان (HUVECE)، CM و POLY-IC به عنوان عوامل بلوغ و عصاره سلول‌های سرطانی (k562) به عنوان آنتی زن به سلول‌های دندریتیک بالغ تبدیل شدند.

یافته‌ها: سلول‌های دندریتیک تولید شده دارای ویژگی‌های مناسب از لحاظ فنوتیپ، توانایی فاگوسیتوز، میزان تحریک تکثیر لنفوسیت‌های T بودند و قادر به ترشح مقادیر بالایی از سایتوکین IL-12 و IL-2 بودند.

بحث و نتیجه گیری: سلول‌های دندریتیک که تحت تأثیر مایع رویی سلول‌های اندوتیال و فیبروبلاست تولید گردیدند دارای فنوتیپ و عملکرد مطلوب بودند و باعث پلاریزاسیون لنفوسیت‌های T به سمت Th1 شدند.

واژه‌های کلیدی: سلول دندریتیک، سلول اندوتیال، لنفوسیت T، فیبروبلاست

مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و دوم، شماره ششم، ص ۵۵۹-۵۵۱، بهمن و اسفند ۱۳۹۰

آدرس مکاتبه: ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کد پستی: ۵۷۱۵۹۱۵۱۹۹ تلفن همراه: ۰۹۳۵۹۶۸۹۹۸۵

E-mail: meysam_ganjy@yahoo.com

مقدمه

تحریک پاسخ‌های ایمنی اولیه در لنفوسیت‌های T دست نخورده می‌باشدند (۱).

قابلیت بالای سلول‌های دندریتیک در عرضه‌ی آنتی زن و عملکرد حرفه‌ای این سلول‌ها در انجام این وظیفه، محققان را بر آن داشت که این سلول‌ها را در درمان برخی بیماری‌ها نظیر سرطان و بیماری‌های عفونی و همچنین بیماری‌های خود ایمنی و جلوگیری از رد پیوند، بکار گیرند (۲). سلول‌های دندریتیک نه تنها سبب القای تکثیر در

سلول‌های دندریتیک (DC)، سلول‌های حرفه‌ای عرضه کننده آنتی زن می‌باشند که دارای توانایی منحصر به فردی، در تحریک اولیه پاسخ‌های ایمنی می‌باشند. سلول‌های دندریتیک مسئول اخذ و انتقال اطلاعات از جهان خارج به سیستم ایمنی هستند. سلول‌های دندریتیک، سلول‌های عرضه کننده آنتی زن (APC) منحصر به فردی هستند و به همین دلیل به عنوان سلول‌های رائمه دهنده‌گانه‌ی زن حرفه‌ای (APC) نیز تلقی می‌شوند و این سلول‌ها دارای قابلیت

^۱ دانشجویان کارشناسی ارشد بافت شناسی و جنین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه (بوقیسنده مسئول)

^۲ استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

^۳ دانشجویان کارشناسی ارشد بافت شناسی و جنین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

^۴ استادیار گروه ایمنولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

^۵ استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

دندریتیک مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص گردد سایتوکین‌های موجود در مایع روی سلول‌های فیبروبلاست پوست و سلول‌های اندوتیال ورید ناف انسان چه تأثیری بر بلوغ و عملکرد سلول‌های دندریتیک می‌گذارند که باعث می‌شوند در شرایط آزمایشگاهی لنفوسيت‌های T به سمت TH1 یا TH2 سوق پیدا کنند.

مواد و روش‌ها

این مطالعه پژوهشی و تحلیلی به منظور تولید سلول‌های دندریتیک مناسب ایمنوتراپی تومور از خرداد سال ۱۳۸۸ تا آبان ۱۳۸۹ در Clean Room پژوهشکده‌ی زیست فناوری دانشگاه ارومیه صورت گرفت. این آزمایش‌ها در سه تکرار انجام گرفت. به منظور سنجش سلول‌های دندریتیک از تست‌های متفاوتی استفاده گشت. فنوتیپ این سلول‌ها به وسیله دستگاه فلوسایتومتری سنجش گردید. با بلوغ این سلول‌ها قدرت فاگوسیتوز کاهش می‌یابد که با استفاده از لاتکس بید قدرت فاگوسیته آن‌ها بررسی شد همچنین توانایی این سلول‌ها در تحریک لنفوسيت‌ها از طریق واکنش مختلط لوکوسیتی سنجش شد. مقدار سیتوکین‌های تولید شده به کمک کیت الایزا اندازه گیری گشت. ابتدا به منظور بدست آوردن سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی (PBMC) مقدار ۵۰ میلی لیتر خون هپارینه (۲۰۰ U/ml) از افراد داوطلب اخذ گردید و خون هپارینه با ۵۰ میلی لیتر محیط کشت (Gibco- انگلستان) RPMI-1640 رقیق گردید و خون رقیق شده به آرامی بر روی فایکول که حجم آن برابر خون رقیق نشده بود قرار گرفت سپس مجموعه خون رقیق شده و فایکول با سرعت ۸۰ g به مدت ۱۵ دقیقه سانتریفیوژ گردید.

سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی (PBMC) که در حد فاصل فایکول و خون رقیق شده جمع شده بودند به آرامی جمع آوری گردید و PBMC بدست آمده به منظور حذف فایکول همراه آن با محیط کشت 1640 RPMI مخلوط و با سرعت ۴۵۰ g به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ گردید و سلول‌های حاصل مجدداً با محیط کشت 1640 RPMI مخلوط و این بار به منظور حذف پلاکت همراه PBMC با سرعت ۲۰۰ g به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ گردید و تعداد و میزان زنده بودن سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی بدست آمده با استفاده از رنگ تریپان به لو تعیین گردید.

تولید سلول‌های دندریتیک در دو مرحله صورت گرفت که در مرحله اول سلول‌های چسبنده تحت تأثیر سیتوکاین‌های GM-CSF و IL-4 به سلول‌های دندریتیک نابالغ تبدیل شدند و در مرحله دوم این سلول‌ها در حضور مایع روی سلول‌های اندوتیال ورید ناف انسان و لنفوسيت‌های T فعال شده با فیتوهاماگلوتینین

لنفوسيت‌های T اختصاصی آنتی ژن می‌شوند بلکه تمایز سلول‌های T، به سلول‌های تنظیم کننده و یا عمل کننده را منجر می‌گردد. IL-12 ترشح شده توسط سلول‌های دندریتیک منجر به پلاریزاسیون سلول‌های Th1 می‌باشد در حالی که سایر فاکتورها از جمله IL-4 و یا عدم ترشح IL-12 منجر به پلاریزاسیون سلول‌های Th2 می‌گردد. این سلول‌ها نیز به نوبه خود سیتوکین‌های مختلفی را ترشح می‌کنند. توانایی سلول‌های دندریتیک در تحت تأثیر قرار دادن نوع سیتوکین مترشحه از لنفوسيت‌های T از علل عدمهای می‌باشد که نتیجه نهایی پاسخ ایمنی نسبت به پاتوژن را تحت تأثیر قرار می‌دهد (۳).

لنفوسيت‌های T در پاسخ به تحریکات آنتی ژنی در داخل و خارج از بدن به تولید انواع سیتوکین‌ها می‌پردازند که این سیتوکین‌ها به صورت اتوکراین و پاراکراین بر روی خود سلول‌های تولید کننده و سلول‌های دیگر تأثیر می‌گذارند و به همراه سایر واکنش‌های بین سلولی به القاء پاسخ ایمنی و تنظیم آن می‌پردازند. بر اساس نوع، مقدار، مسیر عرضه آنتی ژن و نیز محیط ظریف اطراف لنفوسيت‌های T و تحریکات سایر سلول‌ها دو نوع لنفوسيت T یعنی Th1 و Th2 می‌شوند که هر کدام از آن‌ها ا نوع خاصی از سیتوکین‌ها را ترشح می‌کنند اینترفرون گاما (IFN-γ) به عنوان سیتوکین شاخص Th1 و IL-4 به عنوان سیتوکین شاخص Th2 شناخته می‌شود. فعال شدن هر یک از این لنفوسيت‌ها به تقویت بیشتر بازوی سلولی و با هومورال سیستم ایمنی می‌انجامد که در ایمونولوژی تومور، القاء پاسخ Th1 و به تبع آن تقویت ایمنی سلولی به واسطه سیتوکین‌هایی چون IL-12 و IFN-γ غیره به تقویت پاسخ ضد توموری، تحلیل تومور و بهبود بیماری می‌انجامد؛ بنابراین آگاهی از نوع سیتوکین‌های تولید شده در پاسخ به تحریک سیستم ایمنی با آنتی ژنی خاص، به روند پاسخ ایمنی و بهبود بیماری کمک به سازی می‌کند (۴).

باید به این نکته توجه داشت که فیبروبلاست‌ها سلول‌هایی هستند که در انواع مختلف بافت‌ها یافت می‌شوند و با ترشح عوامل مختلف در رشد و تمایز سلول‌ها دخالت دارند آن‌ها همچنین با ترشح فاکتورهایی نظیر IL6 ، M-CSF ، GM-CSF ، IFN-β بر روی تکامل سلول‌های دندریتیک به سمت DC1 یا DC2 موثر می‌باشند (۵). مایع روئی سلول‌های اندوتیال حاوی فاکتورهای VEGF, BFGF, IGF, EGF سلول‌هایی تشکیل دهنده کلونی هماتopoیتیک شوند و بر روند بلوغ و تکامل سلول‌های دندریتیک مؤثر باشند (۶).

بنابراین در این تحقیق تأثیر مایع روئی سلول‌های فیبروبلاست پوست (HSFPI3) و سلول‌های اندوتیال ورید ناف انسان (HUVECE) در پلاریزاسیون لنفوسيت‌های T به وسیله سلول‌های

سپس سلول‌ها مجدداً با بافر FACS شستشو شده بعد از رساندن حجم آن‌ها به ۱۰۰ میلی لیتر مقدار ۱۰ میلی لیتر آنتی بادی مربوطه (CD83 FITC, CD14 FITC, CD80 FITC, CD86 FITC -DAKO) (HLA-DR PE, CD86 FITC -Danمارک) و کنترل ایزوتیپ به آن‌ها اضافه گردید و به مدت ۴۵ دقیقه در دمای ۴ درجه سانتی گراد انکوبه گردیدند. سپس سلول‌ها دوباره با بافر شسته شده و بلافالسله با دستگاه فلوسیتومتری FACS شرکت FACSCalibor (Becton- Dickinson آمریکا) مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج حاصل با نرم افزار CellQuest آنالیز قرار گرفت.

توانایی فاگوسیتوز سلول‌های دندربیتیک تولید شده با استفاده از بید لاتکس فلورسانس (کنزوگه با FITC) (Sigma-آمریکا) و دستگاه فلوسیتومتری در دو حالت نابالغ (روز پنجم) و حالت بالغ (روز هفتم) مورد ارزیابی قرار گرفت همچنین به منظور سنجش قدرت سلول‌های دندربیتیک تولید شده از نظر تحریک تکثیر لنفوسیت‌های T، واکنش مختلط لکوسیتی (MLR) آلوژن، انجام پذیرفت که برای این منظور تعداد ۱۰ لنفوسیت با نسبت‌های مختلف (۱:۱۰، ۱:۲۰) با سلول‌های دندربیتیک مخلوط و به مدت ۵ روز در میکروبیلت ۹۶ خانه‌ای ته گرد در محیط کشت RPMI-1640، به اضافه ۱درصد سرم AB⁺ انسانی در حجم ۱۰ μ l در دمای ۳۷°C (۵ درصد) CO₂ و ۹۰ درصد رطوبت کشت داده شدند. سپس در روز پنجم به هر خانه مقدار ۱/۵ μ Ci³H تیمیدین نشاندار شده با [H]Amersham (انگلستان) اضافه و به مدت ۱۸ ساعت دیگر انکوبه گردید و سپس میزان تکثیر لنفوسیت‌های T با استفاده از دستگاه harvester-ICN (Cell harvester-ICN) (Wallac-فلاند) مورد سنجش قرار گرفت. میزان ترشح IL-12 و IL-10 از سلول‌های دندربیتیک حاصل شده به وسیله کیت الیزا (Peprotech-آمریکا) مورد ارزیابی قرار گرفت همچنین به منظور بررسی پاسخ پلاریزاسیون لنفوسیت‌های تحریک شده به وسیله سلول‌های دندربیتیک، میزان ترشح INF-γ و IL-4 از طریق مایع رویی واکنش مختلط لکوسیتی (MLR) به وسیله کیت الیزا (Peprotech-آمریکا) مورد سنجش قرار گرفت. در این تحقیق، در گروه کنترل، تولید سلول‌های دندربیتیک بدون استفاده از مایع رویی سلول‌های اندوتیال و فیبروبلاست انجام گرفت و در گروه تیمار تولید سلول‌های دندربیتیک تحت تأثیر مایع رویی سلول‌های اندوتیال و فیبروبلاست انجام پذیرفت و تمامی آزمایش‌ها با سه مرتبه تکرار به ثبت رسیدند و نتایج با برنامه SPSS17 تفسیر و بررسی شد و

(PHA)، و عوامل بلوغ به سلول‌های دندربیتیک بالغ تبدیل شدند. در مرحله اول به سلول‌های چسبنده که اکثریت آن‌ها را منوسيت‌ها تشکیل می‌دادند محیط کشت جدید به اضافه (۱۰۰۰ واحد/میلی لیتر) GM-CSF و IL-4 (۵۰۰ واحد/میلی لیتر) (Sigma-آمریکا) اضافه و به مدت پنج روز کشت داده شد (مرحله اول). در روز سوم مجدداً مقدار مشابهی از GM-CSF و IL-4 به فلاسک‌های حاوی سلول اضافه گردید. در روز پنجم به سلول‌های دندربیتیک نابالغ گروه تیمار، مایع رویی سلول‌های اندوتیال ورید ناف انسان (۲۵ درصد) و مایع رویی فیبروبلاست (۲۵ درصد)، (TNF-α ۱۰ نانو گرم/ میلی لیتر)، (MCM) (۲۵ درصد) مایع رویی منوسيت و (۲ نانو گرم/ میلی لیتر) POLY-IC-sigma (آمریکا) به عنوان عوامل بلوغ و عصاره سلول‌های سرطانی (k562) به عنوان آنتی ژن اضافه گردید. اما به گروه کنترل فقط عوامل بلوغ TNF-α (۱۰ نانو گرم/ میلی لیتر)، (۲۵ درصد) POLY-IC اضافه گشت. در روز هفتم سلول‌های دندربیتیک برداشت شدند و از نظر مورفولوژی، فنوتیپ و قدرت تحریک تکثیر لنفوسیت‌های T و میزان ترشح سایتوکین‌های IL-12 و IL-10 و میزان تحریک ترشح سایتوکین‌های INF-γ و IL-4 به وسیله کیت الیزا (Peprotech-آمریکا) مورد سنجش قرار گرفتند.

به منظور تولید مایع رویی سلول‌های اندوتیال و فیبروبلاست سلول‌های اندوتیال ورید ناف انسان (HUVEG) و فیبروبلاست پوست انسان (HSFPI3) از بانک سلولی ایران تهیه شد و در فلاسک کشت سلولی T75 در محیط کشت DMEM حاوی پنی‌سیلین (۱۰۰ U/ml)، استرپوتومایسین (۱۰۰ g/ml) و سرم جنین گاوی (FBS) (۱۰ درصد) در شرایط دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد، CO₂ (۵ درصد) و رطوبت (۹۰ درصد) کشت داده شدند.

بعد از آنکه ۸۰ درصد از کف فلاسک‌ها به وسیله سلول‌ها پوشیده گردید، مایع رویی دور ریخته شد و مقدار ۸ میلی لیتر RPMI-1640 بدون سرم، به فلاسک‌ها اضافه محیط کشت تازه ساخته شد و بعد از ۴۸ ساعت انکوباسیون، مایع رویی جمع‌آوری و سانتریفیوژ (۲۰۰۰ rpm) گردید. سپس مایع رویی جمع‌آوری شد و با فیلتر سر سرنگی (۲۲ μm) استریل گردید و برای استفاده بعدی در دمای ۷۰°C قرار داده شد.


برای تعیین فنوتیپ سلول‌های دندربیتیک، در روز هفتم سلول‌های دندربیتیک بدست آمده بعد از یک بار شستشو با بافر FACS در همین بافر که حاوی ۲ درصد سرم موش بود به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد انکوبه گردیدند.

¹.Curie

تیمار افزایش یافته است که این مقادیر دارای اختلاف معنی‌دار نسبت به گروه کنترل می‌باشد.

واکنش لوکوسویتی (MLR) آلوژنیک برای سنجش عملکرد سلول‌های دندربیتیک تولید شده از لحاظ توانایی آن‌ها در القاء تکثیر لنفوسیت‌های T در گروه تیمار و گروه کنترل، مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج حاصل نشان داد که سلول‌های دندربیتیک تولید شده در گروه تیمار دارای توانایی بیشتر در القاء تکثیر لنفوسیت‌های T نسبت به سلول‌های دندربیتیک گروه کنترل می‌باشد (نتایج به صورت میانگین 3 cpm در نموادر شماره ۳ نمایش داده شده است)، و دارای اختلاف معنی‌دار از نظر آماری با یکدیگر می‌باشد.

به منظور اندازه گیری سایتوکین‌های ترشح شده از سلول‌های دندربیتیک در حالت بالغ (روز هفتم)، میزان ترشح IL-12 و IL-10 به وسیله کیت الیزا مورد سنجش قرار گرفت. میانگین نتایج IL-10 در گروه کنترل 5.01 ± 0.1 و تیمار 3.9 ± 0.1 و مقادیر IL-12 در گروه کنترل 5.15 ± 0.1 و تیمار 3.1 ± 0.1 برابر حسب در نموادر شماره ۴ ترسیم شده است و مشاهده گردید که میزان ترشح IL-12 و IL-10 بین گروه کنترل و گروه تیمار دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشد. همچنین میزان ترشح سایتوکین INF- γ و IL-4 از لنفوسیت‌های T تحریک شده به وسیله سلول‌های دندربیتیک گروه کنترل و گروه تیمار، از طریق مایع روی جمع‌آوری شده در تست MLR، به وسیله کیت الیزا مورد سنجش قرار گرفت و مقادیر IL-4 در گروه کنترل 9.1 ± 0.9 و تیمار 11.0 ± 0.9 همچنین مقادیر INF- γ در گروه کنترل 8.1 ± 0.8 و تیمار 10.1 ± 0.9 در نموادر ng/ml شماره ۵ نشان داده شده است.



شکل شماره (۱): سلول‌های دندربیتیک گروه تیمار با

بزرگنمایی 40×10

مقایسه بین گروه‌ها در تست فاگوسیتوز توسط t test و paired t test باقیه تست‌ها توسط one way Anova انجام شد و مقدار $P < 0.05$ معنی‌دار در نظر گرفته شد. همچنین نتایج تست الیزا توسط نرم‌افزار CUREXPERT 0.7 مورد آنالیز قرار گرفت.


یافته‌ها

به منظور سنجش میزان بیگانه خواری سلول‌های دندربیتیک تولید شده در حالت نابالغ (روز پنجم) و بالغ (روز هفتم) تست فاگوسیتوز با استفاده از دستگاه فلوسایتومتری انجام شد. نتایج فلوسایتومتری به دست آمده نشان داد که میانگین درصد سلول‌های دندربیتیکی که بیگانه خواری انجام داده بودند در گروه کنترل در حالت نابالغ (روز پنجم) $13/44$ درصد بوده است و در حالت بالغ این مقدار به $46/45$ درصد کاهش یافته بود و این مقادیر از لحاظ آماری ($P < 0.05$) دارای اختلاف معنی‌دار با هم‌دیگر بودند. همچنین در گروه تیمار میانگین درصد سلول‌های دندربیتیکی که بیگانه خواری انجام داده بودند در حالت نابالغ $43/41$ درصد بوده است و این مقدار در حالت بالغ به $46/24$ درصد کاهش یافته بود و این مقادیر نیز دارای اختلاف معنی‌دار با یکدیگر بودند و حتی بین گروه کنترل و گروه تیمار نیز تفاوت معنی‌دار از لحاظ آماری مشاهده گردید (نموادر شماره ۱).


فنوتیپ سلول‌های دندربیتیک نیز با بررسی پنج نشانگر در سطح سلول‌های دندربیتیک به وسیله دستگاه فلوسایتومتری، مورد بررسی قرار گرفت و درصد بیان مولکول‌های CD80، CD14، CD83، CD86 و HLA-DR به صورت میانگین درصد، در نموادر شماره ۲ آورده شده است.

همان‌طور که در نموادر شماره ۲ مشاهده می‌شود میزان بیان CD14 از مقدار $11/3 \pm 0.24$ درصد در گروه کنترل به مقدار $11/24 \pm 0.24$ درصد در گروه تیمار کاهش یافته و دارای اختلاف معنی‌دار نسبت به هم‌می‌باشد و میزان بیان مولکول CD80 از $1/11 \pm 0.10$ درصد در گروه کنترل به مقدار $1/11 \pm 0.35$ درصد در گروه تیمار افزایش یافته که این افزایش نیز دارای اختلاف معنی‌دار با گروه کنترل می‌باشد.


همچنین میزان بیان مولکول CD83 از $81/1 \pm 0.58$ درصد در گروه کنترل به مقدار $13/1 \pm 0.68$ درصد در گروه تیمار افزایش یافته که این افزایش نیز دارای اختلاف معنی‌دار با گروه کنترل می‌باشد و میزان بیان مولکول CD86 از $91/0 \pm 0.98$ درصد در گروه کنترل به مقدار $11/2 \pm 0.83$ درصد در گروه تیمار افزایش یافته است و نیز میزان بیان مولکول HLA-DR از $18/1 \pm 0.10$ درصد در گروه کنترل به مقدار $11/1 \pm 0.25$ درصد در گروه




نمودار شماره (۱): میانگین درصد بیگانه خواری در سلول های دندریتیک گروه کنترل و تیمار در حالت نبالغ و بالغ (* وجود اختلاف معنی دار بین حالت بالغ و نبالغ ($P < 0.05$)




نمودار شماره (۲): فنوتیپ سلول های دندریتیک در گروه کنترل و تیمار (* وجود اختلاف معنی دار با گروه کنترل ($P < 0.05$))



نمودار شماره (۳): مقایسه میانگین نتایج حاصل از واکنش MLR با استفاده از متیل تایمیدین نشاندار در گروه کنترل و تیمار



نمودار شماره (۴): میانگین میزان ترشح سایتوکین‌های IL-10 و IL-12 از سلول‌های دندریتیک در حالت بالغ (* وجود اختلاف معنی‌دار با گروه کنترل ($P < 0.05$))



نمودار شماره (۵): میانگین میزان ترشح سایتوکین‌های IL-4 و INF-γ از لنفوцит‌های T که توسط سلول‌های دندریتیک تحریک شده بودند.

یک دست و دارای تمامی مشخصه‌های مورد نیاز برای استفاده در ایمنوتراپی، در شرایط آزمایشگاه، کاری بسیار مشکل و نسبی است (۷-۹). امروزه به منظور استفاده از سلول‌های دندریتیک برای ایمونوتراپی سرطان، امکان تولید آن‌ها از دو منبع یعنی سلول‌های CD34⁺ مغز استخوان یا خون محیطی و یا مونوسیت‌های خون محیطی فراهم است. ولی از آنجایی که تولید سلول‌های دندریتیک از پیش سازه‌های CD34⁺ مستلزم انجام بیوپسی و تهییه مغز

بحث و نتیجه گیری
به سبب افزایش یافته‌ها در مورد فیزیولوژی سلول‌های دندریتیک و اهمیت آن‌ها در ایجاد پاسخ ایمنی با استفاده از ارائه‌ی آنتی ژن، امید بکار بردن این سلول‌ها در درمان سرطان بسیار زیاد است؛ بنابراین دانشمندان در پی این هستند که سلول‌های دندریتیکی تولید کنند که بهترین عملکرد بیولوژیکی را داشته باشند اما بدون شک تولید سلول‌های دندریتیک کاملاً بالغ،

سلول‌های T اختصاصی را در نهایت توان تحریک کند که ابزارهای آن برای این امر، مولکول‌های کمک تحریکی مثل CD40، CD80/86، مولکول‌های چسبندگی و سایتوکاین‌هایی مثل IL-12 می‌باشد (۱۲). همان‌گونه که در نتایج ملاحظه گردید سلول‌های دندریتیک گروه تیمار به میزان چشمگیری بیان مولکول‌های CD80 و CD86 در سطحشان نسبت به گروه کنترل افزایش یافته بود و این عامل باعث شده بود که این سلول‌ها بتوانند لنفوسيت‌های T را به میزان بیشتری نسبت به گروه کنترل تحریک کنند تا تکثیر یابند و این مسئله در نمودار شماره ۳ کاملاً مشهود است و نشان دهنده بلوغ بهتر سلول‌های دندریتیک تولید شده در گروه تیمار می‌باشد. از دیگر مشخصه‌های مورد بحث در مورد سلول‌های دندریتیک بالغ، افزایش بیان II MHC در سطح این سلول‌ها می‌باشد که در مطالعه‌ی حاضر، بیان این مولکول در قالب سنجش میزان بروز HLA-DR در سطح سلول‌های تولید شده مورد بررسی قرار گرفت. سلول‌های دندریتیک که تحت تأثیر مایع رویی سلول‌های فیبروبلاست (HSFPI3) و اندوتیال (HUVECE) تولید شده بودند از این لحاظ نسبت به گروه کنترل برتری داشتند و میزان بروز HLA-DR در سطح آن‌ها از گروه کنترل با اختلاف معنی‌داری بیشتر بود که این موضوع نیز بیانگر بلوغ بهتر این سلول نسبت به گروه کنترل می‌باشد. اندراج و همکارانش نیز به این نتیجه رسیدند که سلول‌های فیبروبلاست پوست باعث القای بلوغ در سلول‌های دندریتیک می‌شوند (۱۷).

همجنین تانگ و همکارانش گزارش دادند که سلول‌های اندوتیال ورید ناف انسان باعث القای بلوغ سلول‌های دندریتیک می‌شوند (۱۸). موضوع مورد بحث بعدی قدرت بیگانه خواری سلول‌های دندریتیک است. انتظار می‌رود سلول‌های دندریتیک با تغییر وضعیت از حالت نابالغ به بالغ، قدرت بیگانه خواری و تمامی ویژگی‌های لازم برای اخذ آنتی ژن از جمله گیرنده‌های سطحی لازم برای این کار را از دست داده و در عوض قدرت عرضه‌ی آنتی ژن و نهایتاً تحریک سلول‌های T را تقویت کنند (۱۹). قدرت اخذ آنتی ژن بالا در یک سلول دندریتیک نابالغ که قرار است به عنوان یک آجوانات سلولی بکار رود، یک ویژگی حیاتی محسوب می‌شود، چرا که در صورت اختلال در این امر کلیدی، آنتی ژن‌هایی که با سلول‌های دندریتیک مجاور می‌شوند (روز پنجم کشت) به خوبی توسط این سلول‌ها برداشت نشده و به دنبال آن عرضه و تحریک اختصاصی هم رخ نخواهد داد. همان‌طور که در نمودار شماره ۱ مشاهده می‌شود سلول‌های دندریتیک گروه تیمار از این لحاظ نیز بدون نقص بودند و میزان فاگوسیتوزشان در حالت نابالغ بالا بود ولی زمانی که بالغ شدند میزان فاگوسیتوزشان به شدت کاهش یافت و در عوض میزان بیان مولکول‌های سطحی آن‌ها افزایش

استخوان و یا تزریق G-CSF به منظور افزایش تعداد آن‌ها در خون محیطی و سپس لکوفرز می‌باشد و هر دوی این روش‌ها با تیمار اضافی و خطراتی برای بیمار همراه است، امروزه تولید سلول‌های دندریتیک از مونوسيت‌های خون محیطی کاربرد تحقیقاتی و بالینی گستردۀ‌ای یافته است (۱۰).

اکثر تحقیقات در عرصه‌ی سلول‌های دندریتیک بر حول محور استفاده‌های درمانگاهی این سلول‌های ارزشمند، در جریان هستند و هر پژوهشگری به دنبال تولید سلول دندریتیک مناسب، منطبق بر نوع استفاده از آن، می‌باشد. ویژگی‌های مورد نظر و قابل بررسی این سلول‌ها از قبیل میزان بیان نشانگرهای سطحی، بروز کمپلکس‌های سازگاری نسجی اصلی MHC، قدرت بیگانه خواری، قابلیت پاسخ‌گویی به کموکاین‌های مسئول مهاجرت و نهایتاً توانایی این سلول‌ها در تحریک سلول‌های T و نحوه‌ی پلاریزاسیون آن‌ها، تنها بخشی از ده‌ها آزمایش پیچیده و دشواری است که بر پایه‌ی تعیین میزان بلوغ این سلول‌ها استوار می‌باشد (۱۱).

همان‌طور که در نتایج ملاحظه گردید سلول‌های دندریتیک تولید شده در گروه تیمار از لحاظ فنوتیپ دارای شاخص‌های بهتری نسبت به گروه کنترل بودند که یکی از این شاخص‌های مورد بحث میزان بیان مولکول CD14 در سطح سلول‌های دندریتیک می‌باشد. سلول‌های دندریتیک بالغ می‌باشد دارای مقادیر کاهش یافته‌ای از CD14 بر سطح خود باشند، که این کاهش در واقع در حین بلوغ و به واسطه‌ی کاهش نسخه برداری از ژن CD14 بر اثر IL-4 اضافه شده، رخ می‌دهد (۱۲)، بنابراین سلول‌های DC تولید شده در گروه تیمار از این لحاظ نسبت به گروه کنترل برتری دارند و کاهش بیان مولکول CD14 در سطح آن‌ها نشان دهنده بلوغ این سلول‌ها می‌باشد. مولدن و همکارانش به این نتیجه رسیدند که سلول‌های اندوتیال که در معرض TNF-α قرار داشتند باعث القای بلوغ و بهبود فنوتیپ سلول‌های دندریتیک گردیدند که نتایج آن‌ها با نتایج این تحقیق مطابقت دارد (۱۳). سلول‌های فیبروبلاست با ترشح فاکتورهای نظیر IL6، M-CSF، GM-CSF، IFN-β می‌شوند و میزان بیگانه خواری آن‌ها را در حالت بلوغ کاهش می‌دهند (۱۴).

از دیگر شاخص‌های سلول‌های دندریتیک، می‌توان به بیان مولکول CD83 در سطح این سلول‌ها اشاره کرد، این نشانگر جزو ابرخانواده‌ی ایمنوگلوبولین‌ها بوده و هنوز نقش اصلی آن در هاله‌ای از ابهام است. البته به نظر می‌رسد این مولکول سطحی در تنظیم ایمنی سلولی بی تأثیر نباشد (۱۵-۱۶). باید به این نکته توجه داشت که یک سلول دندریتیک ایده آل برای ایمنوتراپی باید بتواند بعد از بلوغ و به عنوان یکی از مشخصه‌های اصلی بلوغ،

پاتوژن‌های داخل سلولی موثر است و DC2 در تولید آنتی بادی و مبارزه با پاتوژن‌های خارج سلولی ایفای نقش می‌کند (۲۲). در این مطالعه سنجش IL-4 و γ -IFN در عنوان نمایندگان تیپ‌های سیتوکینی Th1 و Th2 مورد سنجش قرار گرفت و چون نسبت γ -IFN به IL-4 در گروه تیمار بیشتر بود، بنابراین سلول‌های دندریتیک که تحت تأثیر مایع روی سلول‌های اندوتیال ورید ناف انسان (HUEV) و فیبروبلاست پوست انسان (HSFPI3) تولید گردیدند باعث پلاریزاسیون لنفوسیت‌های T به سمت Th1 شدند.

تشکر و سپاسگزاری

در اینجا جا دارد از کلیه کسانی که ما را در انجام این طرح یاری رساندند، تقدیر و تشکر به عمل آوریم همچنین از آقایان مهدی دوست، فرهنگ پژوه، دکتر ملک خطابی، دکتر اکبری، دکتر احسان شجاعی فر و مهندس عزیزی صمیمانه سپاسگذاریم که ما را در انجام این طرح یاری رساندند و شایان ذکر است که این طرح در پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه ارومیه صورت گرفته و نتایج بدست آمده، حاصل تلاش شبانه روزی استاید بزرگوار و همکاران محترم می‌باشد، امید است با تحقیق بیشتر بر روی این سلول‌های دندریتیک زمینه پیشرفت درمان بیماری‌های خاص و سرطان در کشورمان با سرعت بیشتری دنبال گردد و باعث پیشرفت علمی کشورمان در زمینه سلول درمانی گردد.

References:

- Banchereau J, Briere F, Caux C, Davoust J, Lebecque S, Liu Y et al. Immunobiology of dendritic cells. *Annu Rev Immunol* 2000; 18: 767-811.
- Banchereau J, Palucka AK. Dendritic cells as therapeutic vaccines against cancer. *Nat Rev Immunol* 2005; 5:296-306.
- Guermonprez P, Valladeau J, Zitvogel L, Thery C, Amigorena S. Antigen presentation and T cell stimulation by dendritic cells. *Annu Rev Immunol* 2002; 20: 621-7.
- Kalinski P, Hilkens CM, Wierenga EA, Kapsenberg ML. T-cell priming by type-1 and type-2 polarized dendritic cells: the concept of a third signal. *Immunol Today* 1999; 20: 561-7.
- Smith R. S, Smith T, Blieden M, Phipps R. Fibroblasts assentinel cells: synthesis of chemokines and regulation of inflammation. *Am J Pathol* 1997;151: 317-22.
- Aberle H, Schwartz H, Kemler R. Cadherin-catenin complex: protein interactions and their implications for cadherin function. *J Cell Biochem* 61 1996; 514-23.
- Kalinski P, Urban J, Narang R, Berk E, Wieckowski E, Muthuswamy R. Dendritic cell-based therapeutic cancer vaccines: what we have and what we need. *Future Oncol* 2009; 5(3): 379-90.
- Fernandez NC, Lozier A, Flament C. Dendritic cells directly trigger NK cell functions: crosstalk relevant in innate anti-tumor immune responses in vivo. *Nat Med* 1999; 5: 405-41.

یافت. زانگ و همکارانش نیز بیان کردند که سلول‌های اندوتیال باعث القای بلوغ سلول‌های دندریتیک بینایی می‌شوند و باعث می‌شوند این سلول‌ها در زمان بلوغ میزان فاگوسیتوزشان به شدت کاهش یابد (۲۰). از دیگر مشخصه‌های مورد بحث در مورد سلول دندریتیک بالغ، قدرت تحریک تکثیر لنفوسیت‌های T به وسیله سلول‌های دندریتیک می‌باشد که در این تحقیق، این شاخص به وسیله واکنش مختلط لکوسیتی (MLR)، مورد ارزیابی قرار گرفت (۲۱) و همان‌گونه که در بخش نتایج مشاهده گردید سلول‌های دندریتیک در گروه تیمار لنفوسیت‌های T را بیشتر تحریک کرده بودند و سبب تکثیر بیشتری شده بودند که به واسطه‌ی بلوغ و بیان بالای مولکول‌های کمک تحریکی CD80، CD86 توسط سلول‌های دندریتیک در گروه تیمار می‌باشد.

سلول‌های دندریتیک می‌توانند عملکرد لنفوسیت‌های T تنظیم کننده را کنترل نمایند. این سلول‌ها از طریق ترشح سیتوکین‌های IL-12 و انترفرون‌های کلاس I و II نقش مهمی در اینمی ذاتی ایفا می‌کنند. اگر سلول‌های دندریتیک در طی بلوغ به سمت DC1 حرکت کنند میزان تولید IL-12 نسبت به IL-10 بیشتر خواهد بود و برعکس اگر میزان تولید IL-10 نسبت به IL-12 بیشتر باشد سلول‌های دندریتیک به سمت DC2 خواهند رفت؛ بنابراین سلول‌های دندریتیک تولید شده در گروه تیمار از نوع DC1 می‌باشند. DC1 در القای پاسخ اینمی سلولی و مبارزه با

9. Garcia F, Lejeune M, Climent N, Gil C, Alcami J, Morente V et al. Therapeutic immunization with dendritic cells loaded with heatinactivated autologous HIV-1 in patients with chronic HIV-1 infection. *J Infect Dis* 2005; 191: 1680-5.
10. Delirezh N, Moazzeni SM, Shokri F, Shokrgozar MA, Atri M, Kokhaei, P. Autologous dendritic cells loaded with apoptotic tumor cells induce T cell-mediated immune responses against breast cancer in vitro. *J Cellimm* 2009; 257: 23-31.
11. Gabrilovich D. Mechanisms and functional significance of tumour-induced dendritic-cell defects. *Nat Rev Immunol* 2004; 4: 941-52.
12. Bitton R.J. Cancer vaccines: a critical review on clinical impact. *Curr Opin Mol Ther* 2004; 17-26
13. Moldenhauer A, Nociari M, Lam G, Salama A, Rafii S, Moore MA. Tumor necrosis factor alpha-stimulated endothelium: an inducer of dendritic cell development from hematopoieticprogenitors and myeloid leukemic cells. *Stem Cells* 2004; 22: 144-57.
14. Smith RS, Smith T, Blieden M, Phipps R. Fibroblasts assentinel cells: synthesis of chemokines and regulation of inflammation. *Am J Pathol* 1997; 151: 317-22.
15. Mellman I, Steinman RM. Dendritic cells: specialized and regulated antigen processing machines. *Cell* 2001; 106:255-8.
16. Scholler N, Hayden-Ledbetter M, Dahlin A, Hellstrom I, Hellstrom KE, Ledbetter JA. Cutting edge: CD83 regulates the development of cellular immunity. *J Immunol* 2001; 168: 2599-602.
17. Saalbach A, Klein C, Sleeman J, Sack U, Kauer F, Gebhardt C et al. Dermal fibroblasts induce maturation of dendritic cells. *J Immunol* 2007; 178; 4966-74.
18. Tang H, Guo Z, Zhang M, Wang J, Chen G, Cao X. Endothelial stroma programs hematopoietic stem cells to differentiate into regulatory dendritic cells through IL-10. *Blood*. 2006 15;108(4):1189-97.
19. Henry F, Boistreau O, Betaudeau L, Lieubeau B, Meflah K, Gregoire M. Antigen-presenting cells that phagocytose apoptotic tumor-derived cells are potent tumor vaccines. *Cancer Res* 1999; 59: 3329-32.
20. Zhang M, Tang H, Guo Z, An H, Zhu X, Song W et al. Splenic stroma drives mature dendritic cells to differentiate into regulatory dendritic cells. *Nat Immunol* 2004; 5: 1124-33.
21. Nguyen X.D, Eichler H, Dugrillon A, Piechaczek C, Braun M, Kluter H. Flow cytometric analysis of T cell proliferation in a mixed lymphocyte reaction with dendritic cells. *J Immunol Methods* 2003; 275: 57-64.
22. Steinbrink K, Wolf M, Jonuleit H, Knop J, Enk AH. Induction of tolerance by IL-10-treated dendritic cells. *J Immunol* 1997; 159: 4772-85.