

## تشدید حملات تاکیکارדי پیوستگاهی به دنبال بلح

حسن سلیمانپور<sup>۱</sup>، صمد شمس وحدتی<sup>۲</sup>، محسن عباس نژاد<sup>۳</sup>، کریم مرجانی<sup>۴</sup>، کامران شادرور<sup>۵</sup>

تاریخ دریافت ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ تاریخ پذیرش

### چکیده

حملات تاکیکاردي پيوستگاهي در اثر ضربان سازی سريع و ناگهانی يك کانون خودکار بسيار تحریکپذير در محل اتصال دهليز به بطون ايجاد میشود. اين حملات بيشتر در کودکان گزارش شده و در بالغین بسيار نادر میباشد.

مورد، خانم سیسالهای است که به علت حملات تپش قلب، مراجعات مکرر به اورژانس داشته و با تشخيص تاکیکاردي حملهای فوق بطئی برای بیمار آدنوزین و يا وراپامیل بسته به شرایط بیمار و در دسترس بودن دارو تجویز میشده و ریتم بیمار کنترل میگردد. به دنبال حاملگی دچار تشدید حملات مذکور شده و برای مراقبت ویژه و انجام زایمان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری گردید. در طول بستری متوجه ارتباط بین غذا خوردن و حملات بیمار شدیم که بیمار به صورت عادتی باع زدن آن را کنترل میکرده است. درنهایت بیمار با تشخیص تشدید حملات تاکیکاردي پيوستگاهي با ابليسن تحت درمان قطعی قرار گرفت و حملات تکرار نگردید.

تشدید حملات تاکیکاردي پيوستگاهي، معمولاً در پاسخ به بعضی داروها و در برخی شرایط مستعد کننده مانند حاملگي و بلح دیده میشود. درمان تشدید حملات تاکیکاردي پيوستگاهي، با ابليسن در بزرگسالان به عنوان انتخاب اول درمانی توصیه میشود.

كلمات کلیدی: تشدید حملات تاکیکاردي پيوستگاهي، آدنوزين، ابليسن

مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و پنجم، شماره پنجم، ص ۴۶۸-۴۶۳، مرداد ۱۳۹۳

آدرس مکاتبه: تبریز - خیابان دانشگاه - مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تلفن: ۰۹۱۴۱۱۶۴۱۳۴

Email: soleimanpour@tbzmed.ac.ir

### مقدمه

تاکیکاردي حملهای فوق بطئی<sup>۱</sup>، برای بیمار آدنوزین و يا وراپامیل بسته به شرایط بیمار و در دسترس بودن دارو تجویز میشده و ریتم بیمار کنترل میگردد. بیمار به دنبال حاملگی دچار تشدید حملات مذکور شده بود که فواصل این حملات از ماه هشتم حاملگی کمتر گردیده بود. طبق نظر متخصص زنان، با توجه به مشکل قلبی بیمار، بیمار دو روز قبل از زایمان در بخش مراقبت‌های ویژه پزشکی، بستری گشت و زایمان طبیعی نرمال داشت که ناگهان پس از چند ساعت از زایمان دچار حمله تپش قلب میشود که علاوه حیاتی بیمار حین حمله به شرح زیر بود که با وراپامیل کنترل شد:

تشدید حملات تاکیکاردي پيوستگاهي<sup>۲</sup> در اثر ضربان سازی سريع و ناگهانی يك کانون خودکار بسيار تحریکپذير در محل اتصال دهليز به بطون ايجاد میشود. اين کانون ممکن است به دلیل تحریکپذیری زياد ناشی از مواد محرك و يا ضربه نارس از کانون دیگری به طور ناگهانی شروع به تاکیکاردي نماید.

### گزارش مورد

مورد، خانم سیسالهای است که به علت حملات تپش قلب از سن ۲۶ سالگی، مراجعات مکرر به اورژانس داشته و با تشخيص

<sup>۱</sup> دانشیار بیهودشی و مراقبت‌های ویژه - فلوشیپ احیای قلبی - ریوی و مراقبت بحرانی بیماران تزویرمانی، مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تبریز

<sup>۲</sup> استادیار طب اورژانس گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

<sup>۳</sup> استادیار و فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق، گروه قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

<sup>۴</sup> متخصص بیهودشی - مرکز تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله


<sup>۵</sup> استادیار بیهودشی و فلوشیپ مراقبت‌های ویژه، گروه بیهودشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

<sup>۶</sup> Permanent form of junctional reciprocating tachycardia (PJRT)

<sup>۷</sup> paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT)

در تراسه الکترو کاردیوگرام بیمار در حین حمله، تاکیکاردی حمله‌ای فوق بطنی با تعداد ضربان قلب ۱۷۰ بار در دقیقه، بدون تغییرات قطعه اس-تی مشاهده شد (تصویر ۱).

فشارخون: ۱۰۰/۶۰ میلی‌متر جیوه، ضربان قلب: ۱۷۰ بار در دقیقه، تعداد تنفس: ۱۶ بار در دقیقه، درجه حرارت: ۳۷/۱ درجه سانتی‌گراد.



تصویر (۱): تراسه الکترو کاردیوگرام بیمار حین حمله

### بحث

به طور کلاسیک، تشدید حملات تاکیکاردی پیوستگاهی پایدار در کودکان یا بالغین جوان رخ می‌دهد و با تاکیکاردی فوق بطنی پیوسته مشخص می‌شود. تشدید حملات تاکیکاردی پیوستگاهی در تمامی سنین می‌تواند روى دهد و نیز می‌تواند خود را به صورت تاکیکاردی فوق بطنی حمله‌ای با فاصله بی آر<sup>۳</sup> طولانی نشان دهد (۲۱).

مطالعات اخیر، نشان می‌دهد که هدایت آهسته برگشتی و راه فرعی با هدایت آهسته می‌تواند در هر سنی از جمعیت بالغین رخ دهد. در حال حاضر نوع حمله‌ای تشدید حملات تاکیکاردی

آنالیز خونی بیمار در زمان حمله نرمال بوده است. به علت تکرار حملات فوق، برای بیمار مشاوره قلب درخواست شد. در حین بستری و تا انجام مشاوره بیمار، پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه پزشکی متوجه ارتباط بین غذا خوردن و حملات تپش قلب بیمار گردیدند و بیمار نیز اذعان داشت که در این مدت، حملات تپش قلب او اکثراً با غذا خوردن همراه بوده است. بیمار به صورت شرطی متوجه شده بود که با اغ زدن<sup>۱</sup> می‌تواند تپش قلب خود را کنترل کند.

در طی مشاوره کاردیولوژی تشخیص حملات تاکیکاردی پیوستگاهی، برای بیمار مطرح شد و نهایتاً برای بیمار درمان با ابليشن<sup>۲</sup> صورت گرفت.

<sup>3</sup> - P-R interval

<sup>1</sup> Gag reflex

<sup>2</sup> Ablation

بیماران با تشید حملات تاکیکاردی پیوستگاهی حمله‌ای بدون در نظر گرفتن محل راه فرعی، درمان اصلی مؤثر و بی خطر عنوان شده است (۱۱،۱۲،۱). عود در ابليشن، ناشایع نبوده (از ۱۳ درصد تا ۲۲ درصد در مقالات و ۸ درصد در بررسی‌های اخیر) ولی پس از دومین ابليشن، درمان طولانی‌مدت با موفقیت ۹۲ درصد تا ۱۰۰ درصد می‌باشد. میزان عود بالا، در تشید حملات تاکیکاردی پیوستگاهی با راههای فرعی طولانی و پیچیده در محل گره بطئی-دهلیزی دیده می‌شود (۷). عوارض این روش کم بوده، اما توجه در به کارگیری جریان فرکانس رادیویی، زمانی که راه فرعی در بالای استئوم سینوس کرونری قرار گرفته و یا در منطقه وسط سپتوم بوده ضروری است زیرا که احتمال بلوك درجه دوم و سوم ۵ درصد-۷ درصد وجود دارد.

در نوزادان و کودکان نوع درمان به علت اینکه عوارض ابليشن با کاتتر امواج رادیوئی، با وزن، رابطه عکس دارد؛ درمان با داروهای آنتی آریتمیک در این گروه سنی بسیار مؤثرتر است (۱۳،۱۴). کرايو ابليشن در گزارش گایتا و همکارانش به عنوان درمان جایگزین مناسب و بی خطر در کودکان ذکر شده که احتمال بلوك دهليزی-بطئی را کاهش داده است (۱۵).

تئوری‌های مختلفی در خصوص ارتباط بلع و تاکیکاردی فوق بطئی وجود دارد، یک تئوری بر این اساس است که تحریک وازووگال به دنبال بلع باعث ایجاد تاکیکاردی فوق بطئی می‌شود؛ تئوری دیگری تأکید می‌کند که افزایش فشار داخلی مری، باعث فعل سازی شاخه‌های آوران و واپران عصب واگ شده و درنتیجه باعث ایجاد این آریتمی می‌گردد. به نظر می‌رسد مکانیسم‌های مذکور می‌تواند توجیه‌کننده تشید حملات تاکیکاردی پیوستگاهی به دنبال بلع در بیمار معرفی باشد (۱۶،۱۷).

درنهایت تشید حملات تاکیکاردی پیوستگاهی، معمولاً در پاسخ به بعضی داروها و در برخی شرایط مستعد کننده مانند حاملگی و بلع دیده می‌شود. این حملات بیشتر در کودکان گزارش شده و در بالغین بسیار نادر می‌باشد و کلید تشخیصی آن وجود موج پی معکوس در لیدهای دو، سه و ای وی اف بوده و به علت تاکیکاردی، فاصله پی آر، کوتاه دیده می‌شود (فاصله قطعه آر پی بیشتر از فاصله قطعه پی آر<sup>۵</sup> می‌شود). درمان تشید حملات تاکیکاردی پیوستگاهی با ابليشن در بزرگ‌سالان، به عنوان انتخاب اول درمانی توصیه می‌شود (۱۸،۱).

پیوستگاهی نسبت به قبل بیشتر گزارش می‌شود که این تفاوت ممکن است به علت تفاوت‌های جمعیتی یا کرايتریاهای تشخيصی (كلينيکي و يا الكتروفيزيلولوريك) باشد. طبق مطالعه ليندينگر و همکارانش، در نوزادان و کودکان تشید حملات تاکیکاردی پیوستگاهی اغلب به صورت پیوسته یا پایدار دیده می‌شود (۱،۳).

در بررسی‌های جدید تغیيرات زیادی در طول چرخه زمانی تاکیکاردی (۶۰۰-۲۶۰ هزار ثانیه) وجود دارد. تاکیکاردی و ضربان قلب به صورت چشمگیری در تشید حملات تاکیکاردی پیوستگاهی حمله‌ای در مقایسه با بیماران با تاکیکاردی پایدار یا پیوسته، بالا می‌باشد.

همچنین هیچ ارتباطی بین میزان تاکیکاردی و وجود کاردیومیوپاتی ناشی از تاکیکاردی نیست، اگرچه تعداد بیماران با این عارضه به قدری کم است که نیاز به توجیه و بررسی ندارد (۳،۲). این نوع عارضه به ندرت، در بیماران با تشید حملات تاکیکاردی پیوستگاهی پایدار نسبت به حمله‌ای پیشتر دیده می‌شود و به نظر می‌رسد طولانی بودن زمان تاکیکاردی نسبت به سرعت ضربان ذاتی<sup>۱</sup> قلب بیشتر بیانگر نارسایی بطن چپ می‌باشد. تشید حملات تاکیکاردی پیوستگاهی حمله‌ای به نظر می‌رسد در بالغین بیشتر از کودکان باشد و این خود گواه این مطلب است که چرا تا بلوغ تشخیص تشید حملات تاکیکاردی پیوستگاهی مخفی باقی می‌ماند (۴).

در موارد بسیار زیادی از تشید حملات تاکیکاردی پیوستگاهی، هدایت آهسته برگشتی و راه فرعی با هدایت آهسته در منطقه پوستریوسپیتال<sup>۲</sup> می‌باشد (۲،۳،۵-۷) و بنابراین ابليشن معمولاً از طریق سمت راست استفاده می‌شود (۳). همچنین راههای فرعی در موقعیت‌های دیگر نیز در ۲۴-۱۲ درصد افراد نیز گزارش شده است (۱،۳،۸) و طبق مطالعه گایتا و همکارانش راه فرعی غیر پوستریوسپیتال، اغلب به صورت شایع در تشید حملات تاکیکاردی پیوستگاهی حمله‌ای نسبت به تشید حملات تاکیکاردی پیوستگاهی پایدار دیده می‌شود (۳).

راه فرعی در تشید حملات تاکیکاردی پیوستگاهی می‌تواند در هر منطقه‌ای از سپتوم میانی<sup>۳</sup> تا قدمای چپ<sup>۴</sup> دیده شود، حتی اغلب راههای فرعی می‌توانند در اطراف یا در استئوم سینوس کرونری قرار گیرند (۱،۳،۱۰).

در تحقیقات اخیر، ابليشن با کاتتر امواج رادیویی برای درمان

<sup>1</sup>- Interensic

<sup>2</sup>- posterioseptal

<sup>3</sup>- mid septal

<sup>4</sup>- left anterior

<sup>5</sup> -RP interval > PR

## References:

1. Aguinaga L, Primo J, Anguera I, Mont L, Valentino M, Brugada P, et al. Long-term follow-up in patients with the permanent form of junctional reciprocating tachycardia treated with radiofrequency ablation. *Pacing Clin Electrophysiol* 1998;21(11 Pt 1):2073–8.
2. Lindinger A, Heisel A, von Bernuth G, Paul T, Ulmer H, Kienast W, et al. Permanent junctional re-entry tachycardia. A multicentre long-term follow-up study in infants, children and young adults. *Eur Heart J* 1998;19(6):936–42.
3. Gaita F, Haissaguerre M, Giustetto C, Fischer B, Riccardi R, Richardi E, et al. Catheter ablation of permanent junctional reciprocating tachycardia with radiofrequency current. *J Am Coll Cardiol* 1995;25(3):648–54.
4. Dorostkar PC, Silka MJ, Morady F, Dick M. Clinical course of persistent junctional reciprocating tachycardia. *J Am Coll Cardiol* 1999;33(2):366–75.
5. Coumel P, Cabrol C, Fabiato A. Tachycardie permanente par rythme réciproque. Preuves du diagnostic par stimulation auriculaire et ventriculaire. *Arch Mal Coeur* 1967; 60: 1830–64.
6. Critelli G, Gallagher JJ, Thiene G. The permanent form of junctional reciprocating tachycardia. In Benditt DG and Benson DW (Eds.). *Cardiac Preexcitation Syndromes* 1986; Boston Martinus Nijhoff pp. 233–253.
7. Haïssaguerre M, Gaita F, Markus FI. Radiofrequency catheter ablation of accessory pathways: a contemporary review. *J Cardiovasc Electrophysiol* 1994; 5: 532–52.
8. Shih HT, Miles WM, Klein LS. Multiple accessory pathways in the permanent form of junctional reciprocating tachycardia. *Am J Cardiol* 1994; 73: 361–7.
9. Elbaz M, Fourcade J, Carrie D, Jean M, Karouny E, Foures F, et al. Atrial insertion of accessory pathways in permanent reciprocating junctional tachycardia. *Arch Mal Coeur Vaiss* 1995;88(10):1399–405.
10. Ticho BS, Saul JP, Hulse JE, De W, Lulu J, Walsh EP. Variable location of accessory pathways associated with the permanent form of junctional reciprocating tachycardia and confirmation with radiofrequency ablation. *Am J Cardiol* 1992;70(20):1559–64.
11. Menafoglio A, Schläpfer J, Kappenberger L. La tachycardie jonctionnelle réciproque permanente: une entité clinique méconnue, curable par l'ablation par radiofréquence. *Schweiz Med Wochenschr* 1995; 125: 1980–8.
12. Noë P, Van Driel V, Wittkampf F. Rapid recovery of cardiac function after catheter ablation of persistent junctional reciprocating tachycardia in children. *Pacing Clin Electrophysiol* 2002; 25: 191–4.
13. Pecht B, Maginot KR, Boramanand NK, Perry JC. Techniques to avoid atrioventricular block during radiofrequency catheter ablation of septal tachycardia substrates in young patients. *J Interv Card Electrophysiol* 2002;7(1):83–8.
14. Schleich JM, Vaksman G, Khanoyan P, Rey C, Dupuis C. Permanent junctional reciprocating tachycardia in children and adolescents. Efficacy of medical treatment. *Arch Mal Coeur Vaiss* 1992;85(5):553–9.
15. Gaïta F, Montefusco A, Riccardi R. Cryoenergy catheter ablation: a new technique for treatment of permanent junctional reciprocating tachycardia in children. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2004; 15: 263–8.
16. Greenspon AJ, Volosin KJ. Swallowing-induced tachycardia: electrophysiologic and pharmacologic observations. *Pacing Clin Electrophysiol* 1988; 11:1566–70.
17. Morady F, Krol RB, Nostrant TT, De Buitelaar M, Cline W. Supraventricular tachycardia induced by

- swallowing: a case report and review of the literature. *Pacing Clin Electrophysiol* 1987; 10:133–8.
18. Lee KW, Badhwar N, Scheinman MM. Supraventricular tachycardia--part I. *Curr Probl Cardiol* 2008;33(9):467–546.

## INTENSIFICATION OF PERMANENT FORM OF JUNCTIONAL RECIPROCATING TACHYCARDIA BY SWALLOWING

Hassan Soleimani<sup>1\*</sup>, Samad Shams Vahdati<sup>2</sup>, Mohsen Abbasnezhad<sup>3</sup>, Karim Marjany<sup>4</sup>, Kamran Shadvar<sup>5</sup>

Received: 12 Apr, 2014; Accepted: 21 Jun, 2014

### Abstract

Paroxysmal Permanent Junctional Reciprocating Tachycardia (PJRT) is caused after rapid and sudden pacing of excitatory foci in atrioventricular junction. While it happens mostly in infants and children, it is rarely seen in adults.

A 30-year-old female came to our emergency department repeatedly with the chief complaint of palpitation. She was later diagnosed with PSVT and throughout her several referrals, she received adenosine or verapamil depending on her condition. Consequently, her rate was controlled. In the period of pregnancy, these attacks became frequent. For delivery, she was admitted to our intensive care unit due to cardiac concerns. Throughout her hospitalization, a relation between feeding and attacks were observed; furthermore, attacks were controlled by stimulating gag reflex. Finally, with the diagnosis of PJRT, she underwent ablation therapy.

PJRT is usually triggered by some drugs or situation like pregnancy and swallowing. Ablation is the definite and choice treatment in adults.

**Keywords:** Permanent Junctional Reciprocating Tachycardia, Adenosin, Ablation

**Address:** Cardiovascular Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

**Tel:** +989141164134

**Email:** soleimanpourh@tbzmed.ac.ir

SOURCE: URMIA MED J 2014: 25(5): 468 ISSN: 1027-3727

<sup>1</sup> Associate Professor of Anesthesiology and Critical Care, Fellowship in Trauma Critical Care and CPR, Cardiovascular Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

<sup>2</sup> Assistant Professor, Emergency Medicine Department, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

<sup>3</sup> Assistant Professor of Cardiology, Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

<sup>4</sup> Anesthesiologist, HRC, Baghiatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

<sup>5</sup> Assistant Professor of Anesthesiology and Critical Care, Fellowship in Critical Care Medicine, Anesthesiology Department, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran