

ارتباط سایز پاتولوژیک تومور رنال سل کارسینوما با پارامترهای پاتولوژیک نمونه‌های رادیکال نفرکتومی انجام شده در بیمارستان امام خمینی تهران بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

محمد رضا نوروزی^۱، محسن آیتی^۲، منصور جمالی زواره‌ای^۳، علی طهرانچی^{۴*}، الناز آیتی افین^۵

تاریخ دریافت ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ تاریخ پذیرش ۱۳۹۳/۰۴/۲۱

چکیده

پیش‌زمینه و هدف: بررسی ارتباط اندازه پاتولوژیک تومور رنال سل کارسینوما بر پارامترهای میکروسکوپیک پاتولوژیک نمونه‌های رادیکال نفرکتومی انجام شده در بیمارستان امام خمینی تهران بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰.

روش اجرا: در یک مطالعه گذشته‌نگر یافته‌های پاتولوژیک ۷۶ بیمار بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ را که تحت رادیکال نفرکتومی قرار گرفته بودند و تشخیص نهایی رنال سل کارسینوما بود، مورد بررسی قرار دادیم و ارتباط بین سایز پاتولوژیک تومور با گردیده استهای، درگیری غدد لنفاوی، درگیری سیستم پیلوکالیسیل، وجود تومور ترومبوس در ورید کلیوی، تهاجم لنفو و سکولا، مارژین جراحی مثبت و درگیری آدرنال مورد بررسی و آنالیز آماری قرار گرفت.

نتایج: ارتباط معنی‌داری بین سایز پاتولوژیک تومور رنال سل کارسینوما با گردیده استهای، درگیری غدد لنفاوی، تهاجم لنفو و سکولا، تومور ترومبوس در ورید کلیوی، درگیری سیستم پیلوکالیسیل، درگیری آدرنال وجود دارد ولی با مارژین جراحی مثبت ارتباط اثبات نشد.

نتیجه‌گیری: اندازه پاتولوژیک تومور رنال سل کارسینوما با پارامترهای پاتولوژیک مؤثر بر سورویوال ارتباط دارد و در آینده با مطالعات بیشتر، این پارامترها ممکن است در مرحله بندی تومورهای کلیه نقش ایفا کنند.

کلید واژه: اندازه تومور، کارسینوما، رنال سل، نفرکتومی، پاتولوژی

مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و پنجم، شماره ششم، ص ۴۷۳-۴۶۹، شهریور ۱۳۹۳

آدرس مکاتبه: تهران، مرکز تحقیقات یوروانکولوژی: بیمارستان امام خمینی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تلفن: ۰۹۱۴۱۴۱۰۷۵۵

Email: drtehranchi@yahoo.com

پروگنوستیک T2 هنوز مورد بحث می‌باشد^(۵). در اکثر مطالعات اندازه‌ی تومورها بر اساس تصویر برداری که Bias اندازگیری زیادی دارد مورد مبنای قرار گرفته است و ارتباط آن با سورویوال مورد بررسی قرار گرفته است^(۶) و مطالعات اندکی که این Bias را که اثر زیادی بر تحلیل نتایج آماری دارد^(۷) کاهش دهد انجام نشده است. از سوی دیگر چنین مطالعه‌ای در ایران که این ارتباطات پاتولوژیک را با سایز تومور بررسی نماید انجام نشده است لذا ما بر آن شدیدم که سایز پاتولوژیک تومورهای کلیه را با سایر پارامترهای پاتولوژیک در یک مرکز بیمارستانی ارجاعی در ایران موردنبررسی قرار دهیم.

مقدمه

رنال سل کارسینوما (RCC) درصد تمام کانسرها و ۹۰ درصد بدخیمی‌های کلیه را تشکیل می‌دهد^(۱). آن شامل انواع متفاوتی با خصوصیات هیستوپاتولوژیک و زنتیک ویژه می‌باشد. در مطالعات اروپایی نسبت مرد به زن ۱:۵:۱ می‌باشد و پیک سنی شیوع آن ۶۰-۷۰ سال است^(۲) و سیستم مرحله بندی TNM جهت مطالعات بالینی و علمی توصیه می‌شود. با این وجود این سیستم نیازمند تغییرات مداوم به مدظور کارایی بیشتر می‌باشد^(۴). آخرین تقسیم بندی TNM در سال ۲۰۱۰ منتشر شده ولی با این وجود برخی ابهامات از جمله ارزش تقسیم بندی زیر مجموعه‌های T1 و نیز ارزش

^۱ استاد اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات سرطان‌های دستگاه ادراری تناслی، دانشگاه ادراری تنازلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

^۲ دانشیار اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات سرطان‌های دستگاه ادراری تنازلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

^۳ استاد آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات سرطان‌های دستگاه ادراری تنازلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

^۴ استادیار اورولوژی، مرکز تحقیقات سالید تومور، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (نویسنده مسئول)

^۵ دستیار زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

غدد لنفاوی ۸.۸۹+/۴.۵۴ و در بیماران با درگیری غدد لنفاوی ۷.۱۳-/۱۷.۵۸ بود که مطابق آزمون T-Test ارتباط معنی داری بین سایز تومور و درگیری غدد لنفاوی وجود دارد. متوسط اندازه تومور در ۷۳ بیمار بدون درگیری ورید کلیوی ۱۳.۰۵/-۱۵.۱۸ p=0.02 بود. مطابق آزمون T-Test ارتباط معنی داری بین سایز تومور و درگیری ورید کلیوی وجود دارد. متوسط اندازه تومور در ۷۱ بیمار با مارژین جراحی منفی ۵.۳۷-/۹.۳۳ و در ۷ بیمار با مارژین جراحی منفی ۱۱.۴۲+/۶.۳۰ بود. مطابق آزمون T-Test علیرغم افزایش سایز تومور در مارژین های جراحی مثبت، ارتباط معنی داری بین سایز تومور و مارژین جراحی مشاهده شد (p=0.33). متوسط اندازه تومور در بیماران بدون تهاجم لنفو وسکولار ۸.۸۸+/۴.۸۸ و در ۶ بیمار با درگیری لنفو وسکولار ۱۷.۵۸+/۷.۱۳ بود. مطابق آزمون آماری T-Test ارتباط معنی داری بین سایز تومور و تهاجم لنفو وسکولار وجود داشت (p=0.02). متوسط اندازه تومور در بیماران بدون تهاجم به سیستم پیلوکالیسیل ۷.۹۶+/۴.۸۱ و در بیماران با تهاجم به سیستم پیلوکالیسیل ۱۲.۲۲+/۶.۸۰ بود که مطابق آزمون آماری T-Test اختلاف معنی داری بین سایز تومور و تهاجم به سیستم پیلوکالیسیل مشاهده شد (p=0.01). متوسط سایز تومور در ۷۳ بیمار بدون درگیری آدرنال ۲۰.۳۳+/۱۰.۵۹ و در ۳ بیمار با درگیری آدرنال ۴.۷۰ ۸.۹۶+/۴.۷۰ بود که تفاوت معنی داری مطابق آزمون آماری T-Test بین سایز تومور و درگیری آدرنال وجود دارد (p=0.001).

مواد و روش کار

در یک مطالعه گذشته نگر یافته های پاتولوژیک ۷۶ بیمار بین سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ را که تحت رادیکال نفرکتومی قرار گرفته بودند و تشخیص نهایی رنال سل کارسینوما بود، مورد بررسی قرار دادیم. ارتباط بین سایز پاتولوژیک تومور با گردیده استهای درگیری غدد لنفاوی، درگیری سیستم پیلوکالیسیل، وجود تومور تروموس در ورید کلیوی، تهاجم لنفو وسکولار، مارژین جراحی مثبت و درگیری آدرنال بررسی شد و با بکارگیری تست های آماری Anova و Mann-Whitney, T -Test مورد آنالیز آماری قرار گرفت.

یافته ها

در کل ۸۴ بیمار در این فاصله زمانی تحت رادیکال نفرکتومی قرار گرفتند که از بین آن ها در ۷۶ بیمار پاتولوژی RCC بود. خصوصیات دموگرافیک این بیماران در جدول یک و ارتباط سایز تومور با پارامترهای پاتولوژیک رنال سل کارسینوما در جدول دو آمده است. متوسط اندازه تومور تقسیم بندی گردیده استهای Fuhrman در گردید یک ۱۳.۸+/۳.۹۲، در گردید دو ۵.۵+/۱.۳، در گردید سه ۱۰.۱۶+/۴.۵۴ و در گردید چهار ۸.۵+/۱۷.۲۵ بود. مطابق آزمون آنوا ارتباط معنی داری بین اندازه متوسط تومور با گردیده استهای تومور با p=0.001 وجود دارد، بطوریکه با افزایش اندازه تومور گردیده استهای افزایش می یابد. آزمون آنوا ارتباط معنی داری بین اندازه تومور با گردیده استهای دو و چهار نشان نداد (P=1.8). متوسط اندازه تومور در ۶۸ بیمار بدون درگیری (P=1.8).

جدول (۱): خصوصیات دموگرافیک بیماران

characteristic	
No of patients:	76
mean Age, year, (range)	52.2 (25-56)
Side; right, left	29, 47
T1, T2, T3, T4	30, 16, 27, 3
Stage: 1, 2, 3, 4	29, 13, 27, 7

جدول (۲): ارتباط سایز تومور با پارامترهای پاتولوژیک رنال سل کارسینوما

	Tumor size	
	P value	Relation
Nuclear grade	0.001	+
Lymph node involvement	0.001	+
Lymphovascular invasion	0.02	+
Surgical margin	0.33	-
Renal vein involvement	0.02	+
Pyelocaliceal invasion	0.01	+
Adrenal invasion	0.001	+

بحث

در مطالعات متعددی اندازه تومور با گرید هسته‌ای و تهاجم لنفو وسکولار ارتباط دارد (۱۱ و ۱۲) بطوریکه با هر یک سانتی متر افزایش در سایز تومور با افزایش ۳۵ درصد درگیری کپسولار و ۶۴ درصد تهاجم عروقی همراهی دارد؛ و از سوی دیگر این خصوصیات پاتولوژیک با طول عمر وابسته به کانسر ارتباط قوی دارند (۱۱ و ۱۲). لذا اندازه تومور هم بصورت مستقیم وهم از طریق تأثیر بر روی فاکتورهای پروگنوستیک دیگر مانند گرید هسته یا تهاجم لنفو وسکولار نقش تعیین کننده‌ای در طول عمر وابسته به کانسر دارد.

در مطالعه ما ارتباط معنی‌داری بین اندازه تومور و مارژین جراحی مشاهده نشد که احتمالاً به دلیل وابسته بودن آن به تکنیک جراحی و عدم اطلاع از نحوه جراحی با توجه به گذشته‌نگر بودن مطالعه می‌باشد.

از ایرادات این مطالعه تعداد نسبتاً کم نمونه و احتمال selection bias با توجه به ماهیت گذشته‌نگر بودن مطالعه به ویژه در مواردی که وابسته به تکنیک جراحی از قبیل وسعت لنفادنکتومی و مارژین جراحی است. لذا یک مطالعه آینده نگر با حجم نمونه کافی جهت مشخص کردن اهمیت و ارتباط اندازه واقعی تومور با یافته‌های پاتولوژیک و نیز تأثیر موارد مورد مطالعه بر سوروبیوال بیماران پیشنهاد می‌شود.

نتیجه‌گیری

اندازه پاتولوژیک تومور رنال سل کارسینوما می‌نواند با پارامترهای پاتولوژیک مؤثر بر سوروبیوال ارتباط داشته باشد و لذا در آینده با مطالعات بیشتر، این پارامترها ممکن است در مرحله بندي تومور های کلیه نقش ایفا کنند.

References:

- Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 2011;61(2):69–90.
- Kovacs G, Akhtar M, Beckwith BJ, Bugert P, Cooper CS, Delahunt B, et al. The Heidelberg classification of renal cell tumours. J Pathol 1997;183(2):131–3.
- Guidelines on Renal Cell Carcinoma [Internet]. 2013 [cited 2014 Aug 17]. Available from: http://www.uroweb.org/gls/pdf/10_Renal_Cell_Carcinoma_LR.pdf.
- Gospodarowicz MK, Miller D, Groome PA, Greene FL, Logan PA, Sabin LH. The process for continuous improvement of the TNM classification. Cancer 2004;100(1):1–5.
- Novara G, Ficarra V, Antonelli A, Artibani W, Bertini R, Carini M, et al. Validation of the 2009 TNM version in a large multi-institutional cohort of patients treated for renal cell carcinoma: are further improvements needed? Eur Urol 2010;58(4):588–95.
- Thompson RH, Hill JR, Babayev Y, Cronin A, Kaag M, Kundu S, et al. Metastatic renal cell

تأثیر سایز تومور که بر اساس تصویر برداری (CT-MRI) قبل از عمل جراحی بدست می‌آید بر روی یافته‌های پاتولوژیکی که مؤثر بر درمان و پیش‌آگهی RCC است، در مطالعات متعددی بررسی و اثبات شده است ولی نتایج این مطالعات با توجه به Bias اندازگیری تصویر برداری و نیز زمان انجام تصویربرداری تا زمان نفرکتومی رادیکال مورد تردید است (۸). از سوی دیگر چنین مطالعه‌ای در ایران انجام نشده است. لذا ما اندازه‌ی واقعی تومور را که بر اساس حداکثر اندازه‌ی تومور در اندازگیری ماکروسکوپیک توده حاصل از جراحی می‌باشد را با یافته‌های میکروسکوپیک پاتولوژی این تومور که می‌تواند تأثیر مستقیم بر نحوه درمان و پیش‌آگهی این تومور داشته باشد در بیمارستان امام خمینی تهران که یک مرکز ریفرا ال کانسر می‌باشد، با یک مطالعه گذشته‌نگر موردنبررسی قرار دادیم.

Zhang و Lix c نشان دادند که بین اندازه تومور با گرید و مرحله بالینی تومور کلیه ارتباط وجود دارد بطوریکه با افزایش سایز تومورهای کلیه مرحله بالینی و گرید آن‌ها افزایش می‌یابد (۹ و ۱۰). در مطالعه ما نیز با افزایش سایز تومور گرید هسته نیز افزایش می‌یابد ولی احتمالاً به دلیل کم بودن تعداد بیماران مرحله ۴ و ۲ این ارتباط در این گروه از بیماران علیرغم افزایش ظاهری معنی دار نبود.

Seregin AV در یک مطالعه تک متغیری نشان داد که حداکثر اندازه تومور با تمایز تومور، درگیری غدد لنفاوی، درگیری سیستم پیلوکالیسیل، تومور ترومبوس و سوروبیوال ۵ ساله‌ی ویژه کانسر ارتباط معنی‌داری وجود دارد که با نتایج مطالعه ما همخوانی دارد (۷).

- carcinoma risk according to tumor size. *J Urol* 2009;182(1):41–5.
7. Seregin AV, Loran OB, Ashugian VR. Renal tumor size. Clinicomorphological correlations. *J Urol* 2007;177(5):1687-91.
8. Jeffery NN, Douek N, Guo DY, Patel MI. Discrepancy between radiological and pathological size of renal masses. *BMC Urol* 2011;11:2.
9. Zhang C, Li X, Hao H, Yu W, He Z, Zhou L. The correlation between size of renal cell carcinoma and its histopathological characteristics: a single center study of 1867 renal cell carcinoma cases. *Urol Ann* 2012;4(1):24-8.
10. Onodera Y, Matsuda N, Ohta M, Goto R, Fujii N, Yamada Y, et al. Prognostic significance of tumor grade for renal cell carcinoma. *Int J Urol* 2000;7(1):4-9.
11. Turun S, Banghua L, Zheng S, Wei Q. Is tumor size a reliable predictor of histopathological characteristics of renal cell carcinoma? *J Urol* 2009;181(1):29-33.
12. Ficarra V, Righetti R, Martignoni G, D'Amico A, Pilloni S, Rubilotta E, et al. Prognostic value of renal cell carcinoma nuclear grading: multivariate analysis of 333 cases. *Urol Int* 2001;67(2):130-4.

INVESTIGATING THE RELATION BETWEEN PATHOLOGICAL SIZES OF RENAL CELL CARCINOMA ON MICROSCOPIC PATHOLOGICAL PARAMETERS OF RADICAL NEPHRECTOMY SPECIMEN IN IMAM KHOMEINI HOSPITAL OF TEHRAN, 2006-2011

Mohammad Reza Nowroozi¹, Mohsen Ayati², Mansour Jamali Zavarei³, Ali Tehranchi*, ⁴Elnaz Ayati Afin⁵

Received: 21 Apr , 2014; Accepted: 12 Jul , 2014

Abstract

Background & Aims: It was aimed to determine the relation between pathological size of renal cell carcinoma on microscopic pathological parameters of radical nephrectomy specimen.

Material & Methods: In a retrospective study, we reviewed pathological finding of 76 patients that underwent radical nephrectomy during 2006-2011. We studied the relations between pathological size of tumor with nuclear grade, lymph nodes involvement, lymphovascular invasion, tumor thrombus in renal vein, pyelocaliceal involvement, surgical margin and adrenal involvement.

Results: There are significant relations between pathological size of renal cell carcinoma with nuclear grade, lymph nodes involvement, lymphovascular invasion, tumor thrombus in renal vein, pyelocaliceal involvement, and adrenal involvement but not with surgical margin.

Conclusion: There is relation between pathological size and pathological parameters of renal cell carcinoma. Further studies need to show that these parameters can play a role in staging of renal tumors.

Keywords: Size of tumor, Carcinoma, Renal cell, Nephrectomy, Pathology

Address: Uro-oncology Research Center, Imam Khoemeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, **Tel:** +98 9141410755

Email: drtehranchi@yahoo.com

SOURCE: URMIA MED J 2014: 25(6): 473 ISSN: 1027-3727

¹Professor of Urology, Uro Oncology Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
²Associate Professor of Urology, Uro Oncology Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

³Professor of Pathology, Uro Oncology Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
⁴Department of Urology, Solid Tumor Research Center, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran (Corresponding Author)

⁵Resident of Gynecology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran