

# بررسی ریسک فاکتورها و میزان درصد فراوانی سنگ‌های باقیماندهی مجاری صفراوی متعاقب جراحی کله سیستکتومی لپاراسکوپیک در بیمارستان امام خمینی ارومیه

رحیم محمودلو<sup>۱</sup>، رؤیا قائمی خیاوی<sup>۲</sup>، فرزاد پیرزه<sup>۲</sup>

تاریخ دریافت 1393/09/09 | تاریخ پذیرش 1393/11/12

## چکیده

**پیش‌زمینه و هدف:** کله سیستکتومی لپاراسکوپیک به عنوان درمان انتخابی جهت اکثر بیماری‌های کیسه‌ی صفرا می‌باشد. با وجود اینکه بیش از ۹۰ درصد افرادی که تحت کله سیستکتومی لپاراسکوپیک قرار می‌گیرند، موفقیت‌آمیز می‌باشد، تعداد قابل توجهی با توجه به عدم بهبودی علائم، سندروم بعد از کله سیستکتومی را تجربه می‌کنند. هدف از این تحقیق بررسی میزان شیوع سنگ‌های مجاری در بیمارانی می‌باشد که تحت کله سیستکتومی لپاراسکوپیک قرار گرفته‌اند و نیز مشخص کردن عوامل پیشگویی‌کننده احتمال وجود سنگ در مجاری قبل از انجام کله سیستکتومی جهت ارجاع بیماران مشکوک به انجام پروسه‌های تشخیصی بیشتر از جمله ERCP، جهت کاهش احتمال عوارض پس از جراحی می‌باشد.

**مواد و روش‌ها:** اطلاعات بستری بیمارانی که در بیمارستان امام خمینی ارومیه در مدت سه سال گذشته تحت جراحی کله سیستکتومی لپاراسکوپیک قرار گرفته‌اند از پرونده‌های بستری استخراج گردیده و اطلاعات موردنیاز در پیگیری‌های سرپایی از پرونده‌ی سرپایی بیماران استخراج گردید. یک ماه پس از ترخیص بیماران در طی مراجعه جهت پیگیری به سونوگرافیست جهت تشخیص retained stone ارجاع گردیده است. اطلاعات در چک لیست‌هایی ثبت و مورد آنالیز آماری قرار گرفت.

**یافته‌ها:** بیماران شامل ۸۰۰ زن و ۱۹۳ مرد با سن متوسط  $48/82 \pm 16$  (دامنه: ۱۳ تا ۴۴) سال بودند. سنگ باقیمانده در مجاری صفراوی متعاقب جراحی کله سیستکتومی لپاراسکوپیک در ۴۷ بیمار (۴/۴ درصد) پدید آمد. در مقایسه دو گروه با و بدون سنگ تفاوت معنی‌داری از نظر جنس، میزان BMI زمان بستری و بیماری زمینه‌ای دیابت وجود نداشت. ارتباط معنی‌داری بین میانگین سن بیماران دارای سنگ و فاقد سنگ وجود داشت و میانگین سن ۶۰/۹۶ به بالا به عنوان ریسک فاکتور مطرح شد.

ارتباط معنی‌داری بین سطح بیلی‌روبن، سطح ALP، ALT و AST همچنین قطر CBD و مجاری صفراوی داخل کبدی و زمان بستری بین بیماران با و بدون سنگ وجود داشت. ارتباط معنی‌داری بین بیماری زمینه‌ای فشارخون و سنگ باقیمانده مجرأ وجود داشت.

**بحث و نتیجه‌گیری:** بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر ریسک فاکتورهای سنگ باقیمانده مجرأ به دنبال کله سیستکتومی لپاراسکوپیک سن بالا، سطح بالای بیلی‌روبن، ALP و AST زمان بستری و قطر بالای CBD و مجاری صفراوی داخل کبدی در زمان بستری و بیماری زمینه‌ای فشارخون بود. از طرفی بیماران دارای سنگ باقیمانده در زمان بستری جهت کله سیستکتومی مدت بستری طولانی‌تری داشتند. توجه به ریسک فاکتورهای سنگ باقیمانده مجاری صفراوی اهمیت بررسی این متغیرها را به عنوان راهنمای بروگنوستیک آشکار می‌سازد.

**کلمات کلیدی:** کله سیستکتومی، لپاراسکوپی، عوارض، retained stone، ریسک فاکتورها

مجله پژوهشی ارومیه، دوره بیست و ششم، شماره اول، ص 31-38، فروردین 1394

آدرس مکاتبه: ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پزشکی، تلفن: ۰۴۴-۳۷۷۸۰۸۰۳

Email: mahmodlou@yahoo.com

## مقدمه

پیشرفت کرده است (۱). کاهش دردهای پس از جراحی، امکان حرکت زودتر بیمار، امکان شروع زودتر تغذیه‌ی خوراکی، مدت بستری کمتر و بازگشت سریع‌تر به فعالیت‌های روزانه کله سیستکتومی لپاراسکوپیک را معرفی کرد این روش به سرعت

فوق تخصص جراحی توراکس، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی ارومیه، ایران

دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی ارومیه، ایران

دانشیار تخصصی جراحی عمومی، گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی ارومیه، ایران

پیگیری‌های سرپایی از پرونده درمانگاهی بیماران استخراج گردید. اطلاعات بستری بیمارانی که در بیمارستان امام خمینی ارومیه در مدت سه سال گذشته تحت جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک قرار گرفته‌اند از پرونده‌های بستری استخراج گردیده و اطلاعات موردنیاز در پیگیری‌های سرپایی از پرونده‌ی سرپایی بیماران استخراج گردید. یک ماه پس از تথیص بیماران در طی مراجعه جهت پیگیری به سونوگرافیست جهت تشخیص stone ارجاع گردیده است. اطلاعات در چک لیست‌هایی ثبت و مورد آنالیز آماری قرار گرفت. متغیرهای مورد مطالعه شامل سن، جنس، BMI، سطح Bill, ALP, ALT و CBD و مجاری Retained stione intrahepatic قبل از عمل، مدت بستری، دیابت و فشارخون بودند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه ۱۸ تحت آنالیز قرار گرفتند. داده‌های کمی به صورت انحراف معیار  $\pm$  میانگین و داده‌های کمی به صورت (%) فراوانی نشان داده شدند. جهت مقایسه داده‌های کمی از آزمون داده‌های کیفی از آزمون دقیق فیشر یا کای دو استفاده شد. سطح معنی‌دار آماری در این مطالعه  $0.05$  در نظر گرفته شده است.

### یافته‌ها

در این مطالعه، ۹۹۳ بیمار که در مدت سه سال گذشته در بیمارستان امام خمینی ارومیه تحت کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک قرار گرفته بودند، از نظر فراوانی سنگ باقیمانده مجري اصفراوی مشترک مورد ارزیابی قرار گرفتند. مشخصات بیماران و متغیرهای مطالعه در گروه بررسی شده در جدول ۱ خلاصه شده است. نسبت جنسیتی مذکور به مؤنث در این مطالعه  $0.24$  به  $1$  بود. میانگین سن بیماران مورد مطالعه در کل  $48.70 \pm 16.82$  سال (حداکثر  $94$  و حداقل  $13$ ) سال بود؛ و از نظر جنسی  $80.0$  بیمار ( $16$  درصد) مؤنث و  $19.3$  بیمار ( $4$  درصد) ذکر بودند. متوسط بیلی‌روبین زمان بستری  $81 \pm 40.3$  میلی‌گرم در دسی‌لیتر، متوسط ALP زمان بستری  $21 \pm 45.9$  Iu/L و متوسط AST زمان بستری  $28 \pm 22$  Iu/L و متوسط قطر CBD  $5.5 \pm 4.6$  میلی‌متر و متوسط قطر مجرى اصفراوی داخلی کبدی  $0.8 \pm 0.4$  میلی‌متر بود. متوسط BMI در  $99.3$  بیمار تحت مطالعه  $26.38 \pm 5.02$  و متوسط زمان بستری در بیمارستان در این مطالعه  $61 \pm 40.6$  روز بود. متغیرهای موردمطالعه در  $47$  بیمار با سنگ باقیمانده مجرای اصفراوی به دنبال کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک در جدول ۲ خلاصه شده

سیستکتومی لاپاراسکوپیک را به عنوان درمان انتخابی جهت اکثر بیماری‌های کیسه‌ی صفرا تبدیل کرده است (۲). از عوارض کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک، آسیب به مجاری صفراوی، انسداد حاد مجاری صفراوی، پارگی مجاری خارج کبدی و سنگ‌های Common Bile Duct – (retained stone) می‌باشد. اطلاعات کمی در مورد روند سنگ‌های مجاری موجود می‌باشد (۱). در حدود  $10\%$  از بیماران دچار سنگ‌های CBD می‌باشد (۳). که تنها  $3$  درصد آن‌ها عالمدار می‌شوند (۱). با وجود اینکه تشخیص کله لیتیاز معمولاً بسیار واضح می‌باشد، تشخیص سنگ در CBD بسیار چالش‌برانگیز است (۳). در حین انجام کله سیستکتومی به صورت لاپاراسکوپیک، مشخص کردن موقعیت CBD در حین جراحی مشکل‌تر می‌باشد و آناتومی محل نیز به علت کشش اینفاندیبولوم تغییر می‌کند (۴). برای بررسی احتمال وجود سنگ در CBD، پزشک معمولاً به بررسی یافته‌های بالینی از جمله زردی، یافته‌های سونوگرافیک CBD، گشادی مجرای اینترا‌هپاتیک و یا یافته‌های آرمایشگاهی غیرطبیعی شامل افزایش آلکالان فسفاتاز (ALP) و بیلی‌روبین (Bill) تکیه می‌کند که این یافته‌ها تنها می‌توانند تخمین برای پزشک ایجاد کنند (۳). هدف از این تحقیق بررسی میزان شیوع سنگ‌های مجرای در بیمارانی می‌باشد که تحت کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک قرار گرفته‌اند و نیز مشخص کردن عوامل پیشگویی‌کننده احتمال وجود سنگ در مجرای قبل از انجام کله سیستکتومی جهت ارجاع بیماران مشکوک به انجام اقدامات تشخیصی بیشتر از جمله (ERCP) جهت کاهش احتمال عوارض پس از جراحی می‌باشد.

### مواد و روش‌ها

در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، مقطعی و گذشته‌نگر کلیه بیمارانی که در مدت سه سال در بیمارستان امام خمینی ارومیه تحت جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک قرار گرفته‌اند موردنرسی قرار گرفتند. معیارهای خروج شامل بیماران با سابقه قبلي از سنگ CBD. آنمی هموگلوبین، بیمارسینوم هپاتوسولار، بدخیمی‌های اصفراوی، سابقه جراحی شکمی قبلي برای مشکلات کبدی و سیستم پانکراتیکوبیلیاری و عدم وجود شواهدی از تنگی CBD بودند. چکلیستی از پرونده بیماران بستری تهیه و اطلاعات بیماران از پرونده‌های بستری و اطلاعات موردنیاز در

<sup>1</sup> Endoscopic retrograde cholangiopancreatography

مجرای صفراوی به دنبال کله سیستکتومی لپاراسکوپیک در جدول ۳ خلاصه شده و مقایسه شده است. بر اساس نتایج آزمون‌های آماری به عمل آمده، در این مطالعه جهت شناسایی ریسک فاکتورهای دخیل در شیوع سنگ باقی‌مانده مجاری صفراوی متعاقب کله سیستکتومی لپاراسکوپیک نتایج به دست آمده نشان داد: ارتباط معنی‌داری بین میانگین سن بیماران دارای سنگ و فاقد سنگ وجود داشت و میانگین سن ۶۰/۹۶ به بالا به عنوان ریسک فاکتور مطرح شد. ارتباط معنی‌داری بین جنس بیماران دارای سنگ و فاقد سنگ وجود نداشت. ارتباط معنی‌داری بین سطح بیلی‌روبین، سطح ALT، ALP و AST همچنین قطر CBD و مجاری صفراوی داخل کبدی و زمان بسترهای سرمهی زمان بسترهای زمینه‌ای زمان بسترهای BMI و مطالعه داری بین میزان BMI زمان بسترهای در بیماران دارای سنگ و فاقد سنگ وجود نداشت. ارتباط معنی‌داری بین بیماری زمینه‌ای فشارخون و سنگ باقی‌مانده مجاور وجود داشت. ارتباط معنی‌داری بین بیماری زمینه‌ای دیابت و سنگ باقی‌مانده مجاور وجود نداشت.

است. فراوانی سنگ‌های باقی‌مانده در مجاری صفراوی متعاقب جراحی کله سیستکتومی لپاراسکوپیک از بین ۹۹۳ بیمار در ۴۷ بیمار (۴۷/۷۵ درصد) گزارش شد. متوسط سن در ۴۷ بیماری که سنگ مجازی صفراوی گزارش شده بود  $۱۲/۸۱ \pm ۶۰/۹۶$  سال (حداقل ۲۴، حداکثر ۸۳ و میانه ۶۰ سال) و از نظر جنسی ۳۸ بیمار (۸۰/۹ درصد) مؤنث و ۹ بیمار (۱۹/۱ درصد) مذکر بودند. متوسط بیلی‌روبین زمان بسترهای  $۱/۵۹ \pm ۰/۵۲$  میلی‌گرم در دسی لیتر، متوسط ALP زمان بسترهای  $۱۸۶/۸۷ \pm ۸۰/۶۱$  IU/L، متوسط AST زمان بسترهای  $۹۴/۸۷ \pm ۳۱/۵۴$  IU/L، متوسط CBD زمان بسترهای  $۴/۴۵ \pm ۱/۴۵$  میلی‌متر و متوسط قطر مجاری صفراوی داخلی  $۸/۷۴ \pm ۱/۵۳$  میلی‌متر و متوسط قطر بیماری تحت کبدی  $۴/۸۹ \pm ۰/۸$  میلی‌متر بود. متوسط BMI در ۴۷ بیمار تحت مطالعه  $۲۵/۷۱ \pm ۳/۸۴$  و متوسط زمان بسترهای در بیمارستان در این گروه  $۰/۵۲ \pm ۰/۲۳$  روز بود. بیماری زمینه‌ای HTN و DM به ترتیب در ۲۸ نفر (۵۹/۶ درصد) و ۹ نفر (۱۹/۱ درصد) گزارش شده بود. متغیرهای بررسی شده در دو گروه با و بدون سنگ باقی‌مانده

جدول (۱): متغیرهای مطالعه شده در ۹۹۳ بیمار تحت عمل کله سیستکتومی لپاراسکوپیک

متغیر	میزان
سن (سال)	$48/70 \pm 16/82$
جنسیت	
مؤنث	۸۰۰ (%۸۰/۶)
مذکر	۱۹۳ (%۱۹/۴)
متغیرهای سرمهی زمان بسترهای (قبل از عمل)	
بیلی‌روبین (mg/dl)	$۰/۸۱ \pm ۰/۳$
(IU/L)ALP	$124/21 \pm 45/09$
(IU/L)ALT	$33/45 \pm 23/28$
(IU/L)AST	$35/59 \pm 21/50$
متغیرهای سونوگرافیک زمان بسترهای (قبل از عمل)	
قطر CBD (mm)	$5/60 \pm 1/27$
قطر مجاری صفراوی داخل کبدی (mm)	$4/89 \pm 0/8$
BMI قبل از عمل زمان بسترهای	
(kg/m <sup>2</sup> )	$26/38 \pm 5/02$
روز	$2/98 \pm 0/61$
HTN	$۲۶۳ (%۲۶/۵)$
DM	$۲۲۴ (%۲۳/۶)$
سنگ باقی‌مانده مجرای صفراوی	$۴۷ (%۴/۷۵)$

اطلاعات به صورت انحراف معیار  $\pm$  میانگین یا (درصد) فراوانی نشان داده شده‌اند.

**جدول (2): متغیرهای موردمطالعه در ۴۷ بیمار با سنگ باقی‌مانده مجرای صفراوی به دنبال کله سیستکتومی لایراسکوپیک**

متغیر	
میزان	
سن (سال)	۶۰/۹۶ ± ۱۲/۸۱
جنسیت	مؤنث ۳۸ (%۸۰/۹) ذکر ۹ (%۱۹/۱)
متغیرهای سرمی زمان بسترهای سونوگرافیک (قبل از عمل)	بیلی‌روین (mg/dl) ۱/۵۹ ± ۰/۵۲ (ALP) ۱۸۶/۷ ± ۸۰/۶۱ ALT ۹۴/۸۷ ± ۳۱/۵۴ AST ۹۵/۰۹ ± ۳۰/۵۴
متغیرهای سونوگرافیک زمان بسترهای (قبل از عمل)	CBD (mm) ۸/۷۴ ± ۱/۵۳ قطر مجاري صفراوي داخل كبدی (mm) ۶/۴۸ ± ۱/۲۴
BMI قبل از عمل	(kg/m²) ۲۵/۷۱ ± ۳/۸۴
زمان بسترهای (روز)	۳/۲۳ ± ۰/۵۲
بیماری‌های زمینه‌ای	HTN ۲۸ (%۵۹/۶) DM ۹ (%۱۹/۱)

اطلاعات به صورت انحراف معیار ± میانگین یا (درصد) فراوانی نشان داده شده‌اند.

**جدول (3): متغیرهای موردمطالعه به تفکیک دو گروه با (مورد) و بدون (شاهد) سنگ باقی‌مانده**

متغیر		گروه شاهد	گروه مورد	P.value
سن (سال)			۶۰/۹۶ ± ۱۲/۸۱	۴۸/۷۰ ± ۱۶/۸۲
جنسیت		مؤنث ۳۸ (%۸۰/۹) ذکر ۹ (%۱۹/۱)		۸۰۰ (%۸۰/۶) ۱۹۳ (%۱۹/۴)
متغیرهای سرمی زمان بسترهای (قبل از عمل)			بیلی‌روین (mg/dl) ۱/۵۹ ± ۰/۵۲	۰/۷۶ ± ۰/۲۷
			(ALP) ۱۸۶/۷ ± ۸۰/۶۱	۱۲۱/۱۰ ± ۴۰/۱۶
			ALT ۹۴/۸۷ ± ۳۱/۵۴	۳۰/۴۰ ± ۱۷/۹۹
			AST ۹۵/۰۹ ± ۳۰/۵۴	۳۲/۶۳ ± ۱۵/۹۷
متغیرهای سونوگرافیک زمان بسترهای (قبل از عمل)			CBD (mm) ۸.۷۴ ± ۱/۵۳	۵/۴۴ ± ۱/۰۳
			قطر مجاري صفراوي داخل كبدی (mm) ۶/۴۸ ± ۱/۲۴	۰/۰۰۱
BMI قبل از عمل			(kg/m²) ۲۶/۱۴ ± ۵/۰۷	۰/۰۰۴
زمان بسترهای (روز)			۳/۲۳ ± ۰/۵۲	۲/۹۷ ± ۰/۶۱
بیماری‌های زمینه‌ای		HTN ۲۸ (%۵۹/۶) DM ۹ (%۱۹/۱)		۰/۰۰۱ ۰/۳۵

اطلاعات به صورت انحراف معیار ± میانگین یا (درصد) فراوانی نشان داده شده‌اند.

P.value کمتر از ۰/۰۵ از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شده است.

## بحث

$0.76 \pm 0.076$  میلی‌گرم در دسی لیتر). در مطالعه Barkun و همکاران سطح بیلی‌روبین بالای ۳ میلی‌گرم در دسی لیتر به عنوان ریسک فاکتور مطرح شده است (۶) در مطالعه ما فشارخون به عنوان یکی از بیماری‌های زمینه‌ای همراه در بیماران دارای سنگ باقی‌مانده به طور معنی‌داری شایع‌تر بود و به عنوان یکی از ریسک فاکتورها مطرح گردید. در مطالعه ما دیابت به عنوان یکی از بیماری‌های زمینه‌ای همراه در بیمارانی که تحت کله سیستکتومی لپاراسکوپی بررسی شد که ارتباط معنی‌داری با سنگ باقی‌مانده مجرأ نداشت. در مطالعه Oak بیماری‌های زمینه‌ای فشارخون با وجود فراوانی بیشتر در گروه با سنگ باقی‌مانده در  $0.53 \pm 0.04$  درصد (P = ۰/۱۵) همچنین بیماری زمینه‌ای دیابت نیز ارتباط معنی‌داری با سنگ باقی‌مانده مجرأ صفوای نداشت (P = ۰/۷۰) (۱۱). در مطالعه ما متغیرهای سونوگرافیک زمان بستری همچون قطر CBD و قطر مجاری صفوایی داخل کبدی ارتباط معنی‌داری با وجود سنگ باقی‌مانده مجرأ داشت. متوسط قطر CBD در بیماران دارای سنگ باقی‌مانده به طور معنی‌داری از متوسط قطر CBD در بیماران بدون سنگ بالاتر بود ( $1.52 \pm 0.74$  در برابر  $1.03 \pm 0.44$  میلی‌متر؛ P = ۰/۰۰۱). متوسط قطر مجاری صفوایی داخل کبدی در بیماران دارای سنگ باقی‌مانده به طور معنی‌داری از متوسط قطر مجاری صفوایی داخل کبدی در بیماران بدون سنگ باقی‌مانده در  $0.48 \pm 0.23$  در برابر  $0.41 \pm 0.01$  در مطالعه oak (۱۲) باوجودی که قطر مجاری صفوایی مترک در گروه دارای سنگ بالاتر از گروه بدون سنگ بود ولی ارتباط معنی‌داری با سنگ باقی‌مانده در مطالعه صفوایی نداشت (P = ۰/۶۷) (۱۱). در مطالعه ما BMI بیمارانی که تحت کله سیستکتومی لپاراسکوپیک قرار گرفته بودند ارتباط معنی‌داری با سنگ باقی‌مانده مجرأ نداشت (P = ۰/۲۵) در مطالعه oak و همکاران BMI بیماران قبل از عمل کله سیستکتومی لپاراسکوپیک نیز ارتباط معنی‌داری با سنگ باقی‌مانده مجرأ نداشت (P = ۰/۱) (۱۱). در مطالعه ما زمان بستری در بیماران دارای سنگ باقی‌مانده مجرأ به دنبال کله سیستکتومی به طور معنی‌داری از زمان بستری بیماران بدون سنگ بیشتر بود ( $0.53 \pm 0.23$  روز در برابر  $0.61 \pm 0.97$  روز؛ P = ۰/۰۰۴)، با توجه به این که مطالعات قبلی بر روی سنگ ثانویه کلدوک متمرکز بود و مطالعه بر روی سنگ‌های اولیه کلدوک که در خود کلدوک شکل می‌گیرند کم است. سنگ‌های مجاری صفوایی می‌تواند به دنبال کله سیستکتومی و به صورت درجا درون مجرأ تشکیل شوند. این مطالعه شامل بررسی بیمارانی بود که تحت کله سیستکتومی لپاراسکوپیک قرار گرفته و در طی دوره بررسی دچار سنگ باقی‌مانده مجرأ صفوایی می‌باشدند.

در این مطالعه ریسک فاکتورها و میزان درصد فراوانی سنگ باقی‌مانده مجاری صفوایی متعاقب جراحی کله سیستکتومی لپاراسکوپیک بررسی گردید. در مطالعه فعلی فراوانی سنگ باقی‌مانده مجاری صفوایی متعاقب کله سیستکتومی لپاراسکوپیک ۴/۷۵ درصد بود. این میزان در بررسی‌های مختلف بسیار متغیر گزارش شده است:

Oak و همکاران در یک مطالعه بر روی ۲۰۷ بیمار که تحت کله سیستکتومی لپاراسکوپیک قرار گرفته بودند، فراوانی سنگ باقی‌مانده مجاری صفوایی را  $10.4 \pm 1.0$  درصد در طول دوره پیگیری گزارش نمودند (۱۱). در یک مطالعه دیگر، Ando و همکاران ۱۰/۴۲ بیمار که تحت کله سیستکتومی لپاراسکوپیک قرار گرفته بودند. فراوانی سنگ باقی‌مانده مجرأ صفوایی را  $10.65 \pm 1.0$  درصد گزارش نمودند (۱۲). میزان فراوانی این وضعیت در مطالعات دیگر از  $4 \pm 2.4$  درصد تا  $17 \pm 12$  درصد متغیر بوده است (۱۲-۱۷). هرچند نتیجه حاصل از مطالعه ما نیز در محدوده گزارش شده قرار دارد، ولی همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد محدوده گزارش شده بسیار وسیع است. علل مختلفی توجیه‌کننده این پدیده است که از آن جمله می‌توان به تفاوت در نحوه پیگیری، روش تشخیص سنگ باقی‌مانده در مجرأ صفوایی و مدت پیگیری بیماران اشاره نمود. در مطالعه فعلی میانگین سن به طور مشخص در گروه با سنگ باقی‌مانده بالاتر از گروه بدون سنگ می‌باشد. ( $12.81 \pm 6.096$  در  $12.81 \pm 6.096$ ). در مطالعه oak و همکاران میانگین سن در گروه با سنگ بالاتر از گروه بدون سنگ بود ( $14.5 \pm 5.9$  در  $14.5 \pm 5.9$  سال) (۱۱). در مطالعه و همکاران میانگین سن در گروه با سنگ  $55 \pm 0.001$  در  $48.10 \pm 16.70$  سال بود (۱۲). در مطالعه Noble و همکاران میانگین سن در گروه با سنگ  $57 \pm 0.001$  در  $57 \pm 0.001$  سال بود (۹). در مطالعه Keizman سن بالا به عنوان ریسک فاکتور برای سنگ باقی‌مانده مجرأ گزارش شده بود (۱۳). در مطالعه فعلی ارتباط معنی‌داری بین جنس بیماران دارای سنگ باقی‌مانده و فاقد سنگ وجود نداشت (P = ۰/۹۵). در مطالعات مشابه نیز ارتباط معنی‌داری بین جنس بیماران دارای سنگ باقی‌مانده وجود نداشت (۱۱-۱۳). در مطالعه فعلی ارتباط معنی‌داری بین متغیرهای سرمی زمان بستری همچون سطح بیلی‌روبین بالا، آکالالین فسفاتاز (ALP)، آلانین ترانس‌آمینات (ALT). آسپارتات ترانس‌آمیناز (ASD) با سنگ باقی‌مانده مجرأ صفوایی به دنبال کله سیستکتومی لپاراسکوپیک وجود داشت. در مطالعه ما متوسط سطح بیلی‌روبین زمان بستری در بیماران دارای سنگ به طور معنی‌داری از متوسط سطح بیلی‌روبین زمان بستری در بیماران بدون سنگ بالاتر بود. ( $0.52 \pm 0.05$  در برابر

زمان بستری و بیماری زمینه‌ای فشارخون بود. از طرفی بیماران دارای سنگ باقیمانده در زمان بستری جهت کله سیستکتومی مدت بستری طولانی‌تری داشتند. توجه به ریسک فاکتورهای سنگ باقیمانده مجازی صفوایی اهمیت بررسی این متغیرها را به عنوان راهنمای پروگنوستیک آشکار می‌سازد.

## نتیجه‌گیری

بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر ریسک فاکتورهای سنگ باقیمانده مجرأ به دنبال کله سیستکتومی لپاراسکوپیک سن بالا، سطح بالای بیلی‌روبین، ALT و ALP زمان بستری و قطر بالای CBD و مجازی صفوایی داخل کبدی در

## References:

- Jaunoo SS, Mohandas S, Almond LM. Postcholecystectomy syndrome (PCS). *Int J Surg* 2010;8(1):15-7.
- Chang W-T, Lee K-T, Huang M-C, Chen J-S, Chiang H-C, Kuo K-K, et al. The impact of body mass index on laparoscopic cholecystectomy in Taiwan: an oriental experience. *J Hepatobiliary Pancreat Surg* 2009;16(5):648-54.
- Brown LM, Rogers SJ, Cello JP, Brasel KJ, Inadomi JM. Cost-effective treatment of patients with symptomatic cholelithiasis and possible common bile duct stones. *J Am College Surgeons* 2011;212(6):1049-60 e1-7.
- Berci G, Sackier JM, Paz-Partlow M. Routine or selected intraoperative cholangiography during laparoscopic cholecystectomy? *Am J surgery* 1991;161(3):355-60.
- Byrne MF, McLoughlin MT, Mitchell RM, Gerke H, Kim K, Pappas TN, et al. For patients with predicted low risk for choledocholithiasis undergoing laparoscopic cholecystectomy, selective intraoperative cholangiography and postoperative endoscopic retrograde cholangiopancreatography is an effective strategy to limit unnecessary procedures. *Surgical endoscopy* 2009;23(9):1933-7.
- Barkun AN, Barkun JS, Fried GM, Ghitulescu G, Steinmetz O, Pham C, et al. Useful predictors of bile duct stones in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. *McGill Gallstone Treatment Group*. *Ann surgery* 1994;220(1):32-9.
- Siddiqui MR, Barry J, Lodha K, Parker M, Hasan F. Age and sex differences in complications and convalescence after laparoscopic cholecystectomy. *Magyar sebeszet* 2011;64(4):193-201.
- Sheen AJ, Asthana S, Al-Mukhtar A, Attia M, Toogood GJ. Preoperative determinants of common bile duct stones during laparoscopic cholecystectomy. *Int J Clin Practice* 2008;62(11):1715-9.
- Noble H, Whitley E, Norton S, Thompson M. A study of preoperative factors associated with a poor outcome following laparoscopic bile duct exploration. *Surgical Endoscopy* 2011;25(1):130-9.
- Murphy MM, Shah SA, Simons JP, Csikesz NG, McDade TP, Bodnari A, et al. Predicting major complications after laparoscopic cholecystectomy: a simple risk score. *J Gastrointestinal Surgery* 2009;13(11):1929-36.
- oak JH, paik CN, Chung WC, Lee KM, et al. Risk factor for Recurrence of symptomatic common Bile Duct stone after cholecystectomy Gastroenterology Research and practice. 2012;54(1)4:11.
- Ando T, Tsuyuguchi, Okugawa T, et al. Risk Factors for recurrence of primary bile duct stones after LC. *Gut* 2003; 52(1): 42-8.

- 
13. Keizman D, shalom MI, and Konikoff FM. Recurrent symptomatic common bile duct after cholecystectomy in elderly patients. Gastrointestinal Endoscopy. 2006; 64(1): 60-5.
  14. Tanaka M, Lkeda s, Yoshimoto H, et al. complete follow – up study of Izz patients GB stone after EST. AJS 1987; 154(5): 505-9.

## EVALUATION OF THE FREQUENCY AND PREDISPOSING FACTORS OF RETAINED STONE AFTER LAPARASCOPIC CHOLECYCTECTOMY IN URMIA EMAM KHOMEINI HOSPITAL

Rahim Mahmoudlou<sup>1</sup>, Roya Ghaemi Khiyavi<sup>2</sup>, Farzad Pirzeh<sup>3</sup>

Received: 30 Nov , 2014; Accepted: 1 Feb , 2015

### Abstract

**Background & Aims:** Laparoscopic cholecystectomy is the treatment of choice for symptomatic gallstones. The term postcholecystectomy syndrome (PCS) comprises a heterogeneous group of symptoms and findings in patients who have previously undergone cholecystectomy. With the number of cholecystectomies being performed increasing in the laparoscopic era the number of patients presenting with PCS is also likely to increase. This study aimed to investigate the frequency and predisposing factors of retained stone after laparoscopic cholecystectomy to the referred the patient with CBD stone for preoperative endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP).

**Materials & Methods:** A total of 993 patients were evaluated after laparoscopic cholecystectomy in Urmia Imam Khomeini Teaching Hospital between January 2011 and February 2014. The patients were categorized into two groups according to the presence or absence of retained stone after laparoscopic cholecystectomy, and the risk factors was compared between them.

**Results:** Patients were 800 females and 193 males with a mean age of  $48.70 \pm 16.82$  (range 13-94) years. Retained stone after laparoscopic cholecystectomy occurred in 47 patients (4.75%). The two groups were comparable in terms of patient age, sex, body mass index (BMI), serum level of BIL, ALP, AST, ALT and CBD and intrahepatic bile duct diameter before operation and HTN, DM and duration of admit. The mean level of age and duration of admit and pre-operative serum BIL, ALP, AST, ALT and CBD and intrahepatic bile duct diameter before operation and HTN was significantly higher in the cases with retained stone after laparoscopic cholecystectomy.

**Conclusion:** According to the results of the present study, the measurement of serum BIL, ALP, AST, ALT, and CBD and intrahepatic bile duct diameter before operation may be capable of predicting retained stone after laparoscopic cholecystectomy.

**Keywords:** Cholecystectomy, Laparoscopic, Complication, Retained stone, Risk factors

**Address:** General Surgery Department, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Urmia, Iran

**Tel:** +98 4433780803

**Email:** mahmodlou@yahoo.com

SOURCE: URMIA MED J 2015: 26(1): 38 ISSN: 1027-3727

<sup>1</sup>Associate Professor, General Surgery Department, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran (Corresponding Author)

<sup>2</sup>Student of Medicine, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

<sup>3</sup>Resident, General Surgery Department, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran