

بررسی کیفیت زندگی و رابطه آن با هوش هیجانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (M.S) انجمن M.S شهر ارومیه

سیدهادی اعظمی^۱، سیامک شیخی^{۲*}

تاریخ دریافت ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ تاریخ پذیرش ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

چکیده

پیش‌زمینه و هدف: بیماری ام.اس، از شایع‌ترین و مهم‌ترین اختلالات عصب‌شناختی در جهان می‌باشد. با توجه به اینکه کیفیت زندگی به عنوان احساس ذهنی، پدیده‌های روان‌شناختی می‌باشد که با متغیرهای دیگر روان‌شناختی همانند هوش هیجانی می‌تواند رابطه داشته باشد، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی و رابطه آن با هوش هیجانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (M.S) انجمن M.S شهر ارومیه انجام شده است.

روش: نمونه نهایی مورد بررسی در این پژوهش ۲۱۴ نفر (۹۲ نفر مرد و ۱۲۲ نفر زن) می‌باشد که به صورت روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شده‌اند که برای جمع‌آوری داده‌های مربوطه، از پرسشنامه‌های:

(الف) مقیاس فرم کوتاه (پرسشنامه) کیفیت زندگی (WHOQOL- BREF) و (ب) هوش هیجانی (بار- آن) و جهت تجزیه و تحلیل و تفسیر دادها، از ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی است که بین متغیر کیفیت زندگی و مؤلفه‌های هوش هیجانی از جمله شادمانی، خود شکوفایی، استقلال، واقع‌گرایی، رابطه معنادار و مستقیم و با مؤلفه‌های حل مسئله، روابط بین فردی و همدمی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین در بررسی قدرت پیش‌بینی پذیری، نتایج حاکی از آن بود که هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با میزان ۷۷.۶ درصد، قابلیت پیش‌بینی متغیر کیفیت زندگی را دارا می‌باشند.

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بین کیفیت زندگی و مؤلفه‌های هوش هیجانی رابطه معنادار وجود دارد.
وازگان کلیدی: کیفیت زندگی، هوش هیجانی، بیماری مولتیپل اسکلروزیس (M.S)

مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و هشتم، شماره نهم، ص ۵۲۹-۵۳۹، آذر ۱۳۹۶

آدرس مکاتبه: ارومیه، جاده سرو، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تلفن: ۰۹۳۰۱۴۷۰۰۶۵

Email: m.hadi1354@gmail.com

مقدمه

بیماری در زنان نسبت به مردان شایع‌تر می‌باشد^(۳). تاکنون دليل پیدایش این بیماری مشخص نشده است ولی به نظر می‌رسد که بروز این بیماری ارتباطی با پاسخ‌های خود ایمنی داشته باشد. نوعی ویروس ممکن است باعث تحریک سیستم ایمنی شده و بدن را وادار به تولید پادتن‌هایی کند که به استیبه به عناصر خودی بدن حمله می‌کنند^(۴). سیر بالینی (ام.اس) متنوع بوده و می‌تواند از یک سیر کاملاً خوش‌حیم تا سیر پیش‌رونده و ناتوان‌کننده متغیر باشد^(۵). طبق مطالعه اخیر توسط پیترنگلو^۴ در سال ۲۰۱۴ نسبت مبتلایان

بیماری (MS)^۵ در واقع نوعی بیماری پیش‌رونده سیستم اعصاب مرکزی است که باعث ایجاد اختلال حسی، ضعف، گرفتگی عضلانی، اختلال بینایی، اختلال شناختی، خستگی، لرزش اندامها، اختلال در دفع ادرار، اختلال در دفع مدفوع، اختلال در عملکرد جنسی، اختلال در تعادل، فراموشی، کاهش شنوایی، کرختی، تاری دید، دویینی و اختلال گفتاری در فرد بیمار می‌گردد^(۱). این بیماری غالباً افرادی را مبتلا می‌کند که در مرحله مولد زندگی خود قرار دارند^(۲). این

^۱ گروه روانشناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

^۲ دانشیار گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)

³ multiple sclerosis

⁴ pietrangelo

می‌گیرد. (۱۶) ابعاد متنوعی از کیفیت زندگی وجود دارد که در این پژوهش، ۴ بعد از ابعاد اصلی کیفیت زندگی موردنرسی قرار خواهد گرفت که عبارت‌اند از: ۱. سلامت جسمانی ۲. کیفیت روانی زندگی ۳. روابط اجتماعی ۴. وضعیت زندگی

هوش هیجانی:

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا کیفیت زندگی یک پدیده عینی است یا ذهنی؟ بر طبق دیدگاه‌های فعلی، کیفیت زندگی اساساً یک احساس ذهنی از بهزیستی است که شامل ابعاد فیزیکی، اجتماعی، و معنوی است (۱۸). حال با در نظر گرفتن اینکه کیفیت زندگی به عنوان احساس ذهنی، پدیده‌ای روان‌شناختی می‌باشد که با متغیرهای دیگر روان‌شناختی همانند هوش هیجانی می‌تواند ارتباط داشته باشد که از نظر پژوهشی حائز اهمیت فراوانی است. در مورد مفهوم هوش، روانشناسان به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول بر این اعتقادند که هوش، از یک استعداد کلی و واحد تشكیل می‌شود، اما گروه دوم معتقدند انواع مختلف هوش وجود دارد. آنچه تعریف دقیق از هوش را دچار مناقشه می‌کند آن است که هوش یک مفهوم هیجانی است و در واقع هیچ‌گونه پایه محسوس، عینی و فیزیکی ندارد. هوش یک برچسب کلی برای گروهی از فرایندهاست که از رفتارها و پاسخهای آشکار افراد استنباط می‌شود (۱۹). در سال ۱۹۹۵ میلادی واژه هوش هیجانی به عنوان یکی از مفاهیم سودمند جدید از طرف جامعه آمریکا پذیرفته شد. توجه به هیجان‌ها و کاربرد مناسب آن‌ها در روابط انسانی، درک احوال خود و دیگران، خویشنداری و تسلط بر خواسته‌های آن‌ها، همدلی با دیگران و استفاده مثبت از هیجان‌ها در تفکر و شناخت، موضوع هوش هیجانی می‌باشد. هوش هیجانی در واقع به توانایی‌هایی اشاره می‌کند که در پردازش اطلاعات درباره هیجانات خود شخص و هیجانات دیگران و مدیریت بین آن‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش، مؤلفه هوش هیجانی، به صورت ۵ مقیاس کلی در نظر گرفته می‌شود که هر یک از این مقیاس‌ها، به چندین زیر مقیاس (درمجموع ۱۵ زیر مقیاس) تقسیم شده‌اند که به صورت زیر می‌باشند:

- (۱) **مقیاس درون فردی**، شامل ۵ زیر مقیاس خودآگاهی هیجانی، خود اپرازی، عزت نفس، استقلال و خود شکوفایی.
- (۲) **مقیاس برون فردی**، شامل ۳ زیر مقیاس همدلی، روابط میان فردی و مسئولیت‌پذیری.
- (۳) **مقیاس سازگاری**، شامل ۳ زیر مقیاس حل مسئله، واقعیت‌گرایی و انعطاف‌پذیری.

به (MS) در جهان ۲/۵ میلیون نفر و در ایالت متحده آمریکا ۴۰۰ هزار نفر ذکر شده است بطوريکه هر هفته ۲۰۰۰ مورد جدید شناسایی می‌شود (۶). مطالعه انجام شده توسط سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که میزان شیوع (MS) در سطح جهانی برابر با ۳۰۰۰ نفر در هر ۱۰۰۰۰ نفر می‌باشد همچنین متوسط بروز این بیماری نیز در جهان برابر با ۲/۵ نفر در هر ۱۰۰۰۰ نفر است (۷) طبق آخرین اطلاعات انجمن مولتیپل اسکلروزیس ایران در سال ۱۳۹۳ قریب به ۷۰۰۰ بیمار مبتلا به (MS) در کشور وجود دارد (۸) در حال حاضر انجمن (MS) استان آذربایجان غربی نیز ۱۷۰۰ نفر از مبتلایان را ثبت نموده که در حدود ۵۰۰ نفر در شهر ارومیه زندگی می‌کنند (۹).

بیماری مولتیپل اسکلروزیس (M.S):

بیماری (MS) ماهیت پیش‌رونده دارد و با وجود درمان‌های متعدد همچنان یکی از ناتوان‌کننده‌ترین بیماری‌هایی است که بر جنبه‌های مختلف زندگی فرد تأثیر می‌گذارد بهطوری که فرد در بهترین شرایط زندگی خود که نیاز به فعالیت تشکیل خانواده و زندگی دارد با ابتلا به این بیماری و عوارض متعدد و غیرقابل‌پیش‌بینی آن زندگی طبیعی و عادی او مختل می‌شود. مولتیپل اسکلروزیس استقلال و توانایی فرد را برای شرکت مؤثر در خانواده و اجتماع تهدید می‌کند و همه ابعاد زندگی روزانه وی را تحت تأثیر قرار می‌دهد بهطوری که بیماران را بهسوی فقدان احساس شایستگی و اطمینان از خود سوق می‌دهد (۱۴). بیماران مبتلا به بیماری‌های ناتوان‌کننده مزمن همچون مولتیپل اسکلروزیس با مشکلات وابسته به بیماری‌شان نیز روبرو هستند و این مشکلات شرکت بیماران در فعالیت‌های پیشرفت سلامت را محدود نموده و درنتیجه سبب افزایش عوارض ثانویه و محدودیت در زندگی مستقل می‌گردد (۱۵).

کیفیت زندگی:

کیفیت زندگی، شرایطی است که خوب زیستن را امکان‌پذیر می‌سازد بهنحوی که فرد در یک وضعیت مناسب جسمی، روانی و اجتماعی قادر به انجام فعالیت‌های روزمره باشد و بیمار نیز از کارایی درمان، کنترل بیماری و یا بازتاب احساس رضایت نماید. کیفیت زندگی شامل تمام عملکردهای زندگی مانند عملکرد احساسی، فیزیکی، شیمیایی، درد، خستگی و غیره است. سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را با عنوان "ادرارک فرد از موقعیت زندگی خود در زمینه فرهنگ و نظامهای ارزشی که در آن زندگی می‌کند که در رابطه با اهداف، انتظارات، معیارها و دل مشغولی‌ها می‌باشد" تعریف کرده است. کیفیت زندگی بهمثابه رضایت فرد از زندگی و محیط پیرامونی تعریف می‌شود که نیازها و سایر عوامل ملموس و غیرملموس را که بر بهزیستی همچنانه فرد تأکید دارند در نظر

بیماران حاد که از نظر جسمی و روحی و روانی در وضعیت خوبی نبودند و شرایط لازم را برای ورود به این تحقیق نداشتند از این تحقیق کنار گذاشته شدند.

ابزار پژوهش:

جهت جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات موردنیاز تحقیق، از دو نوع پرسشنامه استفاده شده است که عبارت‌اند از:

- (الف) پرسشنامه مقیاس فرم کوتاه (پرسشنامه کیفیت زندگی)
- (ب) پرسشنامه بار - آن (پرسشنامه هوش هیجانی)

الف) پرسشنامه مقیاس فرم کوتاه (پرسشنامه کیفیت زندگی)

این پرسشنامه جهت سنجش کیفیت زندگی فرد در دو هفته اخیر مورداستفاده قرار می‌گیرد. طراح آن، سازمان بهداشت جهانی^۳ با همکاری ۱۵ مرکز بین‌المللی در سال ۱۹۸۹ است. تعداد سؤالات آن ۲۴ سؤال در قالب ۴ مؤلفه، که دو سؤال اول به هیچ‌یک از جنبه‌ها تعلق ندارد و وضعیت سلامت و کیفیت زندگی را به شکل کلی مورد ارزیابی قرار می‌دهند. بنابراین پرسشنامه درمجموع ۲۶ سؤال دارد که شامل مؤلفه‌های زیر می‌باشد:

- (۱) مؤلفه سلامت جسمانی (فیزیکی)^۴
- (۲) مؤلفه روان‌شناختی^۵
- (۳) مؤلفه روابط اجتماعی^۶
- (۴) مؤلفه محیط زندگی^۷

لازم به ذکر است که نحوده اجرا، به صورت خود اجرا^۸ می‌باشد. نحوده نمره‌گذاری: نمره هر گویه در دامنه‌ای از اعداد (۱ تا ۵) به ترتیب: اصلاً، کم، متوسط، زیاد و کاملاً، و یا خیلی ناراضی‌ام، راضی نیستم، نسبتاً ناراضی‌ام، راضی‌ام، شبيه به آن‌ها مقرر می‌گیرد.

نحوه تفسیر: باید توجه داشته باشید، جهت تفسیر درست این مقیاس باید، نسخه کوتاه، نمرات آن را به نسخه بلند تبدیل کرد و سپس میزان کیفیت زندگی در هر حیطه از صفر تا ۱۰۰ طبق جدول مربوطه، مورد تفسیر قرار دهید، ضمناً حداقل نمره هر حیطه حداقل چهار است و بر این اساس جمع نمرات خام هر حیطه در عدد ۴ ضرب می‌شود.

در نتایج گزارش شده توسط گروه سازنده‌گان مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی که در ۱۵ مرکز بین‌المللی این

۴) مقیاس کنترل استرس، شامل ۲ زیرمقیاس تحمل فشار روانی و کنترل تکانه.

۵) مقیاس خلق کلی، شامل ۲ زیرمقیاس خرسندي و خوشبیني.

مطلوب با مطلب ارائه شده، از آنجایی که بیماری M.S ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی مبتلایان دارد و با در نظر گرفتن این نکته که کیفیت زندگی به عنوان احساس ذهنی پدیدهای روان‌شناختی می‌باشد که با متغیرهای دیگر روان‌شناختی همانند هوش هیجانی می‌تواند ارتباط داشته باشد، لذا مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه کیفیت زندگی با هوش هیجانی، در بیماران مبتلا به M.S با امید شناسایی راهکارهای عملی می‌باشد. برای پاسخ دادن به سؤال تحقیق، فرضیات زیر موردنبررسی قرار خواهد گرفت:

- (۱) بین کیفیت زندگی و مؤلفه‌های هوش هیجانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلرrozیس، رابطه معنادار مستقیم وجود دارد.

(۲) هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن پیش‌بینی کننده کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلرزویس می‌باشد.

پژوهش حاضر، از منظر شیوه گردآوری داده‌ها جزء مطالعات توصیفی و از لحاظ روش پژوهشی، مبتنی بر مفروضات همبستگی و غیرمداخله ای است. جامعه آماری در پژوهش حاضر عبارت است از تعداد ۹۵۰ نفر از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلرزویس عضو انجمن (ام.اس) شهر ارومیه که در نیمه اول سال در آن انجمن دارای ۲۱۰ نفره فعال می‌باشند. نمونه نهایی موردنبررسی در این پژوهش، ۱۴ نفر (۹۲ نفر مود و ۱۲۲ نفر زن) بوده که به صورت روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین شرایط ورود به نمونه پژوهش عبارت بودند از: ۱- عدم ابتلا به هر نوع اختلال نورولوژیک به غیراز (ام.اس) مانند صرع، بیماری‌های دستگاه خارج هرمی و عقب‌ماندگی ذهنی و تومورهای مغزی؛ ۲- مرحله حاد بیماری (کمتر از یک ماه از آخرین مرحله حاد این بیماری) گذشته باشد؛ ۳- بیشتر از یک ماه تحت درمان با آستروئید^۱ بوده باشند؛ ۴- در زمان انجام آزمون کمتر از یک هفته تحت درمان با بنزوپنیکین‌ها^۲ یا دوزهای درمانی بوده باشند؛ ۵- تا ۵ سال قبل از تشخیص ابتلا به بیماری ام.اس دچار اختلالات محور I روان‌پژوهی نبوده باشند؛ ۶- محدوده سنی بین ۱۸ تا ۶۰ سال داشته باشند؛ ۷- تحصیلات سیکل و بیشتر؛ ۸- عدم سوء‌صرف مواد.

^۱ مواد ترکیبی مشابه هورمون جنسی مردانه تستوسترون هستند.

^۲ Benzodiazepin

^۳ WHOQOL- BREF

^۴ Physical Health Domain

^۵ Psychological Domain

^۶ Social relationship Domain

^۷ Environmental Domain

^۸ self report

پاسخهای آزمون بر روی یک مقیاس ۵ درجه‌ای در طیف لیکرت (کاملاً موافق، موافق، نه موافق نه مخالف، مخالف و کاملاً مخالف) تنظیم شده است. ازین‌رو نمره‌گذاری از ۵ به ۱ (کاملاً موافق و کاملاً مخالف ۱) و در بعضی از سؤالات نیز با محتوای منفی یا معکوس که از ۱ به ۵ (کاملاً موافق ۱ و کاملاً مخالف ۵) انجام می‌شود.

اعتبار و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن در تحقیق بار-آن ضریب بازارآمایی پس از یک ماه ۰.۸۵ و بعد از ۴ ماه ۰.۷۵ گزارش شده است. در بررسی دیگری ضریب همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ در هفت نمونه از جمعیت‌های مختلف برای خرده مقیاس‌ها بین ۰.۶۹ و ۰.۸۶ (مسئولیت‌پذیری) تا ۰.۸۶ (حرمت نفس) با میانگین ۰.۷۶ به دست آمد. در ایران نیز زارع میانگین کل همسانی درونی پرسشنامه را ۰.۷۶، و شمس‌آبادی ضریب آلفا را در دامنه‌ای بین ۰.۵۵ (همدلی) تا ۰.۸۳ (کنترل تکانه) با میانگین ۰.۷ گزارش کردند. ضریب پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ برای دانشجویان دختر ۰.۶۸، برای پسران ۰.۷۴ و برای کل ۰.۹۳ همچنین پایایی به روش زوج و فرد ۰.۸۸ به دست آمد. از آنکه پرسشنامه مذکور بارها مورداستفاده قرار گرفته است روایی آن‌ها تأیید می‌گردد (۲۳).

یافته‌ها

یافته‌های تحقیق حاضر به دو صورت نتایج توصیفی، شامل میانگین، انحراف استاندارد و تعداد آزمودنی‌های نمونه برای متغیرهای تحقیق، و نتایج استنباطی شامل، تحلیل ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره بیان شده است. نتایج توصیفی تحقیق، شامل میانگین و انحراف معیار و حداقل و حداقل داده‌های متغیرهای کیفیت زندگی و هوش هیجانی، به ترتیب در جداول شماره ۱ و ۲ بیان شده است.

سازمان انجام شده، ضریب آلفای کرونباخ بین ۰.۷۳ تا ۰.۸۹ برای خرده مقیاس‌های چهارگانه و کل مقیاس گزارش شده است. و در ایران نیز (۳۶) برای پایایی مقیاس از سه روش بازارآمایی با فاصله سه‌هفت‌های، تنسیفی و آلفای کرونباخ استفاده کرد که به ترتیب برابر با ۰.۸۷، ۰.۸۴ و ۰.۸۷ بود. همچنین پایایی مقیاس کیفیت زندگی را (۳۶) سنجیده و ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با ۰.۸۸، برای سلامت جسمی ۰.۷۰، برای سلامت روانی ۰.۷۷ و برای روابط اجتماعی ۰.۶۵ و برای کیفیت محیط زندگی برابر با ۰.۷۷ گزارش کرده است. (۳۶) بهمنظور تعیین روایی مقیاس از روش روایی همزمان استفاده کرد و رابطه نمره کل آزمون و خرده مقیاس‌های آن را با نمره کل و خرده مقیاس‌های پرسشنامه سلامت عمومی از طریق ضریب همبستگی سنجید.

(ب) پرسشنامه بار-آن (Bar - On) (پرسشنامه هوش هیجانی)

این پرسشنامه در مقایسه با سایر پرسشنامه‌های خود، گزارش دهی نسبتاً خلاصه‌تری دارد. علاوه بر این، نخستین پرسشنامه‌ای است که به طور تجربی در مورد هوش هیجانی ساخته شده است و در دسترس می‌باشد. آزمون هوش هیجانی دارای ۵ مقیاس اصلی که هر کدام دارای چندین زیر مقیاس (درمجموع ۱۵ زیر مقیاس) می‌باشد به شرح زیر می‌باشند:

- ۱) مقیاس درون فردی، شامل ۵ زیر مقیاس خودآگاهی هیجانی، خود ابرازی، عزت نفس، استقلال و خود شکوفایی.
- ۲) مقیاس برون فردی، شامل ۳ زیر مقیاس همدلی، روابط میان فردی و مسئولیت‌پذیری.
- ۳) مقیاس سازگاری، شامل ۳ زیر مقیاس حل مسئله، واقعیت‌گرایی و انعطاف‌پذیری.
- ۴) مقیاس کنترل استرس، شامل ۲ زیر مقیاس تحمل فشار روانی و کنترل تکانه.
- ۵) مقیاس خلق کلی، شامل ۲ زیر مقیاس خرسندی و خوش‌بینی.

جدول (۱): میانگین و انحراف استاندارد زیر مقیاس‌های کیفیت زندگی

متغیر	تعداد	حداقل	حداکثر	میانگین	انحراف استاندارد
سلامت جسمانی	۲۱۴	۱۶	۲۸	۲۲.۴۵	۲.۹۳۵
کیفیت روانی زندگی	۲۱۴	۱۰	۲۶	۱۹.۶	۳.۷۸
روابط اجتماعی	۲۱۴	۵	۱۴	۹.۹۹	۲.۴۱۳
وضعیت زندگی	۲۱۴	۱۳	۳۷	۲۴.۶۳	۵.۲۷۷

نتایج بهدست آمده در جدول فوق بیان می کند که زیر مقیاس وضعیت زندگی، با میانگین ۲۴,۶۳ و زیر مقیاس روابط اجتماعی با می باشند.

جدول (۲): میانگین و انحراف استاندارد زیر مقیاس های هوش هیجانی

متغیر	تعداد	حداقل	حداکثر	میانگین	انحراف استاندارد
حل مسئله	۲۱۴	۱۴	۲۹	۲۱,۲۱	۲,۴۲۲
شادمانی	۲۱۴	۹	۳۰	۲۰,۵۷	۴,۷۶۳
استقلال	۲۱۴	۸	۲۷	۱۸,۹۷	۵
تحمل فشار روانی	۲۱۴	۱۰	۲۷	۱۸,۸	۳,۵۴۶
خود شکوفایی	۲۱۴	۱۴	۲۸	۲۰,۲۸	۳,۹۱۵
خودآگاهی هیجانی	۲۱۴	۱۳	۲۶	۱۹,۳۳	۲,۹۲۶
واقع گرایی	۲۱۴	۹	۲۷	۱۷,۵	۳,۶۸۶
روابط بین فردی	۲۱۴	۱۵	۳۰	۲۱,۸۴	۳,۷۰۸
خوب بینی	۲۱۴	۱۳	۳۰	۲۱,۶۴	۳,۳۹۳
احترام به خود	۲۱۴	۹	۲۶	۱۷,۹۲	۴,۴۹۹
خویشن داری	۲۱۴	۶	۲۶	۱۶,۵۶	۵,۰۷۷
انعطاف پذیری	۲۱۴	۱۰	۲۶	۱۷,۶۴	۳,۲۳۸
مسئولیت پذیری	۲۱۴	۱۴	۳۰	۲۳,۲۵	۴,۰۱۸
همدلی	۲۱۴	۱۴	۳۰	۲۲,۸۶	۳,۹۲۵
خود ابرازی	۲۱۴	۱۲	۲۵	۱۸,۹۳	۲,۸۳۷

نتایج بهدست آمده از جدول شماره ۲ بیان می کند که زیر مقیاس مسئولیت پذیری و زیر مقیاس خویشن داری به ترتیب با میانگین های ۲۳,۲۵ و ۱۶,۵۶ دارای بیشترین و کمترین میانگین می باشند.

جدول (۳): نرمال بودن متغیرها و آزمون کولموگروف - اسمیرینوف

شاخص ها متغیرها	مقدار کالموگروف اسمیرنوف	سطح معناداری
کیفیت زندگی	۱,۲۰۵	۰,۱۱۰
هوش هیجانی	۲,۴۵۳	۰,۰۹۳

جدول فوق توزیع نمرات متغیرها را نشان می دهد و نتایج کولموگروف - اسمیرنوف نشانگر این است که در همه متغیرها سطح معنی داری بزرگ تر از $0,05$ می باشد که حاکی از نرمال بودن توزیع داده ها است و به عبارتی مفروضه هنجار بودن توزیع در این رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

استفاده شده است. نتایج این بخش، در جداول شماره ۴ و ۵ بیان شده است.

فرضیه شماره ۱: بررسی رابطه بین متغیر کیفیت زندگی و مؤلفه‌های هوش هیجانی

جهت بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیر کیفیت زندگی و مؤلفه‌های هوش هیجانی، از ضریب همبستگی پیرسون

جدول (۴): بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و مؤلفه‌های هوش هیجانی

متغیرها	حل مسئله	شادمانی	استقلال	تحمل فشار روانی	خود شکوفایی	خودآگاهی هیجانی	واقع گرایی
کیفیت زندگی	-۰,۳۵xx	۰,۲۶۸xx	۰,۵۲۵xx	۰,۰۵۴	۰,۵۵۲xx	۰,۰۹۱	۰,۲۰۲xx
سلامت	-۰,۲۵۴xx	۰,۱۷۶xx	۰,۴۸۶xx	-۰,۰۱۸	۰,۴۳۵xx	۰,۰۹۸	۰,۱۰۴
جسمانی	-۰,۲۱۳xx	۰,۳۴۲xx	۰,۳۵۵xx	۰,۰۴۲	۰,۴۲۹xx	-۰,۰۹۷	۰,۱۴۵x
روابط اجتماعی	-۰,۲۴۹xx	۰,۰۲۳	۰,۵۱۲xx	-۰,۰۰۶	۰,۴۴xx	۰,۰۰۹	۰,۲۲۹xx
وضعيت زندگی	-۰,۳۷۱xx	۰,۲۴۴xx	۰,۴۱xx	۰,۱۰۲	۰,۴۷۸xx	۰,۲۱۳xx	۰,۱۸۴xx

در سطح معنی داری ۰,۰۵ معنی دار است.
در سطح معنی داری ۰,۰۱ معنی دار است.

جدول (۵): رابطه بین کیفیت زندگی و مؤلفه‌های هوش هیجانی

متغیرها	فردي	روابط بين	خوشبياني	احترام به	خود	خويشنن داري	انعطافپذيری	مسئولييتپذيری	همدلي	خود	ابزاری
کیفیت زندگی	-۰,۳۱۳xx	۰,۰۴۸	۰,۴۲۸xx	۰,۴۷۱xx	۰,۰۷۲	۰,۰۰۸	-۰,۱۷۱x	-۰,۰۲۴	-۰,۰۰۰	-۰,۰۲۴	-
سلامت	-۰,۰۶۶	۰,۱۹xx	۰,۳۲۹xx	۰,۳۸۹xx	۰,۱۲۳	۰,۰۶۹	-۰,۰۰۶۸	-۰,۰۴۴	-	-	-
جسمانی	-۰,۱۹۸xx	-۰,۱۴۱x	۰,۲۴۴xx	۰,۲۶۳xx	-۰,۰۲۶	۰,۰۰۵۴	۰,۰۰۲۲	-۰,۱۷۲x	-	-	-
روابط اجتماعی	-۰,۲۷۹xx	-۰,۰۲۲	۰,۳۷۳xx	۰,۰۴۴xx	-۰,۰۱۱	-۰,۰۱۱	-۰,۰۱۹۶xx	-۰,۰۰۱	-	-	-
وضعيت زندگی	-۰,۳۹۱xx	۰,۱۱۳	۰,۴۲۴xx	۰,۴۴۱xx	۰,۱۱۵	-۰,۰۶۲	-۰,۰۲۶۸xx	-۰,۲۸۴xx	-	-	-

در سطح معنی داری ۰,۰۵ معنی دار است.
در سطح معنی داری ۰,۰۱ معنی دار است.

همبستگی بیشتر می‌شود. همچنین منفی بودن این عدد نشان‌دهنده رابطه معکوس بین دو متغیر می‌باشد. همان‌طور که اعداد جدول نشان می‌دهد، بین مؤلفه‌های کیفیت زندگی و هوش

در جداول شماره ۴ و ۵، چنانچه مقدار ضریب همبستگی بین صفر و یک باشد، نشان از وجود همبستگی مستقیم بین دو متغیر می‌باشد که هرچقدر این عدد به یک نزدیک‌تر باشد، شدت

جهت پیش‌بینی میزان کیفیت زندگی از روی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن، از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این بخش، در جدول شماره ۶ بیان شده است.

هیجانی، همبستگی مستقیم و معکوس وجود دارد که هر کدام به تفصیل در بخش بحث و نتیجه‌گیری بیان شده است. فرضیه شماره ۲: پیش‌بینی میزان کیفیت زندگی از روی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن

جدول (۶): پیش‌بینی میزان کیفیت زندگی از روی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن

P	Adjusted R ²	R ²	Beta	SE	B	متغیر
0,0006			---	28,934	-79,851	مقدار ثابت
0,0001			5,134	0,339	1,839	هوش هیجانی
0,0001			-1,186	0,392	-4,073	حل مسئله
0,0001			-0,793	0,436	-1,955	شادمانی
0,0002			-0,492	0,362	-1,156	استقلال
0,0006			-0,342	0,406	-1,133	تحمل فشار روانی
0,0002			-0,532	0,497	-1,595	خود شکوفایی
0,0001			-0,441	0,504	-1,771	خودآگاهی هیجانی
0,0001	0,758	0,776	-0,803	0,368	-2,558	واقع‌گرایی
0,0001			-0,614	0,459	-1,945	روابط بین فردی
0,0001			-0,662	0,41	-2,049	خوش‌بینی
0,0043			-0,463	0,593	-1,209	احترام به خود
0,0068			0,347	0,437	0,802	خوبی‌شن‌داری
0,0001			-0,775	0,39	-2,737	انعطاف‌پذیری
0,0001			-0,566	0,375	-1,654	مسئولیت‌پذیری
0,0001			-0,564	0,403	-1,687	همدلی
0,0001			-0,574	0,318	-2,378	خودابرازی

مولتیپل اسکلرزویس از جمله اختلالات ناتوان‌کننده عصبی در بالغین مخصوصاً جوانان می‌باشد. سیر بالینی این اختلال از یک بیماری خوش‌خیم و فاقد عالم شدید تا یک بیماری پیش‌رونده و ناتوان‌کننده متفاوت است.

(۱) نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بین کیفیت زندگی و مؤلفه‌های هوش هیجانی رابطه معنادار وجود دارد به صورتی که این متغیر با مؤلفه‌های شادمانی، استقلال، خود شکوفایی،

با توجه به نتایج به دست‌آمده از جدول فوق، هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با میزان ۷۷,۶ درصد توانایی و قابلیت پیش‌بینی متغیر کیفیت زندگی را دارا می‌باشند که این پیش‌بینی در سطح معنی‌داری ۱,۰۰ محقق شده است.

بحث و نتیجه‌گیری

رفاه خود می‌داند و معتقد است که اگر در ک فرد از زندگی اش کاهش یابد سایر ویژگی‌های او تحت تأثیر قرار گرفته و باعث تحلیل آن‌ها درنهایت افت کیفیت زندگی می‌شود. اگرچه از لحاظ وسعت مفاهیم بررسی شده در زمینه کیفیت زندگی، فرانس را جزو طبقه سوم به حساب می‌آورند یعنی جزو اندیشمندانی که کیفیت زندگی را هم از بعد عینی بررسی کرده‌اند و هم از بعد ذهنی ولی بررسی کارهای او (۳۲، ۳۳) نشان می‌دهد که بیشتر این کارها تمترکز بر بعد ذهنی کیفیت زندگی است و بخش عینی این مفهوم بازنمایی مناسبی بهمثابه کارهای انجام شده توسط فیلیپس را نشان نمی‌دهد و می‌توان گفت که هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن همان‌طور که در فرضیه نخستین تحقیق نیز بررسی شد می‌تواند قدرت پیش‌بینی پذیری فرد را در بحث کیفیت زندگی به همراه داشته باشد، به عنوان مثال افزایش رفاه ذهنی شامل لذت‌جویی، رضایتمندی، هدف‌داری در زندگی و رشد شخصی باعث رشد و شکوفایی در مسیر سعادت و به طبع آن کیفیت زندگی گردد.

از محدودیت‌های این پژوهش می‌توان به استفاده از مقیاس‌های خود گزارش دهی، تعداد کم نمونه، عدم امکان نمونه‌گیری تصادفی، عدم کنترل برخی از متغیرها از جمله وضعیت اقتصادی و اجتماعی اشاره نمود لذا پیشنهاد می‌شود افراد مبتلا به‌غیراز درمان‌های دارویی تحت نظر روانشناس قرار داشته و با درمان‌های حمایتی و ایجاد نگرش مثبت به زندگی به این افراد در مقابله با بیماری کمک شود و این پژوهش در سایر مناطق جغرافیایی و فرهنگ‌های مختلف و در صورت امکان بر روی حجم بزرگ‌تری انجام گیرد. همچنین پیشنهاد می‌شود که متغیرهای دیگر (مثل سبک‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناکارآمد، سبک‌های دل‌بستگی، سبک‌های فرزندپروری) که احتمالاً در بروز بیماری مولتیپل اسکلروزیس نقش دارند مورد بررسی قرار گیرد.

تشکر و قدردانی

این مطالعه برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد می‌باشد به این وسیله نویسندها مقاله از همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و تمام بیمارانی که علی‌رغم مشکلات موجود و ناتوانی‌های خاص این بیماری صادقانه همکاری‌های لازم را در طول این پژوهش داشتند و کارکنان محترم انجمن (MS) ارومیه تشکر و قدردانی می‌نمایند.

⁴ De Young & Hasher & Djikic & Criger & Peterson

⁵ - Ferrans

واقع‌گرایی، احترام به خود و خویشندهای رابطه معنی‌دار مستقیم و با مؤلفه‌های حل مسئله و روابط بین فردی و همدلی رابطه معنی‌دار معکوس می‌باشد. همچنین بین کیفیت زندگی و مؤلفه‌های خوش‌بینی، انعطاف‌پذیری و مستولیت‌پذیری، خودآگاهی هیجانی و تحمل فشار روانی رابطه معنی‌دار مشاهده نشد. این یافته‌های تحقیق با نتایج یافته‌های دیویدسون^۱ (۲۴)، دیمینوف^۲ (۲۵)، پاقلعه، آقایی و زارع (۲۶)، شفیع آبادی و سودانی (۲۷)، شکیبا، فتنی و اصغر نژاد (۲۸)، حکیم جوادی (۲۹)، مورالس و سانچز^۳ (۳۰) و دیان، هاشر، دیجیک، کریگر و پترسون^۴ (۳۱) همسو می‌باشد.

تحقیقات متعدد نشان دادند که سطوح پایین هوش هیجانی به ناتوانی در مقابله و توانایی اداره هیجانات فرد منجر می‌شود که می‌تواند در آغاز سیاری از مشکلات نقش داشته باشد. در سال‌های اخیر علاقه به نقش هوش هیجانی و برنامه‌های مرتبط با ارتقا آن بهمنظور افزایش و بهبود سازگاری هیجانی و موقفيت تحصیلی و کاهش رفتارهای آسیبزا در محیط‌های آموزشی، افزایش چشم‌گیری یافته است و عدم توانایی در کنترل و مدیریت هیجان‌ها می‌تواند سلامت روانی افراد را در محیط‌های اجتماعی و آموزشی به خطر انداخته و بهنوعی به مخاطره کشاندن کیفیت زندگی فرد در ابعاد مختلف را به دنبال داشته باشد (۲۴).

(۲) همچنین نتایج نشان داد که نمرات هوش هیجانی و تمامی مؤلفه‌های هوش هیجانی غیر از خویشندهای رابطه معنی‌دار پیش‌بینی کننده میزان کیفیت زندگی می‌باشد که در این میان تمامی مؤلفه‌ها در سطح معنی‌داری ۱۰۰-۰ می‌باشد و فقط مؤلفه احترام به خود در سطح معنی‌داری ۰-۵۰ معنی‌دار می‌باشد. همچنین جدول شماره ۶ نمایانگر این موضوع است که هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن تا ۷۷.۶ درصد قابلیت پیش‌بینی کیفیت زندگی را دارا می‌باشند. این یافته‌های تحقیق با نتایج یافته‌های پاقلعه، آقایی و زارع (۲۶)، شفیع آبادی و سودانی (۲۷)، شکیبا، فتنی و اصغر نژاد (۲۸)، حکیم جوادی (۲۹)، مورالس و سانچز (۳۰) و دیان، هاشر، دیجیک، کریگر و پترسون (۳۱) همسو می‌باشد.

در تبیین این نظریه می‌توان گفت فرانس^۵ (۳۲) معتقد است که از لحاظ مفهومی کیفیت زندگی هم جسمی است و هم ذهنی، ولی جنبه ذهنی آن غلبه دارد. فرانس کیفیت زندگی را ادراک فرد از

¹ Dividson

² Deminof

³ Díaz-Morales & Sánchez-López

References:

1. Dividson S. The efficacy of cognitive behavioral group therapy on quality of insomnia and resilience of multiple sclerosis. *Behavior Res Therapy* 2014; 46: 487-95.
2. Deminof L. The efficacy of cognitive behavioral group therapy on the depression anxiety and resilience of multiple sclerosis woman. *J Anxiety Disorder* 2010; 11: 279-315.
3. Braunwald E. Harrison's principles of internal medicine. 7th ed. New York: McGraw Hill; 2012.
4. Zandipour R. Investigating the relationship between religious orientation and irrational beliefs as predictors of depression in MS patients Ahvaz. Ahvaz: 2009 (Persian)
5. Nabavi M, Pourfarzam Sh, Qasemi H. Epidemiology clinical course and prognosis of Multiple Sclerosis in 203 patients referring to the M.S clinic of Shahid Mostafa Khomeini Hospital. *Tehran J Fac Med* 2013; 64(7): 90-7. (Persian)
6. Pietrangelo A. Medically Reviewed by George Krucik MD MBA. 2014.
7. Statistic of multiple sclerosis in World Health Organization. Available From: <http://www.WHo.int.2008>.
8. Status of MS Patients in IRAN MS Society. 2014. Available From: <http://www.new.iranms.ir>.
9. Status of MS patients in West Azerbaijan province. Urmia. 2014. Available from: <http://www.MSWa.ir>.
10. Soltani M, Hejazi SM, Noorian A, Zendedel A, Ashkanifar M. The Effect of Selected Aerobic Exercise on the Balance Improvement in Multiple Sclerosis Patients. *J Mashhad School Nurs Midwifery* 2009; 2(9): 107-13. (Persian)
11. Hazrati M, Zahmatkeshan N, Dejbakhsh T, Nikseresh AR, Zeyghami B. The Effect of Rehabilitation Process on the Quality of Life in Multiple Sclerosis Patients. *Armaghane Danesh J* 2005; 10(3): 53-64. (Persian)
12. Ebrahimi H, Saeedi M, Sarvari F, Sokhangoo M. Effect of Aquatic Exercise Program on Fatigue in Women with Multiple Sclerosis. *J Mazand Univ Med Sci* 2012; 22(94): 54-61. (Persian)
13. Ghanati E, Hadiyan M, Daghigiasli AR. Economic Expenditures of Multiple Sclerosis Medications and Feasibility of Providing Health Insurance Policies for medicationsjournal. *J Health Admin* 2011;14(45): 28-32. (Persian)
14. Morgante L. Hope in multiple sclerosis a nursing perspective. *Int J of MS care* 2000;2 (2): 3-7.
15. Rafeeyan Z, Azarbarzin M, Moosa FM, Hasanzadeh A. Effect of aquatic exercise on the multiple sclerosis patients' quality of life. *Iran J Nurs Midwifery Res* 2010;15(1):43. (Persian)
16. Goshtasebi, Azita. To evaluate health related quality of life in Tehran. khlash 1st Conference on Global quality of life. Tehran: Tarbiat Modares University; 2004. (Persian)
17. Gill TM, Feinstein AR. A critical appraisal of the quality of life Measurement. *J Am Med Association* 1994;27(2): 619-26.
18. Addington-Hall J, Kalra L. Measuring quality of life: Who should measure quality of life? *BMJ* 2001;322(7299):1417.
19. Ismaili M, Ahadi H, Delaware A, Shafabadi A. Impact of education on mental health components of emotional intelligence. *Iran J Psychiatry Clin Psychol* 2007; 13(49), 158-65. (Persian)
20. Akbarzada N. Emotional intelligence, vision and Salvvy. Tehran: al-Farab; 2004. (Persian)
21. Goleman D. hvsh emotional (ability to love and love to see).trjmh Nasrin Parsa, Tehran: growth; 2003.
22. Shamradlv M. Compare the role of emotional intelligence and IQ in predicting academic achievement of high school students in Tehran, educational psychology master's thesis, Faculty of

- Psychology and Educational Sciences. Tehran: Shahid Beheshti University in Tehran; 2004. (Persian)
23. Hosseinzad A, Minister A, MoseAlrzayy Aghdam Arash. The relationship components of emotional intelligence and personality traits in patients with multiple sclerosis. *Urmia Med J* 2013; 24: 1027-35. (Persian)
24. Dividson SD. The efficacy of cognitive behavioral group therapyon quality of insomnia and resilience of multiple sclerosis. *Behav Res Therap* 2014; 46: 487-95.
25. Deminof L. The efficacy ofcognitive behavioralgroup therapyon the depression, anxiety and resilience of multiple sclerosis woman. *J Anxiety Disorder* 2010; 11: 279-315.
26. Abedi S. Comprehensive meta-analysis of emotional intelligence and mental health. *Psychol Health J* 2010;4(2): 21-32. (Persian)
27. Ehyakonandeh M, Shafabadi A, Sodani M. Relationship Between Emotional Intelligence and Mental Health of the Behbahan Islamic Azad University Counseling girl Students. *Knowledge Res Appl Psychol* 2009;11(41):1-16. (Persian)
28. Fata L, Farid AA. Relationship types of psychological and emotional intelligence - social and practical tips on improving emotional intelligence. *J Appl Psychol* 2008; 2(4): 607-25. (Persian)
29. Hakim Javadi M. Brrsy about the quality of attachment and emotional intelligence in gifted and normal students. (Dissertation). Tehran: Faculty of Psychology and Educational Sciences of Tehran University; 2004. (Persian)
30. Diaz-Morales JF, Sanchez-Lopez MP. Morningness-eveningness and anxiety amongadults: a matter of sex/gender? *Pers Individ Diff* 2008; 44:1391-401.
31. De Young CG, Hasher L, Djikic M, Criger B, Peterson JB. Morning people are stable people: Circadian rhythm and the higher-order factors of the big five. *Pers Individ Dif* 2009; 43: 267-76.
32. Ferrans CE. Conceptualizations of quality of life in cardiovascular research. *Prog Cardiovasc Nurs* 1992;7(1):2-6.
33. Ferrans CE. Development of a conceptual model of quality of life. *Sch Inq Nurs Pract* 1996;10(3):293-304.
34. Lee Y-J. Subjective quality of life measurement in Taipei. *Build Environ* 2008;43(7):1205-15.
35. Khan F, McPhail T, Brand C, Turner-Stokes L, Kilpatrick T. Multiple sclerosis: disability profile and quality of life in an Australian community cohort. *Int J Rehabil Res* 2006;29(2):87-96.
36. Nasiri H, Hashemi L, Hosseini SM. Quality of life shiraz university according to the world Health organization Quality of life scale. 3rd seminar on mental health; 2006. P. 365-8. (Persian)

QUALITY OF LIFE AND ITS RELATION TO EMOTIONAL INTELLIGENCE IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS (M.S) IN URMIA

Seyed Hadi Ezamy¹, Siamak Sheikhi^{2*}

Received: 22 Aug, 2017; Accepted: 23 Oct, 2017

Abstract

Background & Aims: Multiple sclerosis (M.S.) disease is one of the most common neurological disorders in the world. Considering the fact that quality of life as subjective mental feeling can be related to psychological variables such as emotional intelligence, the present study aimed to investigate the quality of life and its relation to emotional intelligence in patients with M.S in Urmia city.

Materials & Methods: This study was conducted on 214 patients (92 males and 122 females) who were selected by available sampling method. To collect data WHOQOL-BREF quality of life assessment and emotional intelligence questionnaire were used. The data were analyzed using multivariate regression and correlation coefficient.

Results: It was revealed that there was significant relationship between the quality of life and emotional intelligence components such as happiness, self-fulfillment, independence, realism; and reverse relationship with elements of problem solving, interpersonal relationships and empathy.

Conclusion: The present results suggest that there is relationship between quality of life and significant components of emotional intelligence.

Keywords: Multiple sclerosis (M.S.), Quality of life, Emotional intelligence

Address: Department of Psychology, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

Tel: +9809301470065

Email: m.hadi1354@gmail.com

SOURCE: URMIA MED J 2017: 28(9): 539 ISSN: 1027-3727

¹ Department of Psychology, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran

² Associated Professor, Department of Psychology, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran (Corresponding Author)