

الگوی رشد و تغذیه کودکان مبتلا به فیبروز کیستیک و مقایسه آن با کودکان سالم در استان آذربایجان غربی، ایران

دکتر ماندانا رفیعی^۱، پروین پورعبداللهی^۲، سید جمال قائم مقامی^۳، مریم صمصامی^۴، دکتر داود پورحسین^۵، عزیزه نصیری^۶

تاریخ دریافت ۸۸/۰۲/۱۵ تاریخ پذیرش ۸۸/۰۵/۰۷

چکیده

پیش زمینه و هدف: بیماری فیبروز کیستیک Cystic Fibrosis(CF) شایع‌ترین بیماری کشنده ژنتیکی است. مرگ در اثر سوء تغذیه با اختلالات الکترولیتی همراه در این بیماران رخ می‌دهد. ارزیابی وضعیت تغذیه، غربالگری کودکان مبتلا به بیماری CF و پیشگیری مرتب رشد برای پیشگیری از سوء تغذیه و افزایش CF امید به زندگی از مسائل مهم در این بیماران به شمار می‌رود. هدف از مطالعه حاضر بررسی الگوی رشد و وضعیت تغذیه ای کودکان مبتلا به اختلال CF می‌باشد.

مواد و روش کار: ۳۴ کودک مبتلا به بیماری CF در محدوده سنی ۳ ماه تا ۱۱ سال که در مرکز پزشکی - درمانی کودکان تبریز در یک مطالعه توصیفی - تحلیلی با استفاده از اندازه گیری‌های تن سنجی وزن- قد، محیط ماهیچه وسط بازو و وضعیت تغذیه ای آن‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های بسامد خوراک (FFQ) Food Frequency Questionnaire مورد مطالعه قرار گرفته و با ۳۴ کودک سالم همسان از نظر سنی و جنسی مقایسه شدند.

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار سن کودکان $61/85 \pm 61/38$ ماه بود. مقایسه وضعیت رشد کودکان بیمار و سالم اختلاف آماری معنی‌داری از نظر شاخص وزن به قد ($P=0/04$)، وزن به سن ($P=0/000$) نشان داد. ولی در سایر وضعیت‌های رشد اختلاف معنی‌داری ملاحظه نشد. و از نظر مصرف مکمل‌ها، $85/3$ درصد مکمل‌های غذایی و $70/6$ درصد کودکان مکمل‌های آنزیمی مصرف می‌کردند علاوه بر این مقایسه الگوهای غذایی کودکان بیمار با سالم تنها اختلاف معنی‌داری از نظر مصرف ماکارونی، بستنی، تخم مرغ، جگر نشان داد ولی از نظر مصرف سایر اقلام غذایی اختلاف‌ها معنی‌دار نبود. ضمناً با والدین $47/1$ درصد کودکان بیمار در مورد تغذیه مشاوره صورت گرفته بود.

بحث و نتیجه‌گیری: سوء تغذیه و ناتوانی در رشد یکی از مسائل مهم کودکان CF می‌باشد. درمان‌های پزشکی مناسب و استاندارد برای این کودکان از طریق مداخلات تغذیه‌ای و مشاوره تغذیه می‌تواند بهبودی نسبی در رشد و پیشگیری از عوارض را در این کودکان ایجاد نماید.

کلید واژه‌ها: فیبروز کیستیک، کودک، تغذیه، مکمل‌های آنزیمی، رشد

مجله پزشکی ارومیه، دوره بیستم، شماره چهارم، ص ۲۸۳-۲۷۸، زمستان ۱۳۸۸

آدرس مکاتبه: تبریز، خیابان ششگلان، بیمارستان کودکان، تلفن: ۰۹۱۴۱۱۴۶۹۸۲
Email: mrafeey@yahoo.com

کشنده‌ای است که تقریباً یک مورد در ۲۰۰۰ تولد زنده اتفاق افتاده و از طریق صفت اتوزومال مغلوب منتقل می‌شود (۲۱، ۲۰)

مقدمه

بیماری فیبروز کیستیک^۷ شایع‌ترین بیماری ژنتیکی

^۱ فوق تخصص گوارش اطفال، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز تحقیقات کبد و بیماری‌های گوارش، مرکز تحقیقات سلامت کودکان، (نویسنده مسئول)

^۲ استادیار گروه بیوشیمی و رژیم درمانی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

^۳ مریم گروه صنایع غذایی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

^۴ کارشناس تغذیه، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

^۵ رزیدنت کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

^۶ کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

^۷ Cystic Fibrosis(CF)

اندازه گیری‌های وزن، قد، دور بازو و چین پوستی ثبت گردید و الگوهای غذایی از طریق تکمیل پرسشنامه‌های بسامد خوراک (FFQ) که حاوی ۵۴ ماده غذایی از پنج گروه غذایی باضافه مواد متفرقه بود مورد بررسی قرار گرفت^(۸). تعیین وضعیت رشد کودکان با استفاده از معیار انحراف از میانه رفرانس^۲ در شاخص‌های مختلف صورت گرفته و در حالت کلی کودکان به دو گروه طبیعی و پایین‌تر از حد طبیعی تقسیم شدند. منظور از کودکان طبیعی شامل تمام مواردی بود که در Z score بالاتر از -۱ قرار داشتند و کودکان سوء تغذیه‌ای شامل تمام موارد پایین‌تر از -۱ بود^(۹,۱۰). محیط ماهیچه وسط بازو^۳ روش سریع برای تخمین میزان توده عضلانی است که از فرمول MAMC= MAC (mm) - (TSF(mm×r)^۱) بدست می‌آید. در این فرمول MAC اندازه دور میانه بازو است که با متر معمولی اندازه گرفته شده و چربی زیر پوست بازو^۴ می‌باشد که با دستگاهی بنام کالیبر در ناحیه قسمت پشتی عضله سه سر بازو اندازه گرفته می‌شود. در ارتباط با الگوهای غذایی مصرفی کودکان پرسشنامه بسامد خوراک (تکرر مصرف) تمام اقلام غذایی مصرفی کودکان بعد از تکمیل از طریق مصاحبه مستقیم با کودکان بیمار و سالم با والدین آن‌ها جمع آوری و بین دو گروه کودکان سالم و بیمار مقایسه صورت گرفته است. و برای مقایسه ۳۴ کودک سالم، که از نظر سن و جنس با گروه بیمار مشابه بودند و جهت واکسیناسیون و یا کامل نمودن دفترچه‌های بهداشتی به کلینیک بهداشت و واکسیناسیون مراجعه نموده بودند وارد مطالعه شدند. در مجموع ۶۸ کودک برای ارزیابی وضعیت رشد و الگوهای غذایی دریافتی انتخاب شدند. در این مطالعه برای آنالیز متغیرهای کمی تی تست و برای متغیرهای کیفی از تست کای دو استفاده شد.

یافته‌ها

از ۳۴ کودک بیمار - مورد مطالعه ۲۹/۴ درصد دختر و ۷۰/۶ درصد پسر بودند. میانگین و انحراف معیار سن کودکان مورد مطالعه $61/85 \pm 61/38$ ماه بود. میانگین و انحراف معیار زمان شروع مراقبت در کودکان بیمار $29/61 \pm 18/88$ ماه بود. مصرف مکمل‌های غذایی در ۸۵/۳ درصد و آنژیم‌ها در ۷۰/۶ درصد در کودکان بیمار وجود داشت.

توزیع فراوانی نوع مکمل‌های غذایی مصرفی توسط کودکان بیمار در جدول شماره ۱ نشان داده شده است.

بیماری CF با عملکرد غیر طبیعی ترشحات خارجی غدد برون‌ریز مثل پانکراس، سیستم تنفسی، غدد بzacی، سیستم صفراوی، غدد پاراتیازال، همراه می‌باشد^(۳,۱). در این بیماران عرق حاوی مقدار فراوانی کلراید سدیم و به مقدار کمتری پتاسیم می‌باشد. به علت ترشحات بسیار چسبناک غدد برون‌ریز موكوسزا گاهی موكووپسیدوز^۱ هم نامیده می‌شود. ترشح غیرطبیعی موكوس باعث انسداد سلول‌های تولید کننده موكوس یا مجاری انسدادی شده و باعث آسم، پنومونی عود کننده و سینوزیت (به عنوان نشانگان عمدۀ بیماری) می‌گردد^(۱,۳,۴).

فقدان آنژیم‌های پانکراس با متابولیسم چربی‌ها، پروتئین‌ها و کربوهیدرات‌ها تداخل نموده و به دلیل نقایص جذبی، کمبود ویتامین‌ها روی می‌دهد و مرگ و میر معمولاً به علت سوء تغذیه یا برونکوپنومونی اتفاق می‌افتد^(۱,۵).

در بیماران CF سوء تغذیه یکی از مسائل مهم بوده و اطلاعات ثبت شده از موارد CF نشان می‌دهد که در درصد کودکان کمتر از ۲۰ سال مبتلا به CF در مقایسه با استانداردهای امریکا وزن پایین‌تر از صد ک ۵ پرسانتایل و در ۱۵ درصد موارد به زیر صد ک ۵ پرسانتایل برای قد می‌باشد^(۶). برای پیشگیری از سوء تغذیه و افزایش امید به زندگی، معالجه و مداخله مناسب، ارزیابی وضعیت تغذیه و غربالگری کودکان CF و پیگیری رشد آن‌ها با اهمیت می‌باشد^(۴). هدف از مطالعه حاضر بررسی الگوی رشد و وضعیت تغذیه‌ای کودکان مبتلا به اختلال فیبروزکیستیک و مقایسه آن با کودکان سالم در منطقه می‌باشد.

مواد و روش کار

در یک مطالعه توصیفی - تحلیلی، ۳۴ کودک مبتلا به اختلال فیبروزکیستیک در محدوده سنی ۳ ماه تا ۱۱ سال که در مرکز پزشکی - درمانی کودکان تبریز دارای بروندۀ بوده و از نظر علایم بالینی و آزمایشات بیوشیمیائی (تست عرق و بررسی ژنتیک) مورد تایید قرار گرفته بودند^(۷) و والدین آن‌ها موافقت خود را کتبأ اعلام کرده بودند، وارد مطالعه شدند. کودکانی که والدین آن‌ها تمایلی به شرکت در بررسی نداشتند یا تشخیص بیماری آن‌ها براساس معیارهای بیماری فیبروز کیستیک تایید نگردیده بود از مطالعه حذف شدند^(۷). ابتدا طبق تماس تلفنی به تمام والدین اطلاع رسانی شد تا در صورت تمایل برای شرکت در این بررسی به کلینیک گوارش بیمارستان کودکان مراجعه نمایند. توسط همکاران متخصص تغذیه و رزیدنت کودکان برای هر کدام از کودکان پرونده‌ای تشکیل و معیارهای رشدی کودکان از طریق

² Z score

³ Mid Arm muscle circumference (MAMC)

⁴ triceps skin fold (TSF)

^۱ Muccovisidose

جدول شماره (۱): توزیع فراوانی نوع مکمل‌های غذایی مصرفی توسط کودکان مبتلا به CF

نوع مکمل غذایی مصرفی	تعداد	درصد
آهن	۲۳	۶۵/۷
کلسیم	۲۰	۵۸/۸
اسیدفولیک	۱۹	۵۵/۹
مولتی ویتامین	۱۷	۵۰
روی	۷	۲۰/۶
E ویتامین	۱۱	۳۲/۴
K ویتامین	۲	۵/۹
B کمپلکس	۳	۸/۸

وضعیت رشد کودکان بیمار و سالم براساس شاخص‌های وزن به قد، وزن به سن، قد به سن و محیط ماهیچه وسط بازو در جدول شماره ۲ نشان داده شده است (۱۰، ۹).

براساس اطلاعات بدست آمده در ۶۱/۸ درصد موارد وضعیت اشتهای کودکان بیمار توسط والدین خوب و در ۲۶/۵ درصد متوجه ۱۱/۸ درصد نیز بد گزارش شده است.

جدول شماره (۲): مقایسه وضعیت رشد کودکان بیمار و سالم

شاخص	وضعیت رشد									
	وزن/قد					وزن/قد				
	بیمار	کنترل	بیمار	کنترل	بیمار	کنترل	بیمار	کنترل	بیمار	کنترل
*نرمال٪	(۵۱/۷۲)	(۳۹/۲۸)	(۴۸/۴۵)	(۳۴/۳۸)	(۶۲/۵)	(۱۵/۱۵)	(۷۰/۳۷)	(۴۲/۸۶)		
تعداد	۱۵	۱۱	۱۶	۱۱	۲۰	۵	۱۹	۱۲		
پایین‌تر از نرمال٪										
(۴۸/۲۸)	(۶۰/۷۲)	(۵۱/۵۵)	(۶۵/۶۲)	(۳۷/۵)	(۸۴/۸۵)	(۲۹/۶۳)	(۶۷/۴۴)			
تعداد	۱۴	۱۷	۱۷	۲۱	۱۲	۲۸	۸	۱۶		
جمع	۲۹	۲۸	۳۲	۳۲	۳۲	۳۳	۲۷	۲۸		

*منظور از کودکان نرمال شامل تمام مواردی است که در Z score بالاتر از -۱- قرار داشتند و کودکان پایین‌تر از نرمال شامل تمام موارد پایین‌تر از -۱- می‌باشد.

روی دریافت کالری بالا از طریق رژیم غذایی کودکان بیمار تأکید شده بود.

مقایسه وضعیت رشد کودکان سالم و بیمار اختلاف معنی‌داری از نظر شاخص وزن به قد ($P=0.04$)، وزن به سن ($P=0.000$) نشان داد. ولی در سایر شاخص‌ها اختلاف معنی‌داری ملاحظه نشد.

مقایسه الگوی غذایی بین کودکان بیمار با سالم نشان داد مصرف ماکارونی، بستنی، تخم مرغ، جگر اختلاف معنی‌دار، ولی در مصرف سایر اقلام غذایی اختلاف آماری معنی‌داری مشاهده نگردید. علاوه بر این با والدین ۴۷/۱ درصد کودکان بیمار مشاوره در مورد تغذیه و رژیم غذایی صورت گرفته بود و در ۶۴/۷ درصد موارد مشاوره بر

بحث و نتیجه‌گیری

بیماری فیبروز کیستیک (CF) یک اختلال شدید ژنتیکی در بین کودکان است که بر روی بسیاری از اندام‌های بدن ولی اساساً بر روی دستگاه تنفسی و گوارشی تاثیر می‌گذارد. در این بیماران سوء تغذیه به عنوان یکی از مسائل مهم مورد توجه می‌باشد. در

آوردنده (۶). Fabiola و همکارانش نیز در یک مطالعه آینده نگر ۷۴ بیمار CF با تغییرات سنی شش ماه تا ۱۸/۴ سال را مورد پیگیری قرار داده بودند، سوء تغذیه متوسط را در بیماران خودگزارش نمودند، همچنین در این مطالعه تاثیر مشاوره تغذیه‌ای به صورت شفاهی و یا از طریق ارائه یک کتابچه مود ارزیابی قرار گرفت که در پایان مطالعه افزایش معنی‌دار در شاخص‌های آنتروپومتریک قد/وزن و بهبودی نسبی در بین کودکان زیر ۵ سال دیده شد (۱۳،۲). بر اساس اطلاعات بدست آمده از مطالعه حاضر نیز با والدین ۴۷/۱ درصد کودکان بیمار در مورد تغذیه و رژیم غذایی مشاوره صورت گرفته بود. ولی اطلاعات مربوط به اثر بخشی تاثیر مشاوره نیازمند زمان بیشتر و مطالعه دیگری می‌باشد.

از معیارهای دیگر ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای بیماران مطالعه الگوهای غذایی مصرفی آن‌ها می‌باشد، این ارزیابی و آنالیزهای رژیمی اطلاعات مهمی را در مورد حجم و تنوع مواد غذایی مصرفی در بیماران مبتلا به CF به ما خواهد داد. با بدست آوردن این اطلاعات از طریق متدهای مختلف می‌توان برای درمان و بهبودی نسبی بیماران CF مداخلات لازم را انجام داد (۱۴،۱۵).

الگوی غذایی بیماران را می‌توان از طریق تکمیل فرم‌های بسامد خوراک (تکرر و دفعات مصرف) و یا ثبت سه روزه مواد غذایی و یا از طریق تکمیل فرم‌های ۲۴ ساعت یادآمد خوراک مطالعه کرد. در مطالعه حاضر از روش بسامد خوراک استفاده شده که در آن تکرر مصرف حدود ۵۳ نوع ماده غذایی از خود بیماران یا والدین کودکان پرسیده شده است. براساس نتایج بدست آمده بعد از تبدیل همه موارد مصرفی (تکرر) به روز مشخص شد که تنها از نظر مصرف ماکارونی، بستنی، تخم مرغ و جگر بین دو گروه بیمار و سالم اختلاف آماری معنی‌داری وجود داشت.

با توجه به این که ماکارونی جزو گروه غذایی نان و غلات می‌باشد و سهم اعظم انرژی روزانه افراد (۵۰-۵۵ درصد) با مصرف مواد غذایی این گروه بدست می‌آید و تخم مرغ نیز یک ماده غذایی از گروه پروتئین‌ها است که از نظر دارا بودن پروتئین با کیفیت خوب با ارزش بوده و جزو منابع پروتئینی مرجع به حساب می‌آید. لذا در هر دو مورد بمنظور می‌آید بهدلیل پایین بودن مصرف در بین بیماران نیازمند تاکید و توجه بیشتر در مشاوره تغذیه‌ای برای والدین کودکان می‌باشد (۳).

تغذیه نقش مهمی در معالجه کودکان CF دارد. لذا غربالگری روتین تغذیه‌ای (افزایش میزان چربی و کالری) و ارزیابی آن بسیار مهم است. پیگیری پارامترهای رشد یک جزء مهم غربالگری و ارزیابی بیماران CF می‌باشد. هر کودک بیمار باید به صورت مرتب وزن شده و از سایر معیارهای آنتروپومتریک برای تعیین وضعیت تغذیه و رشد استفاده بشود (۸،۵).

سال ۱۹۹۷ ۱۹ گزارشات مربوط به انجمان بیماران CF نشان داد، قد ۱۹ درصد بیماران مبتلا به CF در پرسانتایل کمتر از صدک ۵ و وزن ۲۴ درصد نیز کمتر از صدک ۵ پرسانتایل می‌باشد (۱۱). مقایسه وضعیت رشد کودکان مطالعه حاضر با کودکان سالم اختلاف معنی‌داری را از نظر شاخص وزن به قد (W/H)، وزن به سن (W/A) نشان می‌دهد. به طوری که ۶۷/۴ درصد کودکان بیمار از از نظر شاخص وزن به قد (W/H) و ۸۴/۸ درصد کودکان بیمار از نظر شاخص وزن به سن (W/A) (براساس معیار -< Z Score در وضعیت پایین‌تر از رشد طبیعی قرار داشتند. وزن یکی از شاخص‌های مهم است که در بین کودکان و نوجوانان در ارتباط با سن و قد مورد بررسی قرار می‌گیرد که در مطالعه حاضر هر دو معیار در مقایسه با رشد کودکان سالم پایین‌تر از حد طبیعی می‌باشد. کاهش وزن و عدم توانایی در وزن گیری کودکان و نوجوانان مبتلا به CF در اثر عدم تعادل انرژی بهدلیل عفونت‌های مزمун دستگاه تنفسی، سوء تغذیه، بی‌اشتهاایی و افزایش ضربی متابولیکی می‌باشد (۶). از نظر شاخص قدی نیز با وجود این که ۶۵/۶ درصد کودکان بیمار پایین‌تر از نرمال قرار داشتند ولی در مقایسه با کودکان سالم اختلاف آماری معنی‌دار نبود. تاخیر در رشد قد نتیجه سوء تغذیه طولانی مدت بوده و علاوه بر تغذیه عوامل دیگری مثل ژنتیک در آن تاثیر دارند.

Nicolas و همکاران در یک مطالعه آینده نگر سه ساله بر روی ۲۵ کودک ۵-۱۰ ساله با اختلال CF و مقایسه آن‌ها با ۲۶ کودک سالم در گروه کنترل مشاهده کردند که کودکان مبتلا به CF رشد قدی پایین‌تری نسبت به کودکان گروه کنترل داشته و در طولانی مدت توده بدون چربی بدن^۱ و توده چربی بدن^۲ پسران بیمار در مقایسه با دختران بیمار پایین‌تر بود (۱۰). رشد غیرطبیعی در کودکان CF همیشگی و معمولاً با افزایش موارد بیماری و مرگ و میر همراه است. هر چند در چند دهه گذشته بهدلیل افزایش آگاهی و درک بهتری از نیازهای تغذیه‌ای ویژه این کودکان، رشد این کودکان نیز بهبود یافته ولی با وجود این حتی زمانی که قد نهائی این کودکان بالای پرسانتایل سوم باشد هنوز ممکن است به صورت پنهانی از نظر رسیدن به قد نرمال کمبودی وجود داشته باشد (۱۲). Jillian و همکارانش پایین‌تر در سال ۲۰۰۵ در مطالعه‌ای بر روی ۶۹ کودک ۶-۱۰ سال با اختلال CF در امریکا مشاهده کردند در شروع مطالعه کودکان رشد ناکافی و دریافت کمتری از انرژی داشتند و در اثر توصیه‌های تغذیه‌ای و آموزش والدین در انتهای مطالعه وضعیت نسبتاً مطلوب‌تری را بدست

¹ Fat free mass (FFM)

² (FM) Fat mass

بیماران توصیه‌های مناسب تغذیه‌ای می‌توانند از طریق پزشک معالج و متخصص تغذیه مورد تأکید قرار گیرد. اهداف اولیه درمان CF تغذیه‌ای جبران کمبود انرژی و ارتقاء رشد و تکامل بیماران CF باید باشد. علاوه بر این می‌توان با ارئه یک پمفت یا کتابچه آموزشی والدین یا مراقبین کودکان بیمار را با بیماری CF آشنا کرد.

از محدودیت‌های این مطالعه تعداد کم بیماران مورد بررسی می‌باشد که نیازمند مطالعات چند مرکزی در استان‌های مختلف ایران برای شناسایی و ثبت علایم بالینی، ژنتیکی و رشد و چگونگی درمان و پیشگیری از عوارض در بیماران CF می‌باشد.

پیشنهادات

با توجه به این‌که در مطالعه حاضر سو، تغذیه بر اساس شاخص‌های مختلف رشد در بین کودکان و نوجوانان مورد مطالعه دیده می‌شود لذا با تدوین یک برنامه مراقبت تغذیه‌ای برای

Fibrosis Foundation consensus report. J Pediatr 2008; 153(2):S4-14.

8. Leonard A, Davis E, Rosenstein BJ, Zeitlin PL, Paranjape SM, Peeler D, et al. Description of a standardized nutrition classification plan and its relation to nutritional outcomes in children with cystic fibrosis. J Pediatr Psychol 2010 35(1):42-4.
9. Expert committee on physical status. Physical status: the use and interpretation of anthropometry. World Health Organization; 1995.
10. United Nations. How to weigh and measure children: assessing the nutritional status on young children in household surveys. New York: United Nations; 1986.

11. Fung EB, Barden EM, Wasserman D, Zemel BS, Heinrich BT, Scanlin TF, et al. A Six-Month Study of Growth and Energy Expenditure in Children with Cystic Fibrosis Taking a Pulmonary Inhalation Medication. J of AM Coll Nutr. 1999; 18(4):330-8

12. Nicolas S, Deborah AK, Lisa LB Kathleen JP, Thomas FS, Virginia AS, et al. Prospective evaluation of growth, nutrition of status, and body composition in children with cystic fibrosis. Am J Clin Nutr 2000, 72: 407-13

13. Stapleton DR, Gurrin LC, Zubrick SR, Sllburn SR. What do children with cystic fibrosis and their parents know about nutrition and pancreatic enzyme? J Am Diet Assoc 2000;100:1494-500.

References

1. McKay K, Wilcken B. Newborn screening for cystic fibrosis offers an advantage over symptomatic diagnosis for the long term benefit of patients: the motion for. Paediatr Respir Rev 2008; 9(4):290-4.
2. Fabioa VA, Joaquin CR, Ary LC. Nutritional follow up of cystic fibrosis patients, the role of nutrition evaluation. J Padiatr 2004;8(6): 475-82.
3. Muller DH. Medical nutrition therapy for pulmonary disease. In: Mahan KL, Escott-Stump S, Editors. Krause's food, nutrition and therapy. 12thED. Missouri: Elsevier Saunders; 2008; 35. P.909-16.
4. Wooldridge NH. Pulmonary Diseases. In: Samour PQ, King Helm K. Handbook of pediatric nutrition. 3rd Ed. Maryland: Jones & Bartlett; 2005. P. 307-15.
5. Shaker Hosseini R, Ozma B, Tavakoli A. Principles of nutritional care in cystic fibrosis. Tehran: National Nutrition and Food Technology Research Center; 2004.
6. Trabulsi J, Joam IS, Richard FI, Irene EO, Mare Y, Yavgeny Det al. Energy balance and the accuracy of reported energy intake in preadolescent children with cystic fibrosis. Am J Clin Nutr 2006; 84: 523-30.
7. Farrell PM, Rosenstein BJ, White TB, Accurso FJ, Castellani C, Cutting GR, et al. Cystic fibrosis foundation guidelines for diagnosis of cystic fibrosis in newborns through older adults: Cystic

-
14. Truby H, Paxton AS. Body image and dieting behavior in cystic fibrosis. *Pediatrics* 2001; 107(6):E92.
 15. Sylvia ES. Nutrition and diagnosis related care. 6th Ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. P. 285-90.