

مطالعه اثر آنتی اکسیدانتی هایپوتائورین در کاهش آسیب‌های ناشی از استرس اکسیداتیو در رشد جنین‌های موش سوری حاصل از لقاح آزمایشگاهی

دکتر عباس احمدی^{۱*}، دکتر رجبعلی صدرخانلو^۲

تاریخ دریافت ۸۹/۶/۲۵، تاریخ پذیرش ۸۹/۷/۲۶

چکیده

پیش زمینه و هدف: در بدن مکانیسم‌های متعددی در برابر ROS وجود دارد اما در شرایط آزمایشگاهی این سیستم دفاعی وجود ندارد و تولید رادیکال‌های آزاد نیز بیشتر است. هدف از این مطالعه بررسی مورفولوژیکی آسیب‌های حاصل از استرس اکسیداتیو و اثرات آنتی اکسیدانتی هایپوتائورین در دو شرایط طبیعی و تنش اکسیداتیو بر روند رشد رویان‌های موش سوری در محیط کشت است.

مواد و روش کار: بعد از انجام لقاح، زیگوت‌ها در محیط HTF حاوی ۴ mg/ml BSA در گروه‌های مختلف کشت داده شدند. برای بررسی اثر استرس اکسیداتیو، زیگوت‌ها را به مدت یک ساعت در غلظت‌های مختلف H_2O_2 کشت داده شدند و برای مطالعه اثر هایپوتائورین در شرایط استرس اکسیداتیو زیگوت‌ها بعد از کشت در غلظت ۱۰ میکرومول H_2O_2 در غلظت‌های مختلف هایپوتائورین کشت داده شدند و اثر هایپوتائورین بر روند رشد جنین‌ها با افزودن غلظت‌های مختلف آن به محیط کشت بدون تنش اکسیداتیو بررسی شد.

یافته‌ها: رشد جنین‌ها پس از قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض H_2O_2 به شدت کاهش یافت که در غلظت‌های بالا مشخص‌تر بود. هایپوتائورین تا حدودی آسیب‌های ناشی از تنش اکسیداتیو را مهار و باعث بهبود روند رشد جنینی، کیفیت جنین‌ها، مورفولوژی جنین‌ها و افزایش میزان شکافتگی جنین‌های کشت داده شده گردید ($P < 0.05$).

بحث و نتیجه گیری: برای مقابله با اثرات سوء ROS در سیستم کشت جنینی از آنتی اکسیدان‌های گوناگونی می‌توان استفاده کرد. این مطالعه نشان داد که استرس اکسیداتیو باعث آسیب‌های جنینی و کاهش روند رشد جنینی و افزودن هایپوتائورین باعث بهبود روند رشد جنینی می‌شود. براساس یافته‌های این مطالعه افزودن آنتی اکسیدانت‌هایی نظیر هایپوتائورین به محیط کشت‌های جنینی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها: ROS، زیگوت، توقف جنینی، هایپوتائورین، موش سوری

مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و یکم، شماره چهارم، ص ۳۱۷-۳۰۶، آذر و دی ۱۳۸۹

آدرس مکاتبه: ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، بخش علوم تشریح، صندوق پستی ۱۱۷۷-۵۷۱۵۵، تلفن: ۰۹۱۴۱۴۹۸۵۲۴

E-mail: abbasahmadi60@yahoo.com

مقدمه

می‌شود. این رادیکال‌های آزاد به شدت ناپایدار بوده و به‌طور سریع و غیر اختصاصی با مولکول‌های زیستی واکنش نشان داده و منجر به ایجاد و گسترش انواع آسیب‌های سلولی از جمله پراکسیداسیون غشاء پلاسمایی، اکسیداسیون اسیدهای آمینه و نوکلئوتیک، آپوپتوز و نکروز می‌شود که در نهایت منجر به کاهش

استرس اکسیداتیو در نتیجه‌ی عدم تعادل در بین تولید رادیکال‌های آزاد اکسیژن در مقابل ظرفیت دفاع آنتی اکسیدانتی سلول ایجاد می‌شود که منجر به تولید انواع رادیکال‌های آزاد شامل آنیون سوپراکسید (O_2^-)، رادیکال هیدروکسیل (OH) و مشتقات غیررادیکالی از اکسیژن مانند هیدروژن پراکسید (H_2O_2)

^۱ رزیدنت علوم تشریح، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه (نویسنده مسئول)

^۲ استاد بافت شناسی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

قدرت زیست‌پذیری^۱ و تکوین جنین‌ها در محیط کشت می‌گردد (۱-۳). Bediawy و همکارانش ارتباط بین جنین انسان با سطح ROS^۲ را در محیط کشت بررسی کردند و نشان دادند که سطح بالای ROS در روز اول کشت همراه با کاهش شکافتگی و افزایش فرگمانتاسیون جنینی و کاهش در تعداد بلاستوسیت و در نهایت کاهش توان باروری می‌شود. محققان مذکور همچنین گزارش نمودند که افزایش میزان ROS در مایع فولیکولار به عنوان یک مارکر پیش‌بینی کننده میزان موفقیت لقاح در محیط آزمایشگاهی است (۴) Yoneda و همکارانش اثرات افزایش غلظت اکسیژن و H₂O₂ را بر جنین گزارش کرده و نشان دادند که کاهش سطح H₂O₂ در شرایط محیط کشت موجب بهبود کیفیت جنین در مرحله بلاستوسیت می‌شود (۵،۶،۷). کاملاً مشخص شده است که ROS از جمله پراکسید هیدروژن، آنیون سوپراکساید و رادیکال‌های هیدروکسیل در تمامی حالت‌های پاتولوژیک به مقدار زیادی تولید می‌شوند. این نظریه وجود دارد که ROS نقش مهمی را در بعضی از اختلالات عملکردی تولید مثلی ایفا می‌نماید و شواهدی بر اندازه‌گیری اثر ROS بر عملکرد تولیدمثلی نر گزارش شده است (۷).

اختلالات تولیدمثلی در هر دو جنس نر و ماده که به‌وسیله استرس اکسیداتیو ایجاد می‌شوند گزارش شده‌اند و تاثیر سطح ROS روی زیگوت‌ها و یا در رشد ابتدایی جنین مشخص شده است. استرس اکسیداتیو می‌تواند مسئول پاتولوژی توکسیسیته جنینی در هیدروسالپنکس باشد (۸) رادیکال‌های آزاد اکسیژن در محیط کشت می‌تواند رشد جنینی، میزان آبستنی کلینیکی و سطح باروری را تحت تاثیر قرار دهد. در هر دو برنامه IVF و تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم^۳ (ICSI)، بالا بردن غلظت ROS در محیط کشت در روز اول نشان داده شد که با کاهش میزان آبستنی ارتباط دارد (۹).

با رعایت این مسئله، در برنامه‌های لقاح آزمایشگاهی - انتقال جنین انسان، این نظریه وجود دارد که در طی غلظت بالای اکسیژن در سیستم کشت آزمایشگاهی تعداد جنین‌های با کیفیت رشد خوب کم خواهد بود (۱۱-۹). علاوه بر این، ارتباط مستقیم بین غلظت بالای پراکسید هیدروژن و بالا رفتن درجه فراگمانتاسیون یا آپوپتوز در جنین‌های موش نشان داده شده است (۱۲، ۱۱). Wang و همکارانش گزارش کردند که افزودن آنتی‌اکسیدان‌ها نسبت تکوین بلاستوسیت را در جنین‌های موش بهبود می‌بخشد (۱۳). Catt و همکارانش نشان دادند که استفاده از

آنتی‌اکسیدان‌ها در محیط کشت موجب بهبود نسبت باروری و افزایش لانه‌گزینی می‌شوند (۱۲).

اثرات تخریبی رادیکال‌های آزاد توسط سیستم آنتی‌اکسیدان درون سلولی کنترل و یا مهار می‌گردد و در بدن دو نوع آنتی‌اکسیدان وجود دارد: (۱) آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی (۲) آنتی‌اکسیدان‌های غیر آنزیمی.

آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی به عنوان آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی بوده و قادرند ROS را خنثی کرده و ساختار سلولی را از صدمه ناشی از آن محافظت کنند و شامل سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوکاتایون پراکسیداز می‌باشد. آنتی‌اکسیدان‌های غیر آنزیمی در واقع آنتی‌اکسیدان‌های سنتتیک یا مکمل‌های غذایی هستند و شامل ویتامین C، ویتامین A، سلنیوم، روی، گلوکاتایون، تائورین و هاپوتائورین، کاروتن و بتاکاروتن است (۱۶-۱۴، ۳، ۲). ولی با این وجود به نظر می‌رسد که در شرایط کشت آزمایشگاهی جنین‌های پستانداران، میزان تولید این رادیکال‌های آزاد بیش از ظرفیت آنتی‌اکسیدانی این جنین‌ها می‌باشد، لذا به منظور غلبه بر این عدم تعادل اکسیدانی، انواع آنتی‌اکسیدان‌های با منشأ خارجی پیش‌بینی و ارائه گردیده است (۱۷، ۲۰). از سوی دیگر به نظر می‌رسد توان دفاع آنتی‌اکسیدان جنین‌های آزمایشگاهی در مقاطع مختلف تکوین تا مرحله بلاستوسیت متفاوت باشد. گروهی از محققان معتقدند که ظرفیت اصلی آنتی‌اکسیدانی جنین در مراحل اولیه تقسیمات زیگوت وابسته به ذخیره mRNA مادری به ارث رسیده درون اووسیت می‌باشد و تدریجاً در مرحله فعالیت ژنوم جنینی^۴ یا ZGA است که ژنوم جنین قادر به فعالیت متقابل در مقابل اکسیدان‌های تولید شده درون سلول و یا اکسیدان‌های محیط کشت می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد که نیاز خاص جنین به آنتی‌اکسیدان‌های خارجی در مقاطع قبل و بعد از ZGA متفاوت باشد (۱۴، ۹). هاپوتائورین رادیکال‌های هیدروکسیل را خنثی می‌نماید و از پراکسیداسیون لیپیدی اسپرم جلوگیری می‌کند (۱۸). این فعالیت آنتی‌اکسیداتیو در غلظت‌های پایین هم اثر می‌کند (۱۹). در این مسیر، هاپوتائورین می‌تواند در مایعات تولیدمثلی نقش فعال آنتی‌اکسیدانی را برای گامت‌ها و جنین‌ها داشته باشد (۲۰، ۲۱). گزارش شده است که هاپوتائورین اثرات مثبتی بر روند رشد جنین در هامستر (۲۲) خوک (۲۳) و انسان (۲۴) داشته است. با توجه به مطالب فوق در این تحقیق تاثیر افزودن هاپوتائورین به عنوان یک آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی به محیط کشت در ارتباط با مهار ROS در دو شرایط تنش اکسیداتیو و

¹ Viability² Reactive Oxygen Species³ Intra cytoplasmic Sperm Injection⁴ Zygote genome activation

غیراکسیدانتیو مورد مطالعه قرار گرفت.

مواد و روش کار

برای انجام این مطالعه از موش‌های سوری نژاد NMRI ماده بارور جوان ۱۰-۶ هفته‌ای و نر ۱۲-۸ هفته استفاده شد که در شرایط استاندارد با دمای 22 ± 2 درجه سانتی‌گراد، رطوبت ۶۰-۳۰ درصد و با سیکل نوری، ۱۴ ساعت روشنایی و ۱۰ ساعت تاریکی نگهداری می‌شدند. آب و غذا به‌صورت آزاد در دسترس بود. این مطالعه بر روی جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی صورت گرفت که نیاز به تحریک تخم‌گذاری دارد و به شرح زیر صورت گرفت:

تزریق ۷/۵ واحد (IU) هورمون ^۱PMMSG (ساخت شرکت Folligon، هلند) به حجم ۰/۱ میلی‌لیتر، و ۴۸-۴۶ ساعت بعد تزریق ۷/۵ واحد هورمون ^۲hCG (ساخت شرکت Folligon، هلند) به حجم ۰/۱ میلی‌لیتر به روش داخل صفاقی صورت گرفت. عمل تخم‌گذاری معمولاً ۱۰-۱۲ ساعت بعد از تزریق hCG صورت می‌گیرد.

لقاح آزمایشگاهی: ابتدا برای تهیه اسپرم، موش نر را به روش جابجایی گردن کشته و بعد از جدا کردن بافت‌های همبندی اطراف دم اپیدیدیم را همراه با مقداری از کانال دفران از بیضه جدا کرده و در داخل پتریدیش ۶ سانتی‌متری حاوی محیط کشت HTF^۳ حاوی (Sigma, USA) 4 mg/ml BSA^۴ که قبلاً جهت تعادل در داخل انکوباتور قرار داده شده بود قرار داده و بعد از ایجاد چند برش در دم اپیدیدیم و فشار در کانال دفران برای خروج اسپرم‌ها در داخل انکوباتور CO₂ گذاشته شد. بعد از ۰/۵ ساعت اسپرم‌ها خارج و در محیط پخش شدند، سپس اسپرم‌ها را شستشو داده و با استفاده از روش شناورسازی^۵ اسپرم‌های متحرک را جدا نموده و جهت ظرفیت‌یابی، اسپرم‌ها به مدت یک ساعت در انکوباتور CO₂ با دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد قرار داده شدند (۲۵). تخم‌گیری و لقاح داخل آزمایشگاهی: ۱۰-۱۲ ساعت پس از تزریق hCG (صبح روز بعد) بعد از کشتن حیوان به روش جابجایی گردن، لوله‌های رحمی را جدا کرده و در داخل محیط کشت ۳۷ درجه از قبل آماده شده قرار داده و با استفاده از فن Dissecting تخمک‌ها را خارج نموده و پس از شستشو تخمک‌ها را به قطرات محیط لقاح در زیر روغن معدنی حاوی محیط کشت HTF حاوی 4 mg/ml BSA منتقل کرده و سپس اسپرم‌ها را به

تعداد یک میلیون به ازای هر میلی‌لیتر محیط کشت، اضافه شد. عمل لقاح حدود ۶-۵ ساعت بعد از اضافه کردن اسپرم صورت می‌گیرد و بدین ترتیب زیگوت بدست آمد (۲۵).

گروه‌های آزمایشی: در ادامه تحقیق زیگوت‌های شستشو داده شده حاصل از لقاح آزمایشگاهی به طور تصادفی در گروه‌های مختلف آزمایشی تقسیم گردید که به تعداد ۲۰ جنین در داخل قطرات ۱۰۰ میکرولیتری در زیر روغن معدنی^۶ کشت داده شدند. جهت ایجاد استرس اکسیدانتیو در زیگوت‌ها با افزودن غلظت‌های مختلف هیدروژن پراکسید (H₂O₂) (ساخت شرکت Sigma، آمریکا) به محیط کشت و انکوباسیون به مدت یک ساعت استفاده شد و بعد زیگوت‌ها به قطرات کشت گروه‌های مختلف منتقل شدند و در مراحل بعدی ارزیابی جنین‌ها صورت گرفت.

گروه‌های آزمایشی مورد مطالعه

- گروه کنترل که زیگوت‌ها تنها در محیط کشت HTF حاوی 4 mg/ml BSA کشت داده شدند
- گروه‌هایی که زیگوت‌ها جهت ایجاد تنش اکسیدانتیو به مدت یک ساعت در محیط کشت حاوی غلظت‌های مختلف پراکسید هیدروژن (۵، ۱۰، ۲۵ و ۵۰ میکرومول) کشت داده شدند
- گروه‌هایی که به محیط کشت غلظت‌های مختلف هایپوتائورین (ساخت شرکت Sigma، آمریکا)، (۰/۱، ۰/۵، ۱/۰، ۰ و ۱۰ میکرومول) اضافه شد.
- گروه‌هایی که زیگوت‌ها ابتدا جهت ایجاد تنش اکسیدانتیو در آن‌ها به مدت ۱ ساعت در محیط کشت حاوی ۱۰ μM پراکسید هیدروژن کشت داده شده و در مرحله بعدی به محیط کشت‌های حاوی غلظت‌های مختلف هایپوتائورین (۰/۱، ۰/۵، ۱/۰، ۰ و ۱۰ میکرومول) منتقل شدند
- ارزیابی رشد جنین‌ها

برای ارزیابی تاثیر تنش اکسیدانتیو و اثر آنتی‌اکسیدانتی مواد مذکور در زیر میکروسکوپ فاز کنتراست مراحل رشد جنینی مورد ارزیابی قرار گرفت، بررسی میزان شکافتگی ۲۴ ساعت بعد از کشت صورت گرفته و در زیگوت‌های موجود در هر گروه، جنین‌ها از نظر میزان فراگمانتاسیون و میزان طی مراحل رشد جنینی یا تعداد جنین‌های متوقف شده و تیپ‌بندی جنین‌های متوقف شده با توجه به فاکتورهای مختلفی نظیر لیز شدن جنین‌ها و نکروتیک بودن آن‌ها و فراگمانتاسیون و وجود وزیکول‌های سیتوپلاسمیک مقایسه گردیدند. تیپ‌بندی جنین‌های متوقف شده به شرح ذیل بود: تیپ I

¹ Pregnant Mare Serum Gonadotropine (Folligon)

² Human Chorionic Gonadotropine (Folligon)

³ Human Tubal Fluid

⁴ Bovine Serum Albumin

⁵ Swim up

⁶ Mineral Oil

بر روی افزایش کیفیت رشد جنین‌ها و شکافتگی بوده است (نمودار ۳).

همچنین مقایسه درصد جنین‌های متوقف شده نشان داد که افزودن غلظت‌های مختلف هاپیوتائورین باعث کاهش کاملاً معنی‌دار تعداد جنین‌های متوقف شده در مقایسه با گروه کنترل می‌شود و تیپ جنین‌های متوقف شده در حضور هاپیوتائورین اکثراً از نوع III با لیز و فراگمانتاسیون کم در مقایسه با گروه کنترل می‌باشد (جدول ۱).

نتایج حاصل از قرار دادن جنین‌ها در معرض غلظت‌های مختلف H_2O_2 سبب ایجاد توقف در جنین‌ها در مرحله یک سلولی و دو سلولی شد که این توقف در غلظت‌های پایین (۵ و ۱۰ میکرومول) اکثراً از نوع II و III با میزان لیز و فراگمانتاسیون کم بودند (تصویر ۱-E). در غلظت‌های بالای H_2O_2 (۲۵ و ۵۰ میکرومول) میزان بالای توقف جنینی مشاهده شد که اکثراً از نوع I و تعدادی نیز از نوع II با میزان لیز و فراگمانتاسیون بالا با رشد بسیار کم بودند، به‌طوری که در غلظت ۵۰ میکرومول اکثریت بالای جنین‌ها در مرحله یک سلولی متوقف شده و لیز و فراگمانته بودند (تصویر ۱-D) و تنها درصد خیلی کمی از آن‌ها تا مراحل اولیه تقسیم پیشرفت داشته و به مراحل بالاتر تقسیم و رشد جنینی پیش نرفته بودند.

مقایسه درصد جنین‌های دو سلولی ایجاد شده که نشان دهنده شروع شکافتگی است نشان داد در گروه‌هایی که تنش اکسیداتیو توسط افزودن غلظت‌های مختلف H_2O_2 ایجاد شده بود کاهش کاملاً معنی‌داری را با $P < 0.05$ در مقایسه با گروه کنترل نشان داد و این کاهش در گروه‌های با غلظت‌های بالای H_2O_2 کاملاً محسوس بود بطوری که در غلظت ۲۵ میکرومول تنها ۹/۶۸ درصد و در غلظت ۵۰ میکرومول تنها ۲/۵۳ درصد جنین‌ها تا مرحله دوسلولی و بالاتر پیش رفته بودند (نمودار ۱). مقایسه درصد بلاستوسیست‌ها با گروه کنترل نشان داد پس از قرار گرفتن جنین‌ها در معرض استرس اکسیداتیو درصد بلاستوسیست‌ها به میزان قابل توجه و کاملاً معنی‌داری کاهش پیدا کرده بود. به‌خصوص در غلظت‌های بالا که این کاهش بسیار بالا بود، به‌طوری که در غلظت ۵۰ میکرومول هیچ‌گونه بلاستوسیستی ایجاد نشده بود (نمودار ۲) و بلاستوسیست‌های ایجاد شده در غلظت‌های پایین‌تر H_2O_2 نیز از لحاظ مورفولوژی طبیعی نبودند (تصویر ۱-E).

نتایج حاصل از شمارش سلولی جنین‌ها نشان داد که میانگین تعداد سلول‌ها به ازای هر جنین در گروه‌هایی که جنین‌ها در معرض غلظت‌های مختلف H_2O_2 قرار گرفته بودند کاهش

جنین‌های با لیز، فراگمانته شدن و نکروتیک بودن کامل، تیپ II جنین‌های با لیز و فراگمانته شدن در تعدادی از بلاستومرها، تیپ III جنین‌های با تعداد کمی بلاستومرهای لیز و فراگمانته و ویزیکول سیتوپلاسمیک (۲۵).

کیفیت جنین‌ها و تعداد جنین‌های رشد کرده، درصد شکافتگی، میزان جنین‌های متوقف شده و درصد بلاستوسیست‌های ایجاد شده در طی ۱۲۰ ساعت در هر گروه مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین برای بررسی کیفیت رشد جنینی و میزان شکافتگی^۱ بلاستوسیست‌های بدست آمده در گروه‌های مختلف شمارش تعداد سلولی به ازای هر جنین با استفاده از روش air dry technique of Tarkowski صورت پذیرفت (۲۶).

آنالیز آماری داده‌ها توسط نرم افزار Minitab و روش 2Proportion با $P < 0.05$ مورد آنالیز قرار گرفت و نتایج به‌صورت درصد در نمودارها و جدول مربوطه آورده شد و مقایسه تمایز و تعداد سلول‌های موجود به ازای هر جنین بین گروه‌های مختلف توسط نرم افزار SPSS شماره ۱۶ و روش آماری One way ANOVA و تست تعقیبی Tukey با $P < 0.05$ مورد مقایسه قرار گرفته و میانگین و انحراف معیار آن‌ها بدست آمده و در نمودار مربوطه آورده شد.

یافته‌ها


نتایج حاصل از افزودن غلظت‌های مختلف هاپیوتائورین به محیط کشت در شرایط عادی و بدون تنش اکسیداتیو و مقایسه کیفیت رشد جنین‌ها با گروه کنترل نشان داد، افزودن هاپیوتائورین به محیط کشت باعث افزایش کیفیت رشد جنین‌ها و مورفولوژی آن‌ها شد (تصویر ۱-C). بررسی درصد جنین‌های دو سلولی ایجاد شده در مقایسه با گروه کنترل نشان داد در حضور هاپیوتائورین در محیط کشت درصد جنین‌های دوسلولی در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشت ولی این افزایش از نظر آماری معنی‌دار نبود (نمودار ۱). مقایسه درصد بلاستوسیست‌ها نشان داد، افزودن هاپیوتائورین به محیط کشت جنین‌ها باعث افزایش قابل توجه و کاملاً معنی‌دار درصد بلاستوسیست‌ها در مقایسه با گروه کنترل شده است و این افزایش در غلظت‌های ۱ و ۱۰ میکرومول بالا و از نظر آماری کاملاً معنی‌دار بود (نمودار ۲). همچنین مطالعه تعداد سلول‌ها به ازای هر جنین نشان داد افزودن هاپیوتائورین سبب افزایش کاملاً معنی‌دار تعداد سلول‌ها به ازای هر جنین در مقایسه با گروه کنترل می‌شود که این نشان دهنده تاثیر افزودن هاپیوتائورین به‌عنوان یک آنتی اکسیدانت به محیط کشت جنین‌ها

¹ Cleavage rate

باعث افزایش معنی‌دار تعداد سلول‌ها به ازای هر جنین در شرایط تنش اکسیداتیو شده است (نمودار ۳) و نشان می‌دهد که هایپوتائورین باعث بهبود کیفیت رشد و میزان شکافتگی در جنین‌های کشت داده شده در شرایط تنش اکسیداتیو می‌شود. بررسی جنین‌های متوقف شده نشان داد، هایپوتائورین باعث کاهش درصد جنین‌های متوقف شده گردید ولی این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود. مطالعه نوع جنین‌های متوقف شده براساس میزان لیز و فرگمانتاسیون آن‌ها نشان داد، میزان لیز و فرگمانتاسیون جنین‌های متوقف شده در شرایط تنش اکسیداتیو در حضور هایپوتائورین کاهش معنی‌داری را داشت (جدول ۱). بررسی اثر هایپوتائورین بر مورفولوژی بلاستوسیت‌ها نشان داد افزودن هایپوتائورین در شرایط تنش اکسیداتیو سبب بهبود مورفولوژی بلاستوسیت‌های ایجاد شده با میزان لیز و فرگمانتاسیون و واکتله شدن کم شد (تصویر ۱-F).

معنی‌داری را در مقایسه با گروه کنترل نشان می‌داد و این کاهش در غلظت‌های بالای H_2O_2 بیشتر بود (نمودار ۳).


مطالعه اثر هایپوتائورین در شرایط تنش اکسیداتیو با قرار دادن آن‌ها به مدت یک ساعت در معرض $10 \mu M$ میکرومول H_2O_2 در محیط کشت و در ادامه، کشت آن‌ها در محیط کشت حاوی غلظت‌های مختلف هایپوتائورین نشان داد که هایپوتائورین به‌خصوص در غلظت $10 \mu M$ میکرومول تا حدودی موجب مهار آسیب‌های ناشی از تنش اکسیداتیو گردیده و باعث افزایش درصد جنین‌های دوسلولی، در مقایسه با گروه تنش اکسیداتیو شده است ولی این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود (نمودار ۱). مقایسه درصد بلاستوسیت‌ها نشان داد هایپوتائورین باعث افزایش درصد بلاستوسیت‌ها در شرایط تنش اکسیداتیو می‌شود که این افزایش از نظر آماری معنی‌دار نبود (نمودار ۲). مقایسه تعداد سلول‌ها به ازای هر جنین نشان داد، هایپوتائورین در غلظت‌های 1 و $10 \mu M$ میکرومول




نمودار شماره (۱): مقایسه درصد جنین‌های دوسلولی در گروه‌های مختلف مورد مطالعه (درصد نسبت به تعداد کل جنین‌ها)، معنی‌دار بودن

گروه‌ها در مقایسه با گروه کنترل با a و در مقایسه با گروه تنش اکسیداتیو حاوی غلظت $10 \mu M$ H_2O_2 با b (که تفاوت معنی‌داری وجود

ندارد) نشان داده شده است ($P < 0.05$)



نمودار شماره (۲): مقایسه درصد پلاستوسیت‌ها در گروه‌های مختلف مورد مطالعه (درصد نسبت به تعداد کل جنین‌ها)، معنی‌دار بودن گروه‌ها در مقایسه با گروه کنترل با *a* و در مقایسه با گروه تنش اکسیداتیو حاوی غلظت ۱۰ میکرومول H_2O_2 با *b* (که تفاوت معنی‌داری وجود ندارد) نشان داده شده است ($P < 0.05$)




نمودار شماره (۳): مقایسه تعداد سلول‌ها به ازای هر جنین (میزان شکافتگی و رشد جنینی) در گروه‌های مختلف مورد مطالعه (میانگین $\pm$ انحراف معیار)، معنی‌دار بودن گروه‌ها در مقایسه با گروه کنترل با *a* و در مقایسه با گروه تنش اکسیداتیو حاوی غلظت ۱۰ میکرومول H_2O_2 با *b* نشان داده شده است ($P < 0.05$)

جدول شماره (۱): مقایسه گروه‌های مختلف از نظر درصد و نوع توقف جنینی ($P < 0.05$)، معنی‌دار بودن گروه‌ها در مقایسه با گروه کنترل با

a و در مقایسه با گروه تنش اکسیداتیو حاوی غلظت ۱۰ میکرومول H_2O_2 با b نشان داده شده است

تعداد کل جنین‌ها در هر گروه	تعداد کل جنین‌های متوقف شده	تیپ III	تیپ II	تیپ I	
۱۴۶	۴۷ (۳۲/۱۹)	۳۲ (۲۱/۹۱)	۱۱ (۷/۵۳)	۴ (۲/۷۴)	کنترل تعداد (/)
۱۷۱	۵۴ (۳۱/۵۸)	۳۹ (۲۲/۸۰)	۱۰ (۵/۸۵)	۵ (۲/۹۲)	هایپوتائورین ۰/۱ μM
۱۷۴	۳۵ (۲۰/۱۱) a	۳۳ (۱۸/۹۶) a	۲ (۱/۱۵) a	۱ (۰/۵۷) a	هایپوتائورین ۱ μM
۱۶۷	۳۴ (۲۰/۳۶) a	۲۹ (۱۷/۳) a	۲ (۱/۲۰) a	۳ (۱/۸۰)	هایپوتائورین ۱۰ μM
۱۴۳	۸۹ (۶۲/۲۳) a	۱۰ (۶/۹۹) a	۵۵ (۳۸/۴۶) a	۲۴ (۱۶/۷۸) a	H_2O_2 5 μM
۱۷۲	۱۴۶ (۸۴/۸۸) a	۹ (۵/۲۳) a	۳۷ (۲۱/۵۱) a	۱۰۰ (۵۸/۱۴) a	H_2O_2 10 μM
۱۵۵	۱۵۲ (۹۸/۰۶) a	۰ a	۱۴ (۹/۰۳) a	۱۳۸ (۸۹/۰۳) a	H_2O_2 25 μM
۱۵۸	۱۵۸ (۱۰۰) a	۰ a	۴ (۲/۵۳) a	۱۵۴ (۹۷/۴۷) a	H_2O_2 50 μM
۱۶۸	۱۴۱ (۸۲/۴۶)	۱۲ (۷/۱۴)	۳۹ (۲۳/۲۱)	۹۰ (۵۳/۵۷)	H_2O_2 10 μM + هایپوتائورین ۰/۱ μM
۱۷۲	۱۴۵ (۸۴/۳۰)	۱۲ (۶/۹۸)	۳۶ (۲۰/۹۳)	۹۷ (۵۶/۳۹)	H_2O_2 10 μM + هایپوتائورین ۱ μM
۱۶۸	۱۴۰ (۸۳/۳۳)	۱۵ (۸/۹۳)	۴۱ (۲۴/۴۰)	۸۴ (۵۰) b	H_2O_2 10 μM + هایپوتائورین ۱۰ μM

تمامی داده‌ها مثل گروه کنترل به صورت تعداد (درصد نسبت به کل جنین‌ها در هر گروه) آورده شده است



تصویر ۱- A- گروه کنترل تمایز درصدی از جنین‌ها به بلاستوسیست بعد از ۱۲۰ ساعت انکوباسیون و درصدی از جنین‌ها که در مراحل مختلف رشد متوقف شده اند، **B-** گروه حاوی هایپوتائورین که در آن درصد بالایی از جنین‌ها به بلاستوسیست اکسپند و هیچ شده تمایز یافته‌اند، **C-** بلاستوسیست در مرحله هیچ شدن را نشان می‌دهد، **D-** گروهی که به محیط کشت ۵۰ میکرومول H_2O_2 اضافه شده بود و نشان می‌دهد که تمامی جنین‌ها در مراحل اولیه رشد متوقف شده و درجات بالایی از لیز و فراگمانتاسیون را نشان می‌دهند، **E-** گروهی که به محیط کشت ۱۰ میکرومول H_2O_2 اضافه شده بود و نشان می‌دهد که تعداد کمی از جنین‌ها به مرحله بلاستوسیست رسیده‌اند و بلاستوسیست‌های ایجاد شده از لحاظ مورفولوژی مناسب نمی‌باشند و سایر جنین‌ها در مراحل اولیه رشد متوقف شده و دچار لیز و فرا گمانتاسیون شده هستند، **F-** گروه هایپوتائورین در شرایط تنش اکسیداتیو که نشان می‌دهد هایپوتائورین تا حدودی توانسته آسیب‌های ناشی از استرس اکسیداتیو را مهار نماید که تعدادی از جنین‌ها به مرحله بلاستوسیست تمایز یافته‌اند و سایر جنین‌ها به این مرحله نرسیده‌اند ولی با این وجود میزان لیز و فراگمانتاسیون که در جنین‌ها دیده می‌شود به مراتب کمتر است.

بحث و نتیجه‌گیری

استرس اکسیداتیو به معنای افزایش در سطح رادیکال‌های آزاد اکسیژن بدن است که از میزان دفاع آنتی‌اکسیدانتی بدن تجاوز می‌کند (۲۷) و در مواردی از مشکلات مختلف تولیدمثلی نظیر آندومتريوز، فولیکولوز و بلوغ غیر طبیعی تخمک، مایع هیدروسالپینگیسی^۱، نکروزواسپرما^۲ و آستنواسپرما^۳ دخالت دارد (۲،۲۸).

نتایج تحقیق نصر اصفهانی و همکاران بیان‌گر این نکته کلیدی بود که جنین‌های موش کشت داده شده در مقطع خاص ایست تکوین حاوی بیشترین میزان ROS درون سلولی هستند. در واقع برای اولین بار ارتباط بین ایست تکوینی و مقادیر ROS مشخص گردید و نشان داده شد که ترکیب مواد موجود در محیط کشت از جمله گلوکز، EDTA، گلوکاتین و نیز اکسیژن محیط بر میزان ROS درون سلولی و شدت بروز ایست تکاملی موثر خواهد بود و همچنین نشان دادند که افزایش ROS مطابق با ایست تکوین جنین‌های موش دو سلولی در آزمایشگاه می‌باشد (۲۹). افزایش در میزان رادیکال‌های آزاد اکسیژن بر روی غشاء سلول، DNA و میتوکندری‌ها موثر است و به نظر می‌رسد این تاثیر به‌عنوان واسطه‌ای باشد تا آشبار آپوپتوزی را از تنظیم خارج کند (۳). شواهد فراوان نشان می‌دهد که سطوح بالای H_2O_2 بسته به غلظت آن سبب آپوپتوز و نکروز در گونه‌های مختلف سلول‌های سوماتیک می‌شود (۳۰-۳۳).

نتایج این مطالعه نشان داد که توان رشد جنین در مراحل اولیه پیش از لانه‌گزینی پس از قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض رادیکال‌های آزاد اکسیژن به شدت کاهش یافته است. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر با نتایج حاصل از سایر مطالعات صورت گرفته در این زمینه مطابقت دارد. همچنین مشخص شد که دزهای بالای رادیکال‌های آزاد اکسیژن در محیط کشت تاثیرات بیشتری را سبب می‌شوند و از یک حد آستانه غلظت به بالا تاثیر کامل بوده و مانع رشد جنین و یا سبب حالت‌های غیر طبیعی شدید می‌شود که نشانگر وابسته به غلظت بودن رشد جنین در ارتباط با رادیکال‌های آزاد می‌باشد. به‌طوری که در این مطالعه مشاهده شد که قرار دادن جنین‌ها به مدت یک ساعت قبل از کشت در محیط حاوی غلظت‌های مختلف H_2O_2 باعث ایجاد آسیب در جنین‌های پیش از لانه‌گزینی گردیده است به‌طوری که جنین‌هایی که در معرض غلظت ۵۰ میکرومول H_2O_2 قرار گرفتند اکثریت جنین‌ها فاقد قدرت شکافتگی و رشد بودند و تنها درصد

خیلی کمی از آن‌ها تا مراحل اولیه رشد جنینی پیش رفته و دچار لیز و فراگمانتاسیون شده بودند (تصویر ۱-D). ولی در غلظت‌های پایین H_2O_2 (۵ و ۱۰ میکرومول) تاثیرات کم‌تر بوده و باعث کاهش شکافتگی و رشد جنین‌ها و کاهش کیفیت جنین‌ها و مورفولوژی آن‌ها شد، هر چند که درصدی از این جنین‌ها تا مرحله بلاستوسیست پیش رفتند ولی در مقایسه با گروه کنترل این درصد خیلی پایین بوده و بلاستوسیست‌های حاصله از نظر مورفولوژی نیز حالت غیرطبیعی را نشان دادند (تصویر ۱-E).

برخی از دانشمندان گزارش نموده‌اند که توقف جنین‌ها در فاز G2/M هم‌زمان با افزایش در سطح رادیکال‌های آزاد اکسیژن می‌باشد (۳۴،۳۵). بنابراین می‌توان میزان شکافتگی و کیفیت جنین‌های تولید شده در شرایط داخل آزمایشگاهی را با افزودن پاک‌کننده‌های رادیکال‌های آزاد اکسیژن به محیط کشت جنین افزایش داد. از سوی دیگر با توجه به اثرات مہاری ROS بر تکوین اولیه جنینی تاکنون آنتی‌اکسیدان‌های گوناگونی در محیط کشت بررسی شده است.

اثرات تخریبی رادیکال‌های آزاد توسط سیستم آنتی‌اکسیدان درون سلولی مانند گلوکاتین، اسید آسکوربیک و آنزیم‌هایی مانند سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز و گلوکاتین پراکسیداز (GPX) کنترل و یا مہار می‌گردد (۲). با این وجود به نظر می‌رسد که در شرایط کشت آزمایشگاهی جنین‌های پستانداران، میزان تولید این رادیکال‌های آزاد بیش از ظرفیت آنتی‌اکسیدانی این جنین‌ها می‌باشد. لذا به منظور غلبه بر این عدم تعادل اکسیدانی انواع آنتی‌اکسیدان‌های با منشا خارجی پیش بینی و ارائه گردیده‌اند (۱۷). از سوی دیگر به نظر می‌رسد که توان دفاع آنتی‌اکسیدانی جنین‌های آزمایشگاهی در مقاطع مختلف تکوین تا مرحله بلاستوسیست متفاوت باشد. گروهی از محققان معتقدند که ظرفیت اصلی آنتی‌اکسیدانی جنین‌ها در مراحل اولیه تقسیمات زیگوت وابسته به ذخیره mRNA مادری به ارث رسیده درون اووسیت می‌باشد و تدریجاً در مرحله فعالیت ژنوم جنینی است که ژنوم جنین قادر به فعالیت متقابل در مقابل اکسیدان‌های تولید شده درون سلول و یا محیط کشت می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد که نیاز خاص جنین به آنتی‌اکسیدان‌های خارجی در مقاطع قبل و بعد از ZGA متفاوت باشد (۳۶).

مکانیسم‌های دفاعی متعددی در جنین و محیط پیرامونی احاطه کننده آن وجود دارد. در بدن^۴ به نظر می‌رسد اووسیت‌ها و جنین‌ها در برابر استرس اکسیداتیو به‌واسطه پاک‌کننده‌های اکسیژنی موجود در مایعات فولیکولی و اویدوکت محافظت

^۱ Hydrosalpingeal fluid

^۲ necrozoospermia

^۳ Astenospermia

^۴ in vivo

می‌شوند. مقادیر بالای تائورین و هایپوتائورین در گامت‌ها و در محیط اطراف جنین تمام گونه‌های مورد آزمایش مشاهده شده است (۳۷). این ترکیبات به‌وسیله سلول‌های اپی‌تلیال اویدوکتی سنتز می‌شود (۳۸). هایپوتائورین رادیکال‌های هیدروکسیل را خنثی می‌نماید و از پراکسیداسیون لیپیدی اسپرم جلوگیری می‌کند (۱۸).

بنابراین به نظر می‌رسد که افزودن آنتی‌اکسیدانت‌ها به محیط کشت جنین در مراحل مختلف رشد بخصوص در قبل و بعد از بیان ژنوم جنینی (ZGA) که بیشترین میزان تولید ROS را در جنین همراه دارد برای افزایش کیفیت جنین و بهبود رشد جنین در شرایط داخل آزمایشگاهی مناسب باشد که مطالعه اخیر تا حدودی نشان داد که افزودن آنتی‌اکسیدانت هایپوتائورین در شرایط طبیعی بدون شرایط تنش اکسیداتیو باعث بهبود و افزایش کیفیت جنین، افزایش درصد جنین‌های دو سلولی که بیانگر شروع شکافتگی در جنین است، افزایش درصد بلاستوسیست و افزایش تعداد سلول‌ها در جنین‌ها بعد از کشت در محیط کشت‌های حاوی

غلظت‌های مختلف هایپوتائورین می‌شود که نشان می‌دهد افزودن هایپوتائورین به‌عنوان یک آنتی‌اکسیدانت به محیط کشت جنین می‌تواند بسیار مفید باشد. همچنین نتایج حاصل از افزودن هایپوتائورین به محیط در شرایط تنش اکسیداتیو در جنین‌هایی که قبل از کشت به مدت یک ساعت در داخل محیط کشت حاوی ۱۰ میکرومول H_2O_2 کشت داده شده بودند نشان داد که تا حدودی هایپوتائورین می‌تواند بر روی کیفیت و روند رشد جنین‌ها در شرایط تنش اکسیداتیو موثر باشد ولی این تأثیرات در شرایط عادی و بدون تنش اکسیداتیو مشخص‌تر و معنی‌دارتر بوده است. بنابراین افزودن هایپوتائورین جهت بهبود روند رشد جنین و جلوگیری از اثرات مخرب رادیکال‌های آزاد اکسیژن به محیط کشت‌های جنینی توصیه می‌شود.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از تمام کسانی که در انجام این تحقیق ما را یاری نموده‌اند بویژه جناب آقای آراز رابری و خانم‌ها سحر غفاری، سمیرا ابراهیم‌زاده و کیانا کارگر کمال تشکر و قدردانی را داریم.

References

1. Abdoon ASS, Kandil OM, Otoi T, Suzuki T. Influence of oocyte quality, culture media and gonadotropins on cleavage rate and development of in vitro fertilized buffalo embryos. *Anim Reprod Sci* 2001; 65: 215-23.
2. Guérin P, El Mouatassim S, Ménézo Y. Oxidative stress and protection against reactive oxygen species in the pre-implantation embryo and its surroundings. *Hum Reprod Update* 2001; 7:175-89.
3. Chaudiere J, Ferrari-Illiou R. Intracellular antioxidant from chemical to biochemical mechanism. *Food Chem* 1999; 37:949-62.
4. Bedaiwy MA, Falcone T, Sharma KR. Prediction of endometriosis with serum and peritoneal fluid markers: a prospective controlled trial. *Hum Reprod* 2002; 17: 426-31.
5. Yoneda A, Suzuki K, Mori T, Veda J, Watanabe T. Effect of delipidation and oxygen concentration on in vitro development of porcine embryos. *J Reprod Dev* 2004; 50: 287-95.
6. Carbone MC, Tatone C, Delle SD, Marci R, Caserta D, Colonna R, et al. Antioxidant enzymatic defences in human follicular characterization and age-dependent changes. *Mol Hum Reprod* 2003; 9: 639-43.
7. Aitken RJ, Harkiss D, Buckingham DW. Analysis of lipid peroxidation mechanisms in human spermatozoa. *Mol Reprod Dev* 1993; 35: 302-15.
8. Attaran M, Pasqualotto E, Falcone T, Goldberg JM, Miller KF, Agarwal A, et al. The effect of follicular fluid reactive oxygen species on the outcome of in vitro fertilization. *Int J Fertil Womens Med* 2000; 45(5): 314-20.
9. Bedaiwy MA, Falcone T, Maher SM, Abdel AN, Sharma KR, Worley SE, et al. Differential growth of human embryos in vitro: role of reactive oxygen species. *Fertil Steril* 2004; 82:593-600.

10. Goto Y, Noda Y, Narimoto K. Oxidative stress on mouse embryo development in vitro. *Free Radic Biol Med* 1992; 13(1): 47-53.
11. Goyanes VJ, Ron-Crozo A, Costas E. Morphometric categorization of the human oocyte and early conceptus. *Hum Reprod* 1990; 5: 69-75.
12. Catt JW, Henman M. Toxic effect of oxygen on human embryo development. *Hum Reprod* 2000; 15: 199-206.
13. Wang X, Falcone T, Attaran M, Goldberg JM, Agarwal A, Sharma RK. Vitamin C and vitamin E supplementation reduce oxidative stress-induced embryo toxicity and improve the blastocyst development rate. *Fertil Steril* 2002; 78: 1272-7.
14. Cassano E, Tostoa L, Balestrieria M, Zicarellib L, Abrescia P. Antioxidant defense in the follicular fluid of water buffalo. *Cell Physiol Biochem* 1999; 9:106-16.
15. Cetica Pintos LN, Dlvit GC, Beconi MT. Antioxidant enzyme activity and oxidative stress in bovine oocyte in vitro maturation. *IUBMB Life* 2001; 51:57-64.
16. Agarwal A, Gupta S, Sharma RK. Role of oxidative stress in female reproduction. *Reprod Biol Endocrin* 2005; 3:28.
17. Ali AA, Biledaeu JF, Sirard MA. Antioxidant requirements for bovine oocytes various during in vitro maturation fertilization and development. *Theriogenology* 2003; 59:939-49.
18. Alvarez JG, Storey BT. Taurine, hypotaurine, epinephrine and albumin inhibit lipid peroxidation in rabbit spermatozoa and protect against loss of motility. *Biol Reprod* 1983; 29: 548-55.
19. Aruoma OI, Halliwell B, Hoey BM. The antioxidant action of taurine, hypotaurine and their metabolic precursors. *Biochem J* 1988; 256: 251-5.
20. Ogasawara M, Nakamura T, Koyama I. Reactivity of taurine with aldehydes and its physiological role. *Chem Pharm Bull* 1993; 41: 2172-5.
21. Van Winkle LJ, Dickinson HR. Differences in amino acid content of preimplantation mouse embryos that develop in vitro vs. in vivo. In vitro effects of 5 amino acids that are abundant in oviductal secretions. *Biol Reprod* 1995;52:96-104.
22. Barnett DK, Bavistar BD. Hypotaurine requirement for in vitro development of golden hamster one cell embryos into morulae and blastocysts, and production of term offspring from in vitro-fertilized ova. *Biol Reprod* 1992; 47: 297-304.
23. Reed ML, Illera MJ, Petters RW. In vitro culture of pig embryos. *Theriogenology* 1992; 37: 95-109.
24. Devreker F, Hardy K. Effects of glutamine and Taurine on preimplantation development and cleavage of mouse embryo in vitro. *Biol Reprod* 1997; 57:921-8.
25. Hedrich H. The laboratory mouse: handbook of experimental animals. 2nd Ed. New York: Academic Press; 2006.
26. Tarkowski AK. An air drying method for chromosome preparations from mouse eggs. *Cytogenetics (Basel)* 1966; 5: 394-400.
27. Agarwal A, Saleh RA, Bedaiwy MA. Role of reactive oxygen species in the pathophysiology of human reproduction. *Fertil Steril* 2003; 79: 829-43.
28. Goto Y, Noda Y, Mori T. Increased generation of reactive oxygen species in embryos cultured in vitro. *Free Radic Biol Med* 1993; 15: 69-75.
29. Nasr-Esfahani MH, Johnson MH. The origin of reactive oxygen species in mouse embryos cultured in vitro. *Development* 1991; 113: 551-60.
30. Forrest VJ, Kang YH, McClain DE, Robinson DH, Ramakrishnan N. Oxidative stress-induced apoptosis prevented by trolox. *Free Radical Biol Med* 1994; 16: 675-84.
31. Tada-Oikawa S, Oikawa S, Kawanishi M, Yamada M, Kawanishi S. Generation of hydrogen peroxide precedes loss of mitochondrial

- membrane potential during DNA alkylation induced apoptosis. *FEBS Lett* 1999; 442: 65-9.
32. Halliwell B, Aruoma OI. DNA damage by oxygen-derived species. Its mechanism and measurement in mammalian system. *FEBS Lett* 1991; 281: 9-19.
33. Wiese AG, Pacifici RE, Davies KJA. Transient adaptation to oxidative stress in mammalian cells. *Arch Biochem Biophys* 1995; 318: 231-40.
34. Kuribayashi Y, Gagnon C. Effect of catalase and thioredoxin addition to sperm incubation medium before in vitro fertilization on sperm capacity to support embryo development. *Fertil Steril* 1996; 66(6): 1012-17.
35. Nasr-Esfahani MH, Johnson MH. The origin of the reactive oxygen species in mouse culture in vitro. *Development* 1991; 113: 551-60.
36. Meirelles FV, Caetano AR, Watanabe YF, Ripamonte P, Carambula SF, Merighe GK, et al. Genome activation and developmental block in bovine embryos. *Anim Reprod Sci* 2004; 82: 13-20.
37. Guérin P, Ménéz Y. Hypotaurine and taurine in gamete and embryo environments: de novo synthesis via cysteine sulfinic acid pathway in oviduct cells. *Zygote* 1995; 3: 333-43.
38. Guérin, P, Gillaud, J, menez Y, 1995. Hypotaurine in spermatozoa and genital secretions and its production by oviduct epithelial cells in vitro. *Hum. Reprod.* 10, 866-872.