

بررسی شیوع آنتی‌بادی‌های سرمی IgM و IgG اختصاصی مایکوپلازما پنومونیه در بیماران بدون علامت در کودکان پیش‌دبستانی

ابراهیم صادقی^{۱*}، امیر نسیم‌فر^۲، محمد کرمی‌یار^۳، شبنم بالانجی^۴

تاریخ دریافت ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ تاریخ پذیرش ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

چکیده

پیش‌زمینه و هدف: مایکوپلازما پنومونیه یکی از دلایل عمده ذات‌الریه کسب‌شده از جامعه (community acquired pneumonia) با دامنه شیوع ۴۰ درصد در کودکان هست. هدف از این مطالعه، بررسی سطح سرمی آنتی‌بادی IgM و IgG اختصاصی جهت شناسایی مایکوپلازما پنومونیه در نمونه‌های آزمایشگاهی کودکان پیش‌دبستانی بدون علائم تنفسی در شهرستان ارومیه بود.

مواد و روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر از نوع مقطعی تحلیلی بوده و بر روی ۲۶۰ نفر از کودکان پیش‌دبستانی که بدون داشتن علائم تنفسی به درمانگاه کودکان بیمارستان شهید مطهری ارومیه در دی‌ماه سال ۱۳۹۷ مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. تشخیص IgM و IgG آنتی‌بادی علیه مایکوپلازما پنومونیه روی نمونه‌ها با استفاده از کیت آزمایشگاهی مخصوص با روش ELISA انجام شد. تیتراژ آنتی‌بادی IgM و IgG بیش از ۱۲ واحد در میلی‌لیتر به‌عنوان نتیجه مثبت، تیتراژ کمتر از ۸ واحد در میلی‌لیتر به‌عنوان نتیجه منفی و بین ۸ تا ۱۲ واحد در میلی‌لیتر به‌عنوان نتیجه بینابینی تلقی شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS 21 استفاده شد.

یافته‌ها: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، ۲۵٫۸ درصد از کودکان حداقل یک دوره عفونت با ارگانسیم مایکوپلازما پنومونیه را تجربه کرده بودند. ارتباط معنی‌داری بین مثبت شدن تیتراژ آنتی‌بادی IgG و IgM با حضور در مهدکودک وجود داشت (در هر دو $P=0.001$). ارتباط معناداری بین مثبت بودن سطح سرمی IgG و IgM و جنس کودکان (به ترتیب $P=0.14$ ، $P=0.60$)، سن کودکان (به ترتیب $P=0.54$ ، $P=0.58$) و گروه سنی بیماران (به ترتیب $P=0.49$ ، $P=0.19$) وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: بین تیتراژ آنتی‌بادی IgG و IgM مثبت و حضور در مهدکودک رابطه معنی‌داری وجود داشت، اما بین مثبت بودن آنتی‌بادی IgG و IgM با جنس و گروه سنی رابطه معنی‌داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها: مایکوپلازما پنومونیه، کودکان پیش‌دبستانی، آنتی‌بادی IgM، آنتی‌بادی IgG، ایران

مجله مطالعات علوم پزشکی، دوره سی و دوم، شماره یازدهم، ص ۸۴۶-۸۴۰، بهمن ۱۴۰۰

آدرس مکاتبه: ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مرکز آموزشی - درمانی شهید مطهری، تلفن: ۰۴۴۳۲۲۳۷۰۷۷

Email: sadeghi.e@umsu.ac.ir

مقدمه

استرپتوکوک پنومونیه، هموفیلوس آنفلوانزا، استافیلوکوکوس اورئوس و مایکوپلازما پنومونیه با پنومونی در دوران کودکی همراه است (۱، ۲، ۳). مایکوپلازما پنومونیه (MP) مهم‌ترین عامل بیماری ذات‌الریه پنومونی مایکوپلازما است که تقریباً ۲۰ تا ۳۰ درصد انواع پنومونی در سراسر جهان را تشکیل می‌دهد. مطالعات آینده‌نگر نشان می‌دهد که رایج‌ترین علت باکتریایی در عفونت‌های دستگاه تنفسی

پنومونی یکی از دلایل اصلی بستری شدن نوزادان و کودکان در سراسر جهان به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه است و انواع ویروس‌های تنفسی مانند آنفلوانزا A (آنفلوانزا A)، ویروس سینسیتیال تنفسی (RSV)، آدنو ویروس (ADV) و متاپنوموویروس انسانی (HMPV) و باکتری‌هایی مانند

^۱ دانشیار بیماری‌های عفونی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)

^۲ دانشیار بیماری‌های عفونی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

^۳ دانشیار بیماری‌های عفونی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

^۴ دستیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

باهداف بررسی سطح سرمی آنتی‌بادی IgM و IgG اختصاصی جهت شناسایی میزان آلودگی و سابقه تماس با مایکوپلازما پنومونیه در نمونه‌های آزمایشگاهی کودکان پیش‌دبستانی بدون علامت انجام شد.

مواد و روش‌ها

مطالعه‌ی حاضر از نوع مقطعی تحلیلی بوده و بر روی کودکان پیش‌دبستانی که بدون داشتن علائم تنفسی به درمانگاه کودکان بیمارستان شهید مطهری ارومیه در دی‌ماه سال ۱۳۹۷ مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. تعداد ۲۶۰ نفر از این کودکان پیش‌دبستانی انتخاب‌شده و وارد مطالعه شدند. بر اساس مطالعات گذشته جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول متناظر برای برآورد به یک نسبت با اطمینان ۹۵ درصد و خطای ۰/۰۵ و با استفاده از نتایج مطالعه امین و همکاران (۱۷)، حجم نمونه برابر با ۲۶۰ نفر برآورد شد شده بود که با توجه به معیارهای ورود وارد مطالعه شدند. کلیه بیماران در سن ۶۰-۸۳ ماهگی بدون علائم تنفسی وارد مطالعه شدند. معیارهای خروج از مطالعه وجود هرگونه بیماری مزمن از جمله آسم، دیابت نارسایی کلیه و بیماری مادرزادی قلبی و بیماری‌های خود ایمنی، سابقه ترانسفوزیون خون در ۶ ماه تا یک سال اخیر و عفونت اخیر دستگاه تنفسی و دریافت‌کننده‌های درمان سرکوب‌کننده سیستم ایمنی بود. نمونه‌های خون به میزان یک میلی‌لیتر از هر کودک گرفته شد و سرم آن جدا شد و در دمای منفی ۷۰ درجه سانتی‌گراد برای آزمایش آنتی‌بادی بعدی ذخیره شد. تشخیص IgG و IgM آنتی‌بادی علیه مایکوپلازما پنومونیه بر روی نمونه‌ها با استفاده از کیت‌های آزمایشگاهی مرتبط با روش (ELISA) بر اساس دستورالعمل‌های شرکت تولید کننده انجام شد. تیتراژ آنتی‌بادی IgM و IgG بیش از ۱۲ Unite/mL مثبت، تیتراژ کمتر از ۸ Unite / mL به‌عنوان نتیجه منفی و نتیجه بینابینی با تیتراژ (بین ۸ تا ۱۲ Unite / mL) تلقی شد و تمامی اطلاعات موردنیاز مطالعه اعم از، جنس و سن و سطح سرمی آنتی‌بادی‌های IgG و IgM در چک‌لیست‌های محقق ساخته ثبت شد. برای آنالیز داده‌های جمع‌آوری‌شده در مطالعه‌ی حاضر، از نرم‌افزار آماری SPSS version 21 استفاده شد.

یافته‌ها

در این مطالعه در مجموع ۲۶۰ نفر از کودکان پیش‌دبستانی بدون علامت تنفسی که طی سال ۱۳۹۷ به درمانگاه کودکان بیمارستان شهید مطهری ارومیه مراجعه نمودند با داشتن شرایط ورود به مطالعه بررسی شدند. از بین این افراد، ۱۲۲ نفر (۴۶٫۹ درصد) مذکر و ۱۳۸ نفر (۵۳٫۱ درصد) مؤنث بودند. میانگین سن

فوقانی، مایکوپلازما پنومونیه می‌باشد (۴، ۵). عفونت MP نه تنها باعث بیماری تنفسی فوقانی و تحتانی می‌شود بلکه سیستم‌های دیگر بدن انسان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد که شدت آن از خفیف تا تهدیدکننده زندگی متغیر است (۶، ۷). طیف گسترده‌ای از تظاهرات خارج تنفسی مانند عوارض هماتولوژیک، گوارشی، کلیوی، عضلانی - اسکلتی، قلبی - عروقی، ایمونولوژیک، درماتولوژیک و نورولوژیک در ارتباط با این باکتری گزارش شده است (۸).

عفونت‌های مایکوپلازما پنومونیه هرچند سال یک‌بار (هر ۳ تا ۷ سال) در یک الگوی اپیدمی ظاهر می‌شوند، اما ممکن است کاملاً بدون علامت باقی بمانند (۹). علاوه بر این، عفونت MP می‌تواند منجر به شروع حملات آسم شده، که با علائم بدتری همراه است و حتی ایجاد مشکل در مدیریت درمانی آسم می‌شود (۱۰). به‌طور گسترده‌ای قبول شده است که MP در کودکان زیر ۵ سال و بزرگسالان ناشایع می‌باشد ولی در کودکان بالاتر از ۵ سال شایع‌تر است و پنومونی ناشی از آن علائم غیراختصاصی دارد که با تست‌های اختصاصی تشخیص داده می‌شود (۱۱). باین‌حال، نتیجه‌گیری نهایی نشان از آن دارد که طیف گسترده‌ای از سن، به‌ویژه در کودکان کمتر از ۵ نیز شیوع میکروارگانیزم زیاد شده است (۱۲).

در حال حاضر کشت، روش‌های تشخیص سرولوژیک و فن‌های تکثیر اسیدنوکلئیک سه روش قابل‌دسترس برای تشخیص روتین عفونت‌های مایکوپلازما پنومونیه محسوب می‌شوند (۱۳). اصولاً روش‌های مبتنی بر کشت و روش‌های PCR وقت‌گیر و گران‌قیمت هستند؛ بنابراین، تشخیص ارگانیزم معمولاً با آزمایش‌های سرولوژی انجام می‌شود (۱۴). آنتی‌بادی ضد مایکوپلازما از نوع IgG می‌تواند موارد مزمن که ماه‌ها یا سال‌ها قبل دچار عفونت شده‌اند را تشخیص دهد. تست IgM، IgG، توأم می‌تواند عفونت چند هفته قبل را تشخیص دهد. طرز تشخیص نیز با افزایش ۴ برابری تیتراژ آنتی‌بادی می‌باشد (۱۵). عفونت اولیه با MP با افزایش تیتراژ آنتی‌بادی IgM در هفته‌های اول نشان داده می‌شود که می‌تواند برای ۶ تا ۱۲ ماه از ابتدای عفونت ادامه یابد. حدود دو هفته پس از عفونت اولیه، آنتی‌بادی IgG ظاهر می‌شود (۱۵). افزایش ۴ برابری تیتراژ IgG از هفته دوم تا سوم می‌تواند تشخیصی باشد. تشخیص آنتی‌بادی IgM اختصاصی MP می‌تواند نشانگر عفونت اخیر، به‌ویژه در کودکان باشد (۱۵).

مایکوپلازما پنومونیه به‌عنوان عامل مهم عفونی عفونت‌های حاد تنفسی در جهان محسوب می‌شود. باین‌حال، در مورد شیوع مایکوپلازما پنومونیه در ایران اطلاعات کمی وجود دارد (۱۶). با توجه به در دسترس نبودن سایر روش‌های تشخیصی از قبیل PCR برای تشخیص دقیق عفونت مایکوپلازما و نیز لزوم تفسیر نتایج تست سرولوژی بر اساس شرایط اپیدمیولوژیک، مطالعه‌ی حاضر

۲۵،۸ درصد) مثبت و سطح سرمی آنتی‌بادی IgM در ۸۰ نفر (۳۰،۸ درصد) بینابینی، ۱۶۷ نفر (۶۴،۲ درصد) منفی و ۱۳ نفر (۵ درصد) مثبت به دست آمد.

طبق روش انجام مطالعه حاضر، در این مطالعه تیتراژ آنتی‌بادی IgM و IgG بیش از ۱۲ U/mL مثبت، تیتراژ کمتر از ۸ U/mL به‌عنوان نتیجه منفی و نتیجه بینابینی (بین ۸ تا ۱۲ U/mL) نیز به‌عنوان نتیجه منفی تلقی شد و نتایج به‌دست‌آمده جهت بررسی ارتباط سطح سرمی IgM و IgG نشان داد. سطح سرمی آنتی‌بادی IgG در ۱۹۳ نفر (۷۴،۲ درصد) منفی و در ۶۷ نفر (۲۵،۸ درصد) مثبت گزارش شد. همچنین سطح سرمی آنتی‌بادی IgM نیز در ۲۴۷ نفر (۹۵ درصد) منفی و در ۱۳ نفر (۵ درصد) مثبت بود.

از ۱۹۳ بیمار با سطح IgG منفی، ۸۵ نفر (۴۴ درصد) مهدکودک می‌رفتند و ۱۰۸ نفر (۵۶ درصد) مهدکودک نمی‌رفتند. از ۶۷ کودک با سطح سرمی IgG مثبت نیز، ۶۷ کودک (۱۰۰ درصد) مهدکودک می‌رفتند. طبق آزمون آماری Chi-square ارتباط معناداری بین سطح سرمی IgG و حضور در مهدکودک وجود داشت (P=۰/۰۰۱) (جدول ۱).

کودکان ۶/۶۸ ± ۷۱/۳۵ ماه (حداقل ۶۰ ماه و حداکثر ۸۳ ماه) بود. از ۲۶۰ کودک پیش‌دبستانی ۱۵۲ نفر (۵۸،۵ درصد) مهدکودک می‌رفتند و ۱۰۸ نفر (۴۱،۵ درصد) مهدکودک نمی‌رفتند. میانگین سطح آنتی‌بادی IgG ۰،۳۹ ± ۸،۷۶ (حداقل ۰،۲۰، حداکثر ۳۴،۵۰) و میانگین سطح آنتی‌بادی IgM نیز ۰،۲۶ ± ۵،۴۴ (حداقل ۰،۱۰، حداکثر ۲۳ و میانه ۳،۶۵) محاسبه شد. میانگین سطح آنتی‌بادی IgG در کودکانی که در مهد حضور داشتند ۶،۸۱ ± ۱۱،۷۶ و در کودکانی که مهد نمی‌رفتند ۳،۱۱ ± ۵ به دست آمد که طبق آزمون آماری t-TEST تفاوت معناداری بین سطح سرمی آنتی‌بادی IgG و حضور در مهدکودک وجود داشت (P=0.001). همچنین میانگین سطح آنتی‌بادی IgM در کودکانی که در مهد حضور داشتند ۴،۶۰ ± ۷،۰۷ و در کودکانی که مهد نمی‌رفتند ۲،۱۳ ± ۳،۱۴ به دست آمد که طبق آزمون آماری t-Test تفاوت معناداری بین سطح سرمی آنتی‌بادی IgM و حضور در مهدکودک وجود داشت (P=0.001). سطح سرمی آنتی‌بادی IgG در ۵۲ نفر (۲۰ درصد) بینابینی، ۱۴۱ نفر (۵۴،۲ درصد) منفی و ۶۷ نفر

جدول (۱): ارتباط سطح سرمی IgG مثبت در کودکان پیش‌دبستانی بر اساس حضور در مهدکودک

سطح سرمی IgG	حضور در مهدکودک		جمع کل
	بلی	خیر	
منفی	۸۵ (۴۴٪)	۱۰۸ (۵۶٪)	۱۹۳ (۱۰۰٪)
مثبت	۶۷ (۱۰۰٪)	۰ (۰٪)	۶۷ (۱۰۰٪)
جمع کل	۱۵۲ (۵۸،۵٪)	۱۰۸ (۴۱،۵٪)	۲۶۰ (۱۰۰٪)

از ۲۴۷ کودک پیش‌دبستانی با سطح سرمی IgM منفی ۱۳۹ نفر (۵۶،۳ درصد) مهدکودک می‌رفتند و ۱۰۸ نفر (۴۳،۷ درصد) مهد نمی‌رفتند. از ۱۳ کودک با سطح سرمی IgM مثبت، هر ۱۳ نفر نیز به مهد می‌رفتند. طبق آزمون آماری Chi-square ارتباط معناداری بین سطح سرمی IgM و حضور در مهدکودک وجود داشت (P=۰،۰۰۲). از ۱۹۳ بیمار با سطح سرمی IgG منفی، ۸۵ نفر (۴۴ درصد) مذکر و ۱۰۸ نفر (۵۶ درصد) مؤنث بودند. از ۶۷ کودک با سطح سرمی IgM مثبت نیز، ۷ نفر (۵۳،۸ درصد) مذکر و ۶ نفر (۴۶،۲ درصد) مؤنث بودند. طبق آزمون آماری Chi-square ارتباط معناداری بین سطح سرمی IgM مثبت و جنس کودکان وجود ندارد (P=۰،۶۰) (جدول ۲).

جدول (۲): ارتباط سطح سرمی IgM مثبت در کودکان پیش‌دبستانی بر اساس جنس

سطح سرمی IgM	جنس		جمع کل
	مذکر	مؤنث	
منفی	۱۱۵ (۴۶،۶٪)	۱۳۲ (۵۳،۴٪)	۲۴۷ (۱۰۰٪)
مثبت	۷ (۵۳،۸٪)	۶ (۴۶،۲٪)	۱۳ (۱۰۰٪)
جمع کل	۱۵۲ (۵۸،۵٪)	۱۰۸ (۴۱،۵٪)	۲۶۰ (۱۰۰٪)

کشت، ELISA و PCR شناسایی شد و شیوع مایکوپلازما پنومونیه با این آزمایش‌ها به ترتیب ۶،۱۵، ۵،۳ و ۲،۰۱ درصد بود؛ به‌طور کلی، ۵۳ درصد بیماران سطح IgG بالاتری داشتند و تنها ۵،۳ درصد نتایج مثبت IgM داشتند که نشان‌دهنده فعال بودن عفونت مایکوپلازما پنومونیه بود (۲۰). با توجه به اینکه نمونه‌های مطالعه حاضر در فصل زمستان اخذ شده است لذا سطح IgM بیشتر از IgG می‌باشد. عفونت مایکوپلازما پنومونیه می‌تواند در کودکان تمام سنین اتفاق بیافتد. اکثر عفونت‌های مایکوپلازما پنومونیه ساب کلینیکال هستند و یافته‌های کلینیکی در کودکان زیر ۵ سال شایع‌تر است اما میزان شیوع عفونت در کودکان ۵ تا ۹ سال دو برابر کودکان جوان‌تر و ۴ برابر بیشتر از بالغین است (۲۱). در یک مطالعه‌ی مشابه انجام‌شده در یونان، ۲۲۵ کودک که به علت عفونت‌های دستگاه تنفسی بستری شده بودند، با توجه به حضور آنتی‌بادی‌های IgG و IgM با روش ELISA مورد بررسی قرار گرفتند؛ عفونت مایکوپلازما پنومونیه در ۲۵ بیمار (۱۱،۱ درصد) به‌عنوان دومین میکروارگانیزم شایع تشخیص داده شد و همچنین در افراد با علائم دستگاه تنفسی، احتمال عفونت مایکوپلازما پنومونیه در گروه سنی ۸ تا ۱۴ سال به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از گروه سنی ۰ تا ۳ سال بود (۲۲). در یک مطالعه آینده‌نگر دیگر با ۹۳ کودک بستری‌شده در هندوستان، آنتی‌بادی IgM علیه *M. Pneumonia* در ۲۳،۹۶ درصد از کودکان علامت‌دار با استفاده از روش ELISA تشخیص داده شد و همچنین بالاترین میزان عفونت در گروه‌های ۲ تا ۵ و ۵ تا ۱۰ ساله یافت شد (۲۲).

نتایج به‌دست‌آمده از مطالعه‌ی حاضر نشان داد که ارتباط معناداری بین سطح سرمی IgG و IgM مثبت و جنس بیماران وجود ندارد. بر اساس نتایج مطالعه‌ی حاضر، بین سن کودکان و سطح سرمی IgG و IgM ارتباط معناداری به‌دست نیامد. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط معناداری بین سطح سرمی IgG و IgM مثبت با گروه سنی بیماران وجود ندارد. در مطالعه‌ی مشابهی که توسط دشتی و همکاران در ایران و باهدف بررسی سطح سرمی آنتی‌بادی IgG و IgM مایکوپلازما پنومونیه در ۲۹۱ کودک انجام شد، گزارش کردند که در مجموع ۷۳ نمونه (۲۵،۱ درصد) از نمونه‌های سرمی نتایج مثبت IgG اختصاصی *M. pneumoniae* دارند و علاوه بر این، تمام نمونه‌های سرم آزمایش‌شده برای IgM اختصاصی *M. pneumoniae* منفی بودند. آن‌ها گزارش کردند که ارتباط معناداری بین سطح سرمی IgG و IgM و جنس بیماران وجود ندارد (۲۳). نتایج فوق با مطالعه حاضر هم‌راستا می‌باشد. مشابه با مطالعه حاضر در مطالعه دیگری که Touati و همکاران در تونس انجام دادند، گزارش کردند که بین جنسیت و مثبت بودن

ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط معناداری بین سن کودکان و سطح سرمی IgG وجود ندارد ($r = ۰/۰۳$ و $P = ۰/۵۴$). همچنین با توجه به ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معناداری بین سن و سطح سرمی IgM گزارش نشد ($r = -۰/۰۳$ و $P = ۰/۵۸$). از ۱۹۳ بیمار با سطح IgG منفی، ۱۱۰ نفر (۵۷ درصد) در گروه سنی ۶۰-۷۲ ماه، ۸۳ نفر (۴۳ درصد) در گروه سنی ۷۳-۸۳ ماه بودند. از ۶۷ کودک با سطح سرمی IgG مثبت، ۳۵ نفر (۵۲،۲ درصد) در گروه سنی ۶۰-۷۲ ماه، و ۳۲ نفر (۴۷،۸ درصد) در گروه سنی ۷۳-۸۳ ماه بودند. طبق آزمون آماری Chi-square ارتباط معناداری بین سطح سرمی IgG مثبت با گروه سنی بیماران وجود نداشت ($P = ۰/۴۹$). همچنین از ۲۴۷ کودک پیش‌دبستانی با سطح سرمی IgM منفی، ۱۴۰ نفر (۵۶،۷ درصد) در گروه سنی ۶۰-۷۲ ماه و ۱۰۷ نفر (۴۳،۳ درصد) در گروه سنی ۷۲-۸۳ ماه بودند. از ۱۳ کودک با سطح سرمی IgM مثبت نیز، ۵ نفر (۳۸،۸ درصد) در گروه سنی ۶۰-۷۲ ماه و ۸ نفر (۶۱،۵ درصد) در گروه سنی ۷۲-۸۳ ماه بودند. طبق آزمون آماری Chi-square ارتباط معناداری بین سطح سرمی IgM مثبت و گروه سنی کودکان وجود نداشت ($P = ۰/۱۹$).

بحث

مایکوپلازما پنومونیه یکی از دلایل عمده ذات‌الریه پنومونیه (community acquired pneumonia) با دامنه شیوع ۱۵-۲۰ درصد در بزرگسالان و ۴۰ درصد در کودکان می‌باشد (۱۸، ۱۹). با توجه به کمبود داده‌های مربوط به فراوانی مایکوپلازما پنومونیه در ایران (۱۹) و همچنین با توجه به در دسترس نبودن سایر روش‌های تشخیصی از قبیل PCR برای تشخیص دقیق عفونت مایکوپلازما و نیز لزوم تفسیر نتایج تست سرولوژی بر اساس شرایط اپیدمیولوژیک، مطالعه‌ی حاضر باهدف بررسی سطح سرمی آنتی‌بادی IgG و IgM اختصاصی جهت شناسایی مایکوپلازما پنومونیه در نمونه‌های آزمایشگاهی کودکان پیش‌دبستانی بدون علامت انجام شد. نتایج به‌دست‌آمده از مطالعه‌ی حاضر نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین مثبت شدن تیتراژ آنتی‌بادی IgG و IgM با حضور در مهدکودک وجود دارد. نتایج فوق حاکی از این می‌باشد که کودکانی که در مهدکودک حضور می‌یابند در معرض خطر ابتلا به مایکوپلازما پنومونیه می‌باشند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ۲۵،۸ درصد از کودکان حداقل یک دوره عفونت با ارگانیزم مایکوپلازما پنومونیه را در طول عمر خود تجربه کرده‌اند. در مطالعه‌ی مشابه انجام‌شده بر روی بیماران مبتلا به عفونت دستگاه تنفسی در تبریز، حضور عفونت مایکوپلازما پنومونیه با روش‌های

فرزندان بدون علامت بودند که انتظار می‌رود میزان کمتری از عفونت اخیر با *M. pneumoniae* داشته باشند.

نتیجه‌گیری

به‌طور کلی نتایج به‌دست‌آمده از مطالعه‌ی حاضر نشان داد که تمام بیمارانی که سطح سرمی آنتی‌بادی IgG و IgM مثبت گزارش شده بود؛ به مهدکودک می‌رفتند و ارتباط معنی‌داری بین مثبت شدن تیتراژ آنتی‌بادی IgG و IgM با حضور در مهدکودک وجود داشت ولی ارتباط معنی‌داری بین مثبت شدن تیتراژ آنتی‌بادی IgG و IgM با جنس و گروه سنی کودکان گزارش نشد.

IgG ارتباط معنی‌داری وجود ندارد (۲۴). یکی از عوامل مهم در الگوی سرولوژیک *M. pneumoniae* می‌تواند سن افراد مورد آزمایش باشد. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که عفونت *M. pneumoniae* به‌طور عمده در کودکان پیش‌دبستانی و بزرگسالان جوان را تحت تأثیر قرار می‌دهد (۲۵). در مطالعه دیگری که در یک فصل غیر اپیدمی که با انجام سرولوژی در جمعیت سالم فنلاند انجام شد، میزان شیوع *M. pneumoniae* در کودکان ۲ تا ۴ ساله افزایش را نشان می‌داد (۲۱). در نهایت، مطالعه ما محدودیت‌هایی داشت. اول اینکه با استفاده از یک نمونه سرم در مطالعه حاضر برای تشخیص IgM مایکوپلازما پنومونیه، ممکن است برخی از عفونت‌های واقعی اخیر miss شوند و دوم اینکه، افراد مورد مطالعه

References

- Jain S, Williams DJ, Arnold SR, Ampofu K, Bramley AM, Reed C, et al. Community-acquired pneumonia requiring hospitalization among U.S. children [J]. *N Engl J Med* 2015;372(9):835–45.
- Zhao M-c, Li G-x, Zhang D, Zhou H-y, Wang H, Yang S, et al. Clinical evaluation of a new single-tube multiplex reverse transcription PCR assay for simultaneous detection of 11 respiratory viruses, *Mycoplasma pneumoniae* and *Chlamydia* in hospitalized children with acute respiratory infections. *Diagn Microbiol Infect Dis* 2017;88:115–9.
- Zhao MC, Wang L, Qiu FZ, Zhao L, Guo WW, Yang S, et al. Impact and clinical profiles of *Mycoplasma pneumoniae* co-detection in childhood community-acquired pneumonia. *BMC Infect Dis* 2019 Oct 11;19(1):835.
- Waites KB, Xiao L, Liu Y, Balish MF, Atkinson TP. *Mycoplasma pneumoniae* from the respiratory tract and beyond. *Clin Microbiol Rev* 2017;30(3):747–809.
- Cai ZH, Dai YY, Huang LY, Zhang WS, Guo XG. Diagnosis of *mycoplasma pneumoniae* by loop-mediated isothermal amplification: systematic review and meta-analysis. *BMC Infect Dis* 2019 Feb 19;19(1):173.
- Wood PR, Kampschmidt JC, Dube PH, Marianna PC, Paola C, Norma SK, et al. *Mycoplasma pneumoniae* and health outcomes in children with asthma. *Ann Allergy Asthma Immunol* 2017;119(2):146–152.e2.
- Zhang Y, Mei S, Zhou Y, Huang M, Dong G, Chen Z. Cytokines as the good predictors of refractory *mycoplasma pneumoniae* pneumonia in school-aged children. *Sci Rep* 2016;6:37037.
- Kashyap S, Sarkar M. *Mycoplasma pneumoniae*: Clinical features and management. *Lung India*. 2010; 27(2): 75–85.
- She RC, Thurber A, Hymas WC, Stevenson J, Langer J, Litwin CM, et al. Limited utility of culture for *Mycoplasma pneumoniae* and *Chlamydia pneumoniae* for diagnosis of respiratory tract infections. *J Clin Microbiol* 2010;48(9):3380-2.
- Hong S-J. The role of *Mycoplasma pneumoniae* infection in asthma. *Allergy Asthma Immunol Res* 2012;4(2):59-61.
- Waites KB, Talkington DF. *Mycoplasma pneumoniae* and its role as a human pathogen. *Clin Microbiol Rev* 2004;17(4):697-728.
- Vervloet LA, Marguet C, Camargos PAM. Infection by *Mycoplasma pneumoniae* and its importance as an etiological agent in childhood community-acquired pneumonias. *Braz J Infect Dis* 2007;11(5):507-14.
- McMillan JA. *Mycoplasma pneumoniae* infection in pediatrics. *Seminars in Pediatric Infectious Diseases*; 1998: Elsevier.

14. Zhang L, Zong Z-Y, Liu Y-B, Ye H, Lv X-J. PCR versus serology for diagnosing *Mycoplasma pneumoniae* infection: a systematic review & meta-analysis. *Indian J Med Res* 2011;134:270-80.
15. Narita M. Evaluation of ELISA kits for detection of *Mycoplasma pneumoniae*-specific IgG, IgA, IgM antibodies on the diagnosis of *Mycoplasma pneumoniae* infection in children. *Kansenshogaku Zasshi* 2005;79(7):457-63.
16. Ranjbar R, Halaji M. Epidemiology of *Mycoplasma pneumoniae* prevalence in Iranian patients: a systematic review and meta-analysis. *J Med Microbiol* 2019 Nov;68(11):1614-21.
17. Amin M, Soltan Abadi M, Navidifar T, Torabizadeh M, Alavi S M. Detection of *Mycoplasma pneumoniae* Among Children with Pneumonia Using Bacterial Culture, Polymerase Chain Reaction, and the Enzyme-linked Immunosorbent Assay Techniques in Ahvaz, Iran. *Jundishapur J Microbiol* 2018; 11(2):e55554.
18. Restrepo MI, Reyes LF, Anzueto A. Complication of community-acquired pneumonia (including cardiac complications). *Semin Respir Crit Care Med* 2016;37:897-904.
19. Arfaatabar M, Aminharati F, Azimi G, Ashtari A, Pourbakhsh SA, Masoorian E, et al. High frequency of *Mycoplasma pneumoniae* among patients with atypical pneumonia in Tehran, Iran. *Germes* 2018;8(3):126-33.
20. Ghotaslou R, Sharifi S, Akhi MT, Soroush MH. Epidemiology, clinical features, and laboratory detection of *Mycoplasma pneumoniae* infection in East Azerbaijan, Iran. *Turkish Journal of Medical Sciences* 2013;43(4):521-4.
21. Tuuminen T, Varjo S, Ingman H, Weber T, Oksi J, Viljanen M. Prevalence of *Chlamydia pneumoniae* and *Mycoplasma pneumoniae* Immunoglobulin G and A Antibodies in a Healthy Finnish Population as Analyzed by Quantitative Enzyme Immunoassays. *Clin Diagn Lab Immunol* 2000;7(5):734-8.
22. Shenoy VD, Upadhyaya SA, Rao SP, Shobha K. *Mycoplasma pneumoniae* infection in children with acute respiratory infection. *J Trop Pediatr* 2005;51(4):232-5.
23. Dashti AS, Hashemi SM, Halaji M, Arjmand R, Shirvani F. Seroprevalence of *Mycoplasma pneumoniae* Specific IgM and IgG Antibodies in Asymptomatic Preschool Aged Children of Tehran, Iran, 2010. *Arch Pediat Infect Dis* 2017;5(4):e62412.
24. Touati A, Pereyre S, Bouziri A, Achour W, Khaldi A, Jaballah NB, et al. Prevalence of *Mycoplasma pneumoniae*-associated respiratory tract infections in hospitalized children: results of a 4-year prospective study in Tunis. *Diagn Microbiol Infect Dis* 2010;68(2):103-9.
25. Chen Z, Ji W, Wang Y, Yan Y, Zhu H, Shao X, et al. Epidemiology and associations with climatic conditions of *Mycoplasma pneumoniae* and *Chlamydia pneumoniae* infections among Chinese children hospitalized with acute respiratory infections. *Ital J Pediatr* 2013;39(1):34.

EVALUATION OF SEROPREVALENCE OF MYCOPLASMA PNEUMONIAE SPECIFIC IGM AND IGG ANTIBODIES IN ASYMPTOMATIC PRESCHOOL-AGED CHILDREN

*Ebrahim Sadeghi^{*1}, Amir Nasimfar², Mohammad Karamiyar³, shabnam balaneji⁴*

Received: 25 March, 2022; Accepted: 08 May, 2022

Abstract

Background & Aims: Mycoplasma pneumoniae is one of the main causes of community acquired pneumonia in children with an incidence of nearly 40%.

The aim of this study was to evaluate the serum levels of IgM and IgG antibodies to identify Mycoplasma pneumoniae in laboratory samples of in asymptomatic preschool aged children in Urmia, Iran.

Materials & Methods: The present cross-sectional study was performed on 260 preschool children who referred to the pediatric clinic of Shahid Motahari Hospital in Urmia in January 2018 without any respiratory symptoms. Detection of IgM and IgG antibodies against Mycoplasma pneumoniae was performed on the samples using specific ELISA kit, according to the manufacturer's instructions. IgM and IgG antibody titers more than 12 U / mL considered as positive, less than 8 U / mL as negative, and between 8 and 12 U / mL as intermediate result (. SPSS 21 software was used for data analysis.

Results: According to the results of this study, 25.8 percent of children had at least one episode of mycoplasma pneumoniae infection. Statistically significant relationship was detected between the positivity of IgG and IgM and attending kindergarten in the studied children (P=0.001). There was no significant relationship between positivity of IgG and IgM with sex (P values = 0.14 and 0.60, respectively), age (P values = 0.58 and 0.54, respectively), and age group (P values = 0.19 and 0.49, respectively) of the children.

Conclusion: There was a significant relationship between positive IgG and IgM antibody titers and presence in kindergarten, but there was no significant relationship between IgG and IgM antibody positivity with sex and age group.

Keywords: Mycoplasma pneumoniae, Preschool Children, IgG, IgM, Iran

Address: Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

Tel: +984432237077

Email: sadeghi.e@umsu.ac.ir

SOURCE: STUD MED SCI 2022: 32(11): 846 ISSN: 2717-008X

Copyright © 2022 Studies in Medical Sciences

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

¹ Associate Professor of Pediatric Infectious Diseases, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
(Corresponding Author)

² Associate Professor of Pediatric Infectious Diseases, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

³ Associate Professor of Pediatric Infectious Diseases, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

⁴ Resident of Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran