

بررسی خصوصیات پاتولوژیک تومورهای دستگاه گوارش در نمونه‌های آندوسکوپی بیمارستان امام خمینی ارومیه، مطالعه توصیفی- مقطعی

فریبا عباسی^۱، فرزانه جوانمرد^{*}^۲، مهسا اسماعیل فام^۳

تاریخ دریافت ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ تاریخ پذیرش ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

چکیده

پیش‌زمینه و هدف: سرطان شایع‌ترین علت مرگ‌ومیر در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته محسوب شده و عامل تقریباً ۱۳درصد از مرگ‌های جهان می‌باشد. سرطان‌های دستگاه گوارش در ایران شیوع بالایی دارند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تومورهای دستگاه گوارش در بیمارستان امام خمینی ارومیه انجام شد.

روش کار: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، تمامی گزارش‌های پاتولوژی نمونه‌های آندوسکوپی بیماران بیمارستان امام خمینی با تشخیص تومور که در طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ مراجعه کرده بودند مورد ارزیابی قرار گرفت که در نتیجه ۷۴۱ بیمار وارد مطالعه شدند.

یافته‌ها: از ۷۴۱ تومور گزارش شده، ۷۰۵ مورد (۹۵/۱۴درصد) بدخیم و ۳۶ مورد (۴/۸۵درصد) خوش‌خیم بود. ۶۱/۸درصد از تومورهای بدخیم مربوط به مردان و ۱/۴درصد مربوط به زنان بود. میانگین سنی مبتلایان به تومورهای بدخیم $2\pm1/3$ سال و مبتلایان به تومورهای خوش‌خیم $47/7\pm1/9$ سال بود. فراوان‌ترین تومور بدخیم، آدنوکارسینوم با ۴۸۱ مورد (۶۲/۲۲درصد) و سپس اسکواموس‌سل کارسینوم با ۱۳۷ مورد (۴۳/۴۳درصد) بودند و شایع‌ترین تومور خوش‌خیم نیز لبیوم بود (۷/۵درصد از موارد). بیشترین ابتلاء به تومورهای بدخیم در گروه سنی ۷۱ سال و بالاتر با ۲۳۲ مورد (۳۲/۹درصد) می‌باشد. از نظر موقعیت آناتومیک تومورهای بدخیم در مری، اکثرآ (۶۳/۷درصد) محل دقیق درگیری مشخص نشده بود. در معده کارديا با ۲۷ مورد، در روده باریک دئودونوم با ۶۶/۶درصد و در کولورکتو، رکتوم با ۴۱/۹درصد بیشترین مکان درگیری را به خود اختصاص داده بود.

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه ما نشان می‌دهد که فراوان‌ترین تومور بدخیم دستگاه گوارش آدنوکارسینوم و فراوان‌ترین تومور خوش‌خیم لبیوما می‌باشد. تومورهای بدخیم بیشتر در مردان و تومورهای خوش‌خیم بیشتر در زنان دیده شد. فراوانی تومورهای بدخیم در سنین ۷۱ سال و بالاتر؛ نشان‌گر اهمیت غربال‌گری در سنین پایین‌تر برای پیش‌گیری از ابتلاء در سنین بالاتر می‌باشد.

کلید واژه‌ها: سرطان، دستگاه گوارش، موقعیت آناتومیک، آدنوکارسینوم

مجله مطالعات علوم پزشکی، دوره سی و دوم، شماره هفتم، ص ۵۴۷-۵۳۷، مهر ۱۴۰۰

آدرس مکاتبه: ارومیه، مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) ارومیه، تلفن: ۰۴۴۳۲۲۳۷۰۸۰

Email: javanmard.f@umsu.ac.ir

مقدمه

بیشترین علت مرگ ناشی از سرطان در سراسر جهان به ترتیب سرطان ریه، معده، کولورکتال، کبد و پستان است. همچنین شایع‌ترین سرطان در مردان به ترتیب؛ ریه، معده، کبد، کولورکتال، مری و پروستات و در زنان به ترتیب پستان، ریه، معده، کولورکتال و سروپیکس می‌باشد (۱).

بدخیمی‌های دستگاه گوارش را می‌توان به دو دسته فوقانی و تحتانی تقسیم کرد. سرطان‌های دستگاه گوارش فوکانی شامل

سرطان شایع‌ترین علت مرگ‌ومیر در کشورهای درحال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته محسوب شده و عامل تقریباً ۱۳درصد از مرگ‌های جهان می‌باشد (۱). در واقع شایع‌ترین علت مرگ در زنان ۴۰-۷۹ ساله و در مردان ۶۰-۷۹ ساله، سرطان است (۲). سرطان سالانه حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد جهان را مبتلا می‌کند که منجر به فوت ۶ میلیون نفر از این افراد می‌گردد (۳).

^۱ دانشیار پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

^۲ استادیار پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)

^۳ دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

بیمارستان امام خمینی ارومیه بر مبنای نوع هیستولوژیک، توزیع سنی، جنسی و موقعیت آناتومیک پرداخته شده است.

مواد و روش کار

در این مطالعه توصیفی- مقطعي و تحلیلی، پس از تأیید توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، کلیه گزارش‌های پاتولوژی نمونه‌های بیوپسی دستگاه گوارش با تشخیص تumor دستگاه گوارش در طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ از بایگانی بخش پاتولوژی بیمارستان امام خمینی ارومیه استخراج شده و تشخیص‌های پاتولوژیک بر حسب سن، جنس، خوش‌خیم یا بدخیم بودن تumor و موقعیت آناتومیک آن در دستگاه گوارش مورد بررسی قرار گرفت. معیار ورود به مطالعه؛ شامل تمام گزارش‌هایی بود که اطلاعات لازم بهطور کامل در آنها وارد شده بود و معیار خروج از مطالعه، گزارش‌های پاتولوژی بود که هر یک از اطلاعات مورد نظر به هر دلیلی در آنها ذکر نشده بود. در انجام این طرح، مشکل و محدودیتی وجود نداشت.

داده‌ها وارد نرم افزار spss20 شده و از آزمون آماری fisher و chi-square جهت آنالیز آماری استفاده شد. سطح معنی‌داری کمتر از ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

این مطالعه در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با کد اخلاق IR.UMSU.REC.1395.551 مورد تصویب قرار گرفت.

یافته‌ها

در این مطالعه ۷۴۱ بیمار مبتلا به tumor دستگاه گوارش شرکت داشتند. از این تعداد ۷۰۵ مورد (۹۵/۱۴درصد) tumor بدخیم، ۳۶ مورد (۴/۸۵درصد) tumor خوش‌خیم بود. میانگین سنی مبتلایان به تumorهای بدخیم $60/2 \pm 13/35$ سال می‌باشد که با افزایش سن میزان فراوانی tumorهای بدخیم افزایش می‌یابد (جدول ۱). از ۷۰۵ مورد tumor بدخیم دستگاه گوارش، ۶۱/۸درصد مربوط به مردان و ۳۸/۱درصد مربوط به زنان می‌باشد (جدول ۲).

بدخیمی‌های مری، معده، روده کوچک و سلطان‌های دستگاه گوارش تحتانی شامل بدخیمی‌های کولون، رکتوم و مقعد است (۴). در ایران سلطان سومین علت مرگ‌ومیر افراد به شمار آمده و عامل ۴۴درصد از کل مرگ‌ها می‌باشد، سلطان‌های دستگاه گوارش نیز مسئول نیمی از مرگ‌های ناشی از سلطان هستند (۵) که نزدیک به نیمی (۴۳درصد) از آن‌ها به علت سلطان معده می‌باشد (۱). سلطان معده چهارمین سلطان شایع در سراسر جهان و دومین سلطان منجر به مرگ به شمار می‌رود (۶). در ایران نیز سلطان معده شایع‌ترین سلطان دستگاه گوارش به شمار می‌رود و شیوع آن در شمال غرب ایران و منطقه آذربایجان بالا می‌باشد، به علاوه شیوع عفونت با هلیکوبکتر پیلوئی که به عنوان عامل دخیل در ایجاد آدنوکارسینوم معده شناخته شده است، در جمعیت بالغین این منطقه بیش از ۸۵درصد می‌باشد (۷).

شیوع سلطان مری نیز در سال‌های اخیر، بهویژه در میان مردان افزایش یافته است و ششمین علت مرگ ناشی از سلطان می‌باشد (۸). در ایران کانسر مری هفتمین کانسر شایع به شمار می‌رود و بخش شمالی ایران بیش‌ترین میزان شیوع را دارد (۹).

بر طبق مطالعه مروری سیستماتیک انجام شده در سال ۲۰۱۸ کانسر کولورکتال چهارمین کانسر شایع و سومین کانسر منجر به مرگ در جهان می‌باشد (۱۰). گرچه شیوع کانسر کولورکتال در ایران در مقایسه با کشورهای غربی پایین است ولی به نظر می‌رسد شیوع آن در دهه گذشته افزایش چشمگیری داشته است (۱۱).

متاسفانه بیماران مبتلا به سلطان‌های دستگاه گوارش اکثراً در مراحل پیشرفته به پزشک مراجعه می‌کنند که درمان مؤثری برایشان نمی‌توان انجام داد. بنابراین تشخیص به موقع و سریع در کارآمد بودن درمان مؤثر است (۶).

با توجه به شیوع بالای سلطان‌های دستگاه گوارش در ایران در مطالعات مختلف (۳ و ۶) بهویژه در شمال غرب کشور (۱۲)، در این مطالعه به بررسی میزان شیوع tumorهای دستگاه گوارش در

جدول (۱): توزیع فراوانی مطلق و نسبی tumorهای بدخیم دستگاه گوارش در گروههای سنی مختلف

نوع tumor	≤ 30	31-40	41 - 50	51- 60	61 - 70	۷۱≥	جمع کل	میانگین سنی
Mean age								
آدنوکارسینوم	۹	۲۰	۴۰	۱۰۳	۱۶۳	۱۴۶	۴۸۱	۱۴/۳ ± ۶۹/۲
	(٪ ۱/۱/۸۷)	(٪ ۰/۱/۱۵)	(٪ ۰/۸/۳)	(٪ ۰/۲۱/۴)	(٪ ۰/۳۳/۸)	(٪ ۰/۳۰/۳)	(٪ ۱۰۰)	

$13/6 \pm 66/3$	۱۳۷	۶۰	۲۹	۳۳	۱۱	۴	۰	اسکواموس سل کارسینوما
(% 100)	(% ۱۰۰)	(% ۴۳/۷)	(% ۲۱/۱)	(% ۲۴/۰۸)	(% ۸/۰۲)	(% ۲/۹)	(% ۰)	
$7/38 \pm 41/5$	۱۰	۲	۱	۳	۱	۱	۲	لنفوم
(% 100)	(% ۲۰)	(% ۱۰)	(% ۳۰)	(% ۱۰)	(% ۱۰)	(% ۱۰)	(% ۲۰)	
$11/79 \pm 57/5$	۱۰	۵	۲	۱	۱	۱	۰	نورواندکرین تومور
(% 100)	(% ۵۰)	(% ۲۰)	(% ۱۰)	(% ۱۰)	(% ۱۰)	(% ۱۰)	(% ۰)	
$14/2 \pm 68/3$	۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	آدنواسکواموس سل کارسینوما
(% 100)	(% ۵۰)	(% ۵۰)	(% ۰)	(% ۰)	(% ۰)	(% ۰)	(% ۰)	
$13/81 \pm 67/3$	۳	۱	۲	۰	۰	۰	۰	لیومیوسارکوم
(% 100)	(% ۳۳/۴)	(% ۶۶/۶)	(% ۰)	(% ۰)	(% ۰)	(% ۰)	(% ۰)	
$10/37 \pm 58/3$	۳	۰	۲	۰	۱	۰	۰	GIST
(% 100)	(% ۰)	(% ۶۶/۶)	(% ۰)	(% ۳۳/۴)	(% ۰)	(% ۰)	(% ۰)	
$8/91 \pm 50/1$	۵۴	۱۵	۱۵	۱۱	۱۰	۲	۱	کارسینوما
(% 100)	(٪ ۲۷/۷)	(٪ ۲۷/۷)	(٪ ۲۰/۳)	(٪ ۱۸/۵)	(٪ ۳/۷)	(٪ ۱/۸۵)	(٪ ۱/۷)	
$13/1 \pm 53/8$	۵	۲	۱	۲	۰	۰	۰	متاستاز
(% 100)	(% ۴۰)	(% ۲۰)	(% ۴۰)	(% ۰)	(% ۰)	(% ۰)	(% ۰)	
$13/35 \pm 60/۲$	۷۰۵	۲۲۲	۲۱۶	۱۵۳	۶۴	۲۸	۱۲	جمع کل
(% 100)	(% ۳۲/۹)	(% ۳۰/۶)	(% ۲۱/۷)	(% ۹/۰۷)	(٪ ۳/۹)	(٪ ۱/۷)	(٪ ۱/۷)	

جدول (۲): فراوانی مطلق و نسبی تومورهای بدخیم دستگاه گوارش بر حسب جنس

جمع کل	جنس	نوع تومور
۴۸۱	مؤنث	ذکر
(٪ ۱۰۰)	(٪ ۳۳/۸)	(٪ ۶۶/۱)
۱۳۷	۷۰	۶۷
(٪ ۱۰۰)	(٪ ۵۱)	(٪ ۴۸/۹)
۱۰	۴	۶
(٪ ۱۰۰)	(٪ ۴۰)	(٪ ۶۰)
۱۰	۳	۷
(٪ ۱۰۰)	(٪ ۳۰)	(٪ ۷۰)
۲	۲	۰
(٪ ۱۰۰)	(٪ ۱۰۰)	(٪ ۰)
۳	۱	۲
(٪ ۱۰۰)	(٪ ۳۳/۳)	(٪ ۶۶/۶)
۳	۳	۰
(٪ ۱۰۰)	(٪ ۱۰۰)	(٪ ۰)
۵۴	۱۹	۳۵
(٪ ۱۰۰)	(٪ ۳۵/۱)	(٪ ۶۴/۸)

۵	۴	۱	متاستاز
(٪۱۰۰)	(٪۸۰)	(٪۲۰)	
۷۰۵	۲۶۹	۴۳۶	جمع کل
(٪۱۰۰)	(٪۳۸/۱)	(٪۶۱/۸)	

از ۳۶ مورد تومور خوش‌خیم دستگاه گوارش ۴۱/۶۶ درصد مربوط به مردان و ۳۲/۵۸ درصد مربوط به زنان بود. میانگین سنی مبتلایان ۴۷/۷±۱۰/۹۴ می‌باشد (جداول ۳ و ۴).

جدول (۳): توزیع فراوانی مطلق و نسبی تومورهای خوش‌خیم دستگاه گوارش بر حسب جنس

نوع تومور	مذکر	مؤنث	جمع کل
لیپوم	۶	۱۳	۱۹
(٪۳۱/۵۷)	(٪۶۸/۴)	(٪۱۰۰)	
پاپیلوم	۷	۵	۱۲
(٪۵۸/۴)	(٪۴۱/۶)	(٪۱۰۰)	
همانژیوم	۱	۲	۳
(٪۳۳/۳)	(٪۶۶/۶)	(٪۱۰۰)	
لیومیوم	۱	۱	۲
(٪۵۰)	(٪۵۰)	(٪۱۰۰)	
جمع کل	۱۵	۲۱	۳۶
(٪۴۱/۶)	(٪۵۸/۳)	(٪۱۰۰)	

جدول (۴): توزیع فراوانی تومورهای خوش‌خیم دستگاه گوارش بر حسب گروههای سنی

میانگین سنی	جمع کل		سن						نوع تومور
			۷۱≥ سال	۶۱-۷۰ سال	۵۱-۶۰ سال	۴۱-۵۰ سال	۳۱-۴۰ سال	۳۰≤ سال	
۶۰/۷±۱۲/۴۶	۱۹	۷	۳	۴	۳	۲	۰	۰	لیپوم
(٪۱۰۰)	(٪۳۶/۸)	(٪۱۵/۷)	(٪۲۱/۰۵)	(٪۱۵/۷)	(٪۱۰/۵)	(٪۱۰/۵)	(٪۰)	(٪۰)	
۴۰/۴۱±۹/۲۶	۱۲	۰	۲	۲	۱	۲	۵	۵	پاپیلوم
(٪۱۰۰)	(٪۰)	(٪۱۶/۶)	(٪۱۶/۶)	(٪۸/۳)	(٪۱۶/۶)	(٪۴۱/۶)			
۴۰±۷/۱۲	۳	۰	۰	۰	۲	۰	۱	۱	همانژیوم
(٪۱۰۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۶۶/۶)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۳۳/۳)		
۵۰±۸/۹	۲	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	لیومیوم
(٪۱۰۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۵۰)	(٪۵۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	
۴۷/۷±۱۰/۹۴	۳۶	۷	۵	۷	۷	۴	۶	جمع کل	
(٪۱۰۰)	(٪۱۹/۴)	(٪۱۳/۸)	(٪۱۹/۴)		(٪۱۱/۱)	(٪۱۶/۶)			
				(٪۱۹/۴)		(٪۱۹/۴)			

مریوط به معدہ، ۲۷ (۳/۳درصد) مورد مریوط به روده باریک و
مورد (۶/۲۶درصد) مریوط به کولورکتوم بود (جدول ۵).

از نظر موقعیت آناتومیک از ۷۴۱ مورد تومور دستگاه گوارش، ۱۷۶ مورد (۲۱درصد) مربوط به مری، ۳۹۳ مورد (۴۸/۳درصد)

جدول (۵): توزیع فراوانی تومورهای دستگاه گوارش بر حسب موقعیت آناتومیک

موقعیت آناتومیک	نوع تومور	جمع کل
مری	تومور خوش خیم	تومور بد خیم
معدہ	۷	۳۴۵
(٪۱۰۰)	(٪۱/۱۵)	(٪۹۸/۸۴)
روده باریک	۷	۱۵
(٪۱۰۰)	(٪۱/۹۸)	(٪۹۸/۰۱)
کولورکتوم	۲۰	۱۷۴
(٪۱۰۰)	(٪۱۰/۳۰)	(٪۸۹/۶۹)
جمع کل	۳۶	۷۰۵
(٪۱۰۰)	(٪۴/۸۵)	(٪۹۵/۱۴)

مورد (۳/۳۳درصد) پاپیلوم، ۳ مورد (۳/۸درصد) همانژیوم و ۲ مورد (۵/۵درصد) لیومیوم گزارش شده بود.

در مورد مری از ۱۷۱ مورد تومور بدخیم، ۳۶ مورد (۲۱/۰۵درصد) در قسمت دیستال مری، ۱۵ مورد (۷/۸درصد) در پروگزیمال مری، ۱۱ مورد (۴/۶درصد) در قسمت میانی و در ۱۰۹ مورد (۷/۶۳درصد) محل دقیق درگیری مشخص نشده بود. از مجموع ۱۷۱ مورد تومور مری، ۱۲۵ مورد (۷۳/۷درصد) اسکواموس سل کارسینوم و ۳۷ مورد (۱۶/۲درصد) آذن کارسینوم بود (جدول ۶).

در بررسی فراوانی تومورهای بدخیم از نظر نوع هیستوپاتولوژیک، ۴۸۱ مورد (۲۲/۶۴درصد) آدنوکارسینوم، ۱۳۷ مورد (۴۳/۹درصد) مورد اسکواموس سل کارسینوم، ۱۰ مورد (۴/۱درصد) لغفوم، ۱۰ مورد (۴/۱درصد) نوراندوز کرین تومور، ۲ مورد (۰/۰درصد) آدنواسکواموس سل کارسینوم، ۳ مورد (۴۲/۰درصد) لیومیوسارکوم، ۳ مورد (۴۲/۰درصد) GIST، ۵۴ مورد (۶۵/۷درصد) کارسینوما و ۵ مورد (۷/۰درصد) ماتاستاز گزارش شده بود.

فراوانی تومورهای خوش خیم دستگاه گوارش از نظر نوع هستوپاتولوژیک نشان داد که ۱۹ مورد (۵۵/۲٪) لیوم، ۱۲

حدوا، (۶): تبع فاوانه، مطلقة، و نسیه، توموهای بدخشمی، به حسب موقعیت آناتومیک

دیستال مری											
نامعلوم											
جمع کل											
۳۶	۲۲	۱۴	دیستال
(٪/۱۰۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۶۱/۱)	٪(۳۸/۸)	مری
۱۰۹	۱	۲	.	۲	۸۷	۱۷	نامعلوم
(٪/۱۰۰)	٪(۰/۹۱)	٪(۱/۸۳)	٪(۰)	٪(۱/۸۳)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۷۹/۸)	٪(۱۵/۵)	
۱۷۱	۱	۶	.	۲	۱۲۵	۳۷	جمع کل
(٪/۱۰۰)	٪(۰/۱۵)	٪(۳/۵)	٪(۰)	٪(۱/۱۶)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۷۳)	٪(۲۱/۶)	

از ۳۴۵ مورد تومور بدخیم معده، ۲۷۵ مورد (۷۹/۷درصد) آدنوكارسینوم و بعد از آن به ترتیب کارسینوم (۱۴/۱درصد)، لنفوم (۲/۸درصد)، اسکواموس سل کارسینوم (۲/۶درصد)، نورواندوکرین (۱/۱۵درصد)، متاستاز (۲/۰۲درصد)، تومور آدنوسکواموس سل کارسینوم و لیومیوسارکوم (هر کدام ۰/۲۸درصد) قرار داشتند (جدول ۷).

از ۳۴۵ مورد تومور بدخیم در معده، ۱۰۱ مورد (۲۹/۲۷درصد) در کارديا، ۷۵ مورد (۲۱/۷۳درصد) در انتروم، ۶۲ مورد (۱۷/۹درصد) در بادی، ۱۰ مورد (۲/۸درصد) در پیلو، ۱ مورد (۰/۲۸درصد) در فوندوس و در ۹۶ مورد (۲۷/۸درصد) محل نمونه برداری مشخص نشده بود.

جدول (۷): توزیع فراوانی مطلق و نسبی تومورهای بدخیم معده بر حسب موقعیت آناتومیک

تومور نوع موقعیت آناتومیک																						
کارديا	فوندوس	بادی	انتروم	پیلو	نامعلوم	کارسینوما	اسکواموس سل	لنفوم	نورواندوکرین	آدنوسکواموس سل	لیومیوسارکوم	کارسینوما	آدنوكارسینوم	اسکواموس سل	لنفوم	نورواندوکرین	آدنوسکواموس سل	لیومیوسارکوم	کارسینوما	متاستاز از	جامعة کل	
۱۰۱	.	۸	۱	۵	۷	۸۵	کارديا										
(٪/۱۰۰)	٪(۰)	٪(۷/۹۲)	٪(۰/۹۹)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۶/۹۳)	٪(۸۴/۱۵)											
۱	(٪/۱۰۰) ۱	(٪/۰)	٪(۰)								فوندوس
(٪/۱۰۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)											
۶۲	۳	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶	۰	.	.	۴۲	بادی	
(٪/۱۰۰)	٪(۴/۸۳)	٪(۱۴/۵۱)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۳/۲)	٪(۹/۶۷)	٪(۰)	٪(۶۷/۷۴)											
۷۵	۰	۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۵۸	انتروم	
(٪/۱۰۰)	٪(۰)	٪(۱۴/۶۶)	٪(۱/۳۳)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۶/۶۶)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۷۷/۳۳)											
۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	پیلو	
(٪/۱۰۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)	٪(۰)											
۹۶	۱	۷	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۸۰	نامعلوم	
(٪/۱۰۰)	٪(۱/۰۴)	٪(۷/۲)	٪(۱/۰۴)	٪(۰/۰۴)	٪(۰/۰۴)	٪(۰/۰۴)	٪(۰/۰۴)	٪(۰/۰۴)	٪(۰/۰۴)	٪(۰/۰۴)	٪(۰/۰۴)											
۳۴۵	۴	۳۵	۳	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع کل	
(٪/۱۰۰) ۳۴۵	٪(۱/۱۵)	٪(۱۰/۱۴)	٪(۰/۰۸۶)	٪(۰/۰۸۶)	٪(۰/۰۸۶)	٪(۰/۰۸۶)	٪(۰/۰۸۶)	٪(۰/۰۸۶)	٪(۰/۰۸۶)	٪(۰/۰۸۶)	٪(۰/۰۸۶)											

از ۱۵ مورد تومور بدخیم روده باریک، ۱۲ مورد (۸۰درصد) آدنوکارسینوم، ۲ مورد (۱۳/۳درصد) کارسینوم و ۱ مورد (۶/۶درصد) نورواندودکرین تومور گزارش شده بود (جدول ۸). از ۱۵ مورد تومور بدخیم در روده باریک، ۱۰ مورد (۶۶/۶درصد) در دئوندnom، ۲ مورد (۱۳/۳درصد) در ایلثوم، ۱ مورد (۶/۶درصد) در زننوم و در ۲ مورد (۱۳/۳درصد) محل دقیق درگیری مشخص نشد بود.

جدول (۸): توزیع فراوانی مطلق و نسبی تومورهای بدخیم روده باریک بر حسب موقعیت آناتومیک

												تومور نوع
												موقعیت
جمع کل	آدنوکارسینوم	اسکوموس سل	لنفوم	نورواندودکرین	آدنواسکوموس سل	لیومیوسارکوم	کارسینوما	متاستاز	GIST	کارسینوما	لیومیوسارکوم	مجموع
۱۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸
(٪/۱۰۰)	(٪/۰)	(٪/۱۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	دئوندnom
۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زننوم
(٪/۱۰۰)	(٪/۰)	(٪/۱۰۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	ایلثوم
۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
(٪/۱۰۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	نامعلوم
۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
(٪/۱۰۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	کل
۱۵	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۲
(٪/۱۰۰)	(٪/۰)	(٪/۱۳/۳)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۶/۶)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	٪(۸۰)

از ۱۷۴ مورد تومور بدخیم در کولورکتوم، ۷۳ مورد (۴۱/۹درصد) در رکتوم، ۴۴ مورد (۲۵/۲۸درصد) در سیگموئید، ۱۰ مورد (۵/۷درصد) در سکوم، ۷ مورد (۴/۰۲درصد) در کولون صعودی، ۶ مورد (۳/۴درصد) در کولون عرضی، ۶ مورد (۳/۴درصد) بیشترین تعداد تومورهای بدخیم در رکتوم قرار داشتند (جدول ۹).

جدول (۹): توزیع فراوانی مطلق و نسبی تومورهای بدخیم کولورکتوم بر حسب موقعیت آناتومیک

												تومور نوع
												موقعیت
جمع کل	آدنوکارسینوم	اسکوموس سل	لنفوم	نورواندودکرین	آدنواسکوموس سل	لیومیوسارکوم	کارسینوما	کارسینوما	متاستاز	GIST	کارسینوما	مجموع
۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹
(٪/۱۰۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	سکوم
۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷
(٪/۱۰۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	صعودی
۶	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵
(٪/۱۰۰)	(٪/۰)	(٪/۱۶/۶)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	(٪/۰)	کولون عرضی

کولون نزولی											
۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶
(٪۱۰۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۱۰۰)
۴۴	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱
(٪۱۰۰)	(٪۰)	(٪۶۸)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۹۳)	(٪۱۰۰)
۷۳	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۶۷	رکتوم
(٪۱۰۰)	(٪۰)	(٪۵۴)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۲۷)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۹۱)	آتوس
۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	نامعلوم
(٪۱۰۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۱۰۰)	(٪۰)	
۲۶	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲	
(٪۱۰۰)	(٪۰)	(٪۱۱۵)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۳۸)	(٪۸۴۶)	
۱۷۴	۰	۱۱	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۳	۱۵۷	جمع کل
(٪۱۰۰)	(٪۰)	(٪۶۳)	(٪۰)	(٪۰)	(٪۰۵۷)	(٪۰)	(٪۱۱۵)	(٪۰)	(٪۱۷)	(٪۹۰۲)	

آدنوکارسینومهای مری در قسمت دیستال آن ایجاد می‌شود در حالی که اسکواموس‌سل کارسینوم با توزیع مساوی در ۱/۳ میانی و تحتانی رخ می‌دهد (۸). در مطالعه شیروانی نیز سرطان مری در قسمت تحتانی از شیوع بالاتری برخوردار بود (۱۴)، ولی در مطالعه تقیوی و آلادوود قسمت میانی شایع‌ترین محل درگیری بود (۳,۹). در مطالعه ما فراوان‌ترین تومور مری؛ اسکواموس‌سل کارسینوم و در رتبه بعدی آدنوکارسینوم قرار داشت که مشابه مطالعه انجام شده توسط Zhang، شیروانی و آلادوود بود (۱۴,۹,۸). طبق نتایج به دست آمده از مطالعه ما، فراوان‌ترین تومور بدخیم در معده آدنوکارسینوم بود که با نتایج مطالعات فروتن و کیهانیان هم‌خوانی دارد (۱۵,۱۶).

در مطالعه ما شایع‌ترین محل درگیری معده با تومور بدخیم کارديا (۲۹/۲۷درصد) و سپس انتروم (۲۱/۷۳درصد) بود، در مطالعه تقیوی و پورفرضی نیز شایع‌ترین محل درگیری معده کارديا بوده که با نتایج مطالعه ما هم‌خوانی دارد (۱۳,۱۷)، ولی در مطالعه امانی و بافنده شایع‌ترین محل درگیری بادی و در مطالعه نوروزی‌نیا انجنای کوچک و سپس کارديا شایع‌ترین محل درگیری بوده است (۱۸,۷). در مطالعه ما بیشترین محل درگیری تومور بدخیم ناحیه کولورکتال، رکتوم (۱/۹درصد) بوده و سپس سیگموئید بود (۲۵/۲۸درصد). در مطالعه سالاری نیز شایع‌ترین محل درگیری رکتوم بود (۱۹)، ولی در مطالعه هوشیار ۷۲/۹۲درصد از تومورها در کولون چپ قرار داشتند (۲۰). از بین ۸۱۲ تومور دستگاه گوارش تنها ۳۶ مورد خوش‌خیم بودند که از این میان بیشترین فراوانی مربوط به لیپوم می‌باشد (۱۹) مورد یعنی ۵۲/۷۷درصد.

در مطالعه‌ای که توسط William انجام شد کمتر از ۱درصد از تومورهای معده خوش‌خیم بود که از این میان ۳درصد از لیپوما

از ۲ مورد تومور خوش‌خیم گزارش شده در مری، ۱ مورد در قسمت میانی مری و یک مورد که مکان آن مشخص نشده بود، هردو از نوع پاپیلوم بودند. از ۷ مورد تومور خوش‌خیم معده، ۲ مورد در قسمت بادی از نوع لیپوم و از ۵ مورد که مکان آنها نامشخص بود ۳ مورد لیپوم و ۲ مورد لیومیوم بود. از ۷ مورد تومور خوش‌خیم روده باریک، ۵ مورد (۷۱/۴درصد) در دئونوم بود که از این تعداد، ۲ مورد (۴۰درصد) لیپوم و ۳ مورد (۶۰درصد) پاپیلوم بود. از ۵ مورد تومور خوش‌خیم در کولورکتوم، ۱۲ مورد (۶۰درصد) لیپوم، ۵ مورد (۲۵درصد) پاپیلوم و ۳ مورد (۱۵درصد) همانزیوم بود. از ۱۹ مورد لیپوم دستگاه گوارش، ۱۲ مورد (۶۴/۳۱۵درصد) در ناحیه کولورکتوم بود که بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.

بحث

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که فراوانی نسبی سرطان دستگاه گوارش در گروه سنی بالای ۶۰ سال بیشتر از سایر گروههای سنی بوده و میانگین سنی مبتلايان ۶۰/۲ سال می‌باشد و با افزایش سن میزان فراوانی تومورهای بدخیم افزایش می‌یابد. ۶۱/۸درصد از مبتلايان به تومورهای بدخیم، مرد و ۳۸/۱درصد از آن‌ها زن بودند. در مطالعه‌ای که تقیوی و همکاران بر روی ۷۶۱ بیمار مبتلا به کانسر دستگاه گوارش در ایران انجام دادند نیز میانگین سنی بیماران ۶۳ سال و میزان ابتلای مردان دو برابر زنان بود (۱۳). مطالعه نجفی و همکاران نیز نشان داد که با افزایش سن، شیوع سرطان‌های مری، معده و کولورکتوم افزایش می‌یابد (۱).

در مطالعه ما از ۱۷۱ مورد تومور بدخیم مری ۶۴/۳۷۴درصد در مکان نامعلوم قرار داشته و سپس دیستال مری بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. طبق مطالعه Zhang، تقریباً ۳/۴

تومورهای بدخیم می‌باشند در حالی که تومورهای خوش‌خیم بیشتر در زنان دیده شد. همچنین فراوانی بالای تومورهای بدخیم در محدوده سنی ۷۱ سال و بالاتر، نشان‌گر اهمیت غربال‌گری و تشخیص سریع‌تر در سنین پایین‌تر برای جلوگیری از بروز تومورهای بدخیم در سنین بالاتر می‌باشد.

تشکر و سپاسگزاری

از تکنسین‌های پاتولوژی و آندوسکوپی بیمارستان امام خمینی ارومیه تشکر کرده و نیز از سرکار خانم پروین آبرملو عضو واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی ارومیه که آنالیز آماری این مطالعه را انجام دادند قدردانی می‌نماییم. این مقاله برگرفته از پایان نامه خانم مهسا اسماعیلی فام، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می‌باشد. نویسندها مقاله اظهار می‌دارند که هیچ گونه تضاد منافعی وجود ندارد.

References:

- Najafi F, Mozaffari HR, Karami M, Izadi B, Tavvafzade R, Pasdar Y. Trends in incidence of gastrointestinal tract cancers in western Iran 1993-2007. *Iran Red Crescent Med J* 2011; 13: 805-10.
- Herszenyi L, Tulassay Z. Epidemiology of gastrointestinal and liver tumors. *Eur Rev Med Pharmacol Sci* 2010; 14: 249-258.
- Esmaeimzadeh N, Salahi-Moghaddam A, Khoshdel AR. Geographic distribution of important cancers in Iran. *Hormozgan Medical Journal* 2015; 19: 73-82.
- Kasper DL, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Localzo J. *Harrison's principles of internal medicine*. 19nd Ed. Network: MHF; 2015. P. 532-7.
- Yazdanbod A, Nasseri Moghadam S, Malekzadeh R. Upper gastrointestinal cancers in Ardabil,north west of Iran: A review. *Arch Iran Med* 2004; 7: 173-7.
- Sitarez R, Skierucha M, Mielko Y, Offerhaus G, Maciejewski R, Polkowski W. Gastric cancer: epidemiology, prevention, classification, and treatment. *Cancer Manag Res* 2018; 10: 239-48.
- Bafandeh Y, Farhang S. Sub site distribution of gastric cancer an area of high prevalence-north west Iran. *J Epidemiol* 2009; 19: 202-5.
- Zhang Y. Epidemiology of esophageal cancer. *World J Gastroenterol* 2013; 19: 5598-5606.
- Ale davood A, Anvari K, Sabouri G. Esophageal Cancer in Northeast of Iran. *Iran J Cancer Prev* 2011; 4: 125-9.
- Rawla P, Sunkara T, Barsouk A. Epidemiology of colorectal cancer: incidence, mortality, survival, and risk factors. *Prz Gastroenterol* 2019; 14 (2): 89-103.
- Dolathkah R, Somi MH, Asvadi-Kermani I, Ghojazadeh M, Asghari-Jafarabadi M, Farassati F, et al. Increased colorectal cancer incidence in Iran: A systematic review and metaanalysis. *BMC Public Health* 2015; 15: 997-1010.
- Malekzadeh R, Derakhshan MH, Malekzadeh Z. Gastric cancer in Iran: Epidemiology and risk factors. *Arch Iran Med* 2009; 12: 576-83.
- Taghavi N, Nasrollahzadeh D, Merat S, Yazdanbod A, Hormazdi M, Sotoudeh M, et al. Epidemiology of upper gastrointestinal cancers in Iran: A subsite

تشکیل شده بود (۲۱). همچنین در مطالعه Orland و همکارانش از میان ۳۵۰۰ مورد اتوپسی معده، ۱۴ مورد تومور خوش‌خیم معده گزارش شده بود که تنها ۲ مورد آن لیبیومای ساب‌موکزال بود (۲۲) که نتایج مطالعه William با نتایج مطالعات ما همسو نمی‌باشد.

نتایج مطالعه Nallamothu با نتایج مطالعه ما از نظر موقعیت آنatomیک لیپوم در کولون مغایرت دارد؛ چرا که در مطالعه Nallamothu، بیشترین فراوانی لیپوم در همی‌کولون راست (۷۰درصد) گزارش شده بود (۲۳) در حالی که در مطالعه ما ۶۴درصد از لیپوم‌ها در سیگموئید قرار دارد.

نتیجه‌گیری

نتایج مطالعه ما نشان می‌دهد که فراوان ترین تومور بدخیم دستگاه گوارش آدنوكارسینوم و فراوان ترین تومور خوش‌خیم، لیبیوما می‌باشد. مردان در مقایسه با زنان، بیشترین درصد مبتلایان به

- analysis of 761 cases. *World J Gastroenterol* 2007; 13: 5367-70.
14. Shokri Shirvani J, Siadati S, Imandoost F. Demographic, Endoscopic and Pathologic Features of Esophageal Carcinoma. *J Mazandaran Univ Med Sci* 2017; 27(150):176-180. (Persian)
15. Froutan-Pishbahari H, Asefirad M, Ghofrani H, Shafaghi A, Nassiri-Tossi M, Dolatshahi S, et al. A retrospective study of gastric cancer in Tehran. *Med J I.R. Iran* 2006; 20: 107-110.
16. Keyhanian Sh, Farhadifar N, Fotoukian Z, Pouya M, Saravi M. Epidemiologic and malignancy indices of gastric cancer in patients referred to oncology clinic at Ramsar Imam Sajjad hospital during 2002-2009. *J Shahid Sadoughi Univ Med Sci* 2012; 20(1): 110-8. (Persian)
17. Pourfarzi F, Whean A, Kaldor J, Malekzadeh R. The role of diet and other environmental factors in the causation of gastric cancer in Iran -A population based study. *Int J Cancer* 2009; 125: 1953-60.
18. Amani F, Hooshyar A, Yazdanbod A, Bagheri A, Fooladi R, Feyzi F. Study upper gastrointestinal tract malignancies in patients referred to endoscopy in Imam Khomeini Hospital at Ardabil city, 2008-2010. *J Caduceus Arums* 2012; 2 (4): 41-8. (Persian)
19. Salari AA, Dehghan HR. Evaluation and Treatment of Colorectal Cancer in Shahid Rahnemoon and Afshar Hospitals. *J Shahid Sadoughi Univ Med Sci* 2007; 15(3): 20-5. (Persian)
20. Hooshyar A, Yazdanbod A, Amani F, Matin S, Matin E, Bagheri A. Determination of the frequency of colorectal tumors in colonoscopies performed in Imam Khomeini Hospital in Ardabil from February 2008 to September 2010. 2nd Scientific-Research-Student Congress of Ardabil University of Medical Sciences; 2011.
21. Phelan WJ, Rowan DE. Lipoma of the Stomach. *Am J Surg* 1950; 3(79): 469-72.
22. Orland B S, Brunschwig A. Submucosal Lipomas of the stomach. *Arch Surg* 1946; 52(3): 253-9.
23. Nallamothu G, Douglas G. large colonic lipomas. *Gastroenterol Hepatol (NY)* 2011; 7(7): 490-2.

EVALUATION OF THE HISTOPATHOLOGIC CHARACTERISTICS OF GASTROINTESTINAL TUMORS IN ENDOSCOPY SAMPLES IN URMIA IMAM KHOMEINI HOSPITAL

*Fariba Abbasi¹, Farzaneh Javanmard *², Mahsa Esmaiel Fam³*

Received: 14 January, 2021; Accepted: 04 November, 2021

Abstract

Background & Aims: Cancer is the most common cause of death in developing and developed countries, accounting for nearly 13% of world death. In Iran, gastrointestinal cancers are common. Therefore, this study was conducted to evaluate the gastrointestinal tract tumors in Urmia Imam Khomeini hospital.

Material & Methods: In this cross-sectional study, pathology reports of 741 patients with gastrointestinal tumor were evaluated.

Results: Of 741 reported tumor, 705 cases (95.14%) were malignant, 36 cases (4.85%) were benign. 61.8% of patients with malignant tumors were men and 38.1% were women. The mean age of patients with malignant tumors was 60.2 ± 13.35 and the mean age of patients with benign tumors was 47.7 ± 10.49 . The most abundant malignant tumor was adenocarcinoma with 481 cases (68.22%) followed by squamous cell carcinoma with 137 cases (19.43%) and the most frequent benign tumor was lipoma (52.7% of cases). The malignant tumors were observed mostly in the ages of 71 or higher (232 cases (32.9%)). In the evaluation of anatomical location of the malignant tumors, in esophagus, the precise location was not reported in most cases (63.7%). In the stomach, the cardia with 29.27%, in the small intestine, the duodenum with 66.6%, and in the colorectal region, the rectum with 41.9% were the most involved locations.

Conclusion: The results of our study indicated that the most abundant malignant tumor of the gastrointestinal tract was adenocarcinoma and the most abundant benign tumor was lipoma. Malignant tumors were observed mostly in men while benign tumors were mostly observed in women. The high frequency of malignant tumors in the ages of 71 and higher indicates the importance of early-onset screening for the prevention of malignant tumors in older ages.

Keywords: Cancer, gastrointestinal tract, anatomical location, adenocarcinoma

Address: Department of Pathology, Imam Khomeini Hospital, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

Tel: +984432237080

Email: javanmard.f@umsu.ac.ir

SOURCE: STUD MED SCI 2021; 32(7): 547 ISSN: 2717-008X

¹ Associate Professor of Pathology, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

² Assistant Professor of Pathology, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran (Corresponding Author)

³ Medical student of Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran